




L. XXX 39

Dono Weigand.

M. 0342

Klinisches
Handbuch

zum

Gebrauch

bey den

wichtigsten, gefahrvollsten und schnell
tödlichen Krankheiten

für

angehende Aerzte


von

Dr. C. J. Kilian,

Königlich Baierischem Medicinal - Rathe,
und Professor etc. etc.

Dritte Auflage.

Bamberg und Würzburg,
bey Joseph Anton Goebhardt.
1809.



V o r r e d e
zur dritten Auflage.

Wenn vorliegendes Handbuch zum dritten Male in derselben Form erscheint, wie bey der ersten Auflage, so ist es nicht sowohl meine, als vielmehr des Verlegers Schuld. Gerne hätte ich dasselbe, wo nicht ganz als Handbuch der gesammten speciellen Therapie umgearbeitet, wenigstens doch an dem ersten Theile, d. h. an der allgemeinen Theorie der Heilung, so wie auch an dem zweyten Theile, d. h. an der Theorie der besondern Heilkunde, insbesondere im Betreff der Konstruktionen der Krankheitsformen, und der Ausführung der speciellern Behandlungen derselben manche Abänderungen,

V o r r e d e.

rungen, Verbesserungen und Zusätze gemacht; allein die Auflage war beynahe schon zu Ende gedruckt, als mich der Verleger davon in Kenntniß gesetzt.

Um einiges wenigstens für die grössere Brauchbarkeit dieses Handbuches zu thun, habe ich als Anhang das Faul - und Nervenfieber demselben noch hinzugefügt, insbesondere darum, weil auch diese beyden Krankheitsformen zu den gefährlichern und oft schnell tödlichen gehören, und insofern dem ersten Zwecke dieses Handbuches entsprechen.

Die Bearbeitungsweise dieser Fieberarten wird einiger Maffen schon zeigen, wie ich gesonnen gewesen, mehr in das Detail der Krankheiten selbst einzugehen, wie ich es auch früher schon bey meinen Vorlesungen über spezielle Therapie gethan habe. Uebrigens aber war es mir nicht erlaubt, in Betreff der Darstellungsweise dieser beyden Fieberformen und deren Behandlungsarten von der vorhergehenden sehr abzuweichen, indem eines Theils der Kontrast zu scharf, und andern Theils eine weitere Exposition der

V o r r e d e.

der allgemeinen Theorie der Heilung erforderlich gewesen wäre, um über die nachher vorkommenden Abänderungen gehörig mich zu legitimiren.

Dafs ich bey diesen beyden Fieberformen mehr ins Detail gegangen, wird jedem von selbst klar seyn. Wenn indessen manche Regeln und klinische Vorschriften den Schein blos empirischer Sätze an sich tragen, so muß ich mir diese Anschuldigung um so eher und lieber gefallen lassen, als ich doch wenigstens dabey die Ueberzeugung für mich habe, dafs sie nicht nur von wichtiger Bedeutung für die Klinik, sondern auch in der Natur des Organismus selbst gegründet sind.

Sollte daher etwa dieses Handbuch noch eine neue Auflage erleben, so werde ich mich desfalls in der allgemeinen Theorie der Heilung zu rechtfertigen suchen, außerdem dafs ich dann die ganze spezielle Therapie in der Art, wie das Faul- und Nervenfieber, nur noch besser klassifizirt u. s. w. bearbeiten werde. Bis dahin aber hoffe ich schon in meinen nächstens erscheinenden:

V o r r e d e.

den *Medicinischen Studien* die nöthigen Vorarbeiten und Rechtfertigungsgründe zu liefern; bisdahin sich auch aller weiten Exposition hierüber enthält.


Bamberg, im August, 1808.

Der Verfasser.

Einleitung.

Krankheiten heilen heißt im nächsten Sinne des Wortes weiter nichts anderes, als denjenigen Zustand des lebenden Organismus, welcher Krankheit ist, entfernen, oder bestimmter ausgedrückt, in denjenigen Zustand, welcher Gesundheit ist, umändern. — In so fern wäre also Beseitigung der Krankheit, Wiederherstellung der Gesundheit, und Erreichung der hierzu erforderlichen Mittel der wahre, nächste und ganze Zweck derjenigen Wissenschaft, welche wir Heilkunde nennen.

Um uns aber in den Stand zu setzen, Krankheiten gründlich und sicher zu heben, und die verlorne Gesundheit wieder zu verschaffen, wird erfordert, daß wir uns vor allen Dingen erst von der Natur, Wesenheit, Ursache und von den Bedingnissen beider Zustände genau unterrichten; indem die praktischen Erkenntnisse und Regeln, d. h. diejenigen, welche



uns lehren, was geschehen soll, um Krankheiten zu beseitigen, die erst gedachten Kenntnisse nothwendig voraussetzen, und nur Resultate von jenen sind. Dem zufolge wird zur zweck- und vernunftmässigen Führung des Heilungsgeschäftes überhaupt erfordert:

1. Kenntniss des Objektes, welches beseitigt werden soll, nämlich der Krankheit überhaupt, ihrer Erscheinungen, Ursache, Beschaffenheiten, und der Bedingungen, wovon ihre Existenz abhängt, (Pathogenie.)

2. Kenntniss der Kriterien und Regeln, welche uns bey der Untersuchung der Krankheiten überhaupt sicher leiten. (Untersuchungskunst, Krankenexamen).

3. Kenntniss derjenigen Regeln, vermöge welcher wir zur richtigen Bestimmung des Karakters einer Krankheit überhaupt gelangen können. Uebrigens sind die Regeln, welche uns hierin leiten, blos aus dem Vorigen abgeleitete Schlüsse, Resultate der Semiotik, und erhalten als ein Ganzes betrachtet, den Namen Bestimmungskunst, Diagnostik.

4. Das Vermögen, bestimmt angeben zu können, ob und welche Krankheiten heilbar seyen oder nicht; was in beiden Fällen zu erwarten sey, wie lange es

an-



anstehe, bis eine entscheidende Veränderung eintrete u. s. w. Dieses Geschäft ist die Aufgabe der Vorhersagungskunst, Prognostik.

5. Richtige Begriffe und Grundsätze von dem unmittelbaren Heilungsgeschäfte selbst, genaue Bekanntschaft mit den möglichen Veränderungen des lebenden Organismus, und der dazu nöthigen Operationen und Regeln der Anwendung der zur Heilung selbst erforderlichen Mittel (*Materia medica*). Ueberhaupt dieser Theil der Heilkunde heisst generelle Therapie.

6. Anwendung gedachter Kenntnisse und Regeln zum Behufe der Heilung einzelner bestimmter Krankheitsfälle. Besondere Therapie, Klinik.

Dieses sind die Gegenstände, welche ich in diesem Buche in gedrängter Kürze, wobey aber die Wesenheit der Sache selbst so wenig als die Deutlichkeit in der Darstellung leiden soll, abhandeln werde, während dem, was die einzelnen Krankheitsformen selbst betrifft, mich hier nur auf die gefahrvollsten und schnell tödlichen mich zu beschränken mein Plan nur ist.

Infofern nun alle bisher gedachten Kenntnisse von der Art sind, daß dadurch unser Verstand über die Gegenstände, die zu behandeln sind, bloß aufgeklärt wird,



und der Inbegriff solcher Kenntnisse, Lehrsätze, Regeln, Maximen, Grundsätze u. s. w. gemeinhin Theorie heisst, der Hauptzweck derselben aber Heilung ist; so werde ich, da die Heilkunde, somit auch sowohl die generelle als spezielle Therapie mehr zu leisten ohnedem nicht verpflichtet ist, noch vermag, in dieser Schrift überhaupt nur eine Theorie der Heilung aufstellen, diese aber selbst noch in zwey besondern Theilen vortragen. Im ersten Theile nämlich, unter der Aufschrift: Allgemeine Theorie der Heilung das zu meinem vorseyenden Unternehmen Nöthige über Pathogenie, Untersuchungskunst, Diagnostik, Prognostik, generelle Therapie und Arzneimittellehre abhandeln; im zweyten Theile unter der Aufschrift: Besondere Theorie der Heilung die mir hier gewählten Krankheitsformen durchgehen, und bey jeder die Definizion, Konstrukzion, ursachlichen Momente, Geschichte des Verlaufs, die besondern und wichtigsten Prognosen und Heilart nebst Angabe der jedesmaligen Diät, der brauchbarsten Hausmitteln, und der wichtigsten Arzneyvorschriften in ihren wesentlichsten Momenten mittheilen.

E r s t e r T h e i l .

Allgemeine Theorie der
Heilung.

Erstes Kapitel.

Darstellung der Hauptgattungen der Krankheiten, ihrer besondern Arten, und deren Entstehungsart überhaupt.

§. I.

Krankheit und Gesundheit sind die beiden Grundbeschaffenheiten des lebenden Organismus. Nur in der organischen Körperwelt möglich und anzutreffen, haben sie darum auch nur Sinn für das organische Naturprodukt, und eben darum nur eine relative Bedeutung. Als solche stellen sie sich uns demnach als die beiden Hauptzustände des Lebens vorerst und in ihrer allgemeinsten Bedeutung dar. Was aber auch zunächst und nothwendig hieraus folgt, ist, daß sie mit dem Leben auch denselben Grund ihrer Möglichkeit und Wirklichkeit nicht allein gemein haben werden, sondern vielmehr gemein haben müssen. Dem zufolge möchte es nicht bloß sehr rathsam, sondern vielmehr absolut nothwendig seyn, um die wahre Konstrukzion der Krankheit, so wie die anderweitigen hieraus folgenden Resultate ungezwungen und frey vor den Augen unserer Leser selbst entstehen zu lassen, und dadurch unsere Untersuchung in ihrem weitem Fortgange, so viel wie unmöglich, faßlich und verständlich zu machen, vor allem Anderen erst bestimmt anzugeben,

a) Was Leben an sich, und als Naturerscheinung sey;

b) Von



b) Von welchen Bedingnissen sowohl die Möglichkeit, als auch die Wirklichkeit desselben abhängt.

§. 2.

Das Leben indessen, an sich betrachtet, ist selbst weiter nichts anders, als der Akt der wirklichen Entzweiung der organischen Natur mit sich selbst, oder der innere und unmittelbare Ausdruck der regen Wirksamkeit des die ganze objektive Natur durchgreifenden Gegensatzes, dessen Faktoren, obgleich an sich durch die ganze Evolutionsreihe der Natur dieselben, ins Besondere aber in der animalischen Körperwelt, vorzüglich in dem menschlichen Organismus im höchsten Grade ihrer möglichen Individualisirung sich darstellend, Sensibilität und Irritabilität sind.

§. 3.

Beide Faktoren des gedachten Gegensatzes innerhalb der organischen, ins Besondere der animalischen Körperwelt, in ihrer Vereinigung im Absoluten selbst durchaus ununterscheidbar, erscheinen nicht nur erst im Akte ihrer Trennung von dem Absoluten als solche und als von einander verschieden, sondern jeder derselben kündigt sich sogleich auch mit einer dem andern entgegengesetzten Tendenz an, mit welcher sie nun beide, auf einander ankämpfend, zuerst als organische Thätigkeiten erscheinen, und sowohl durch, als auch in ihrem wechselseitigen Kampfe nicht nur das Innere, der Wahrnehmung durchaus entzogene Leben, oder das Leben an sich, sondern auch, mittelbar wenigstens, die anderweitigen daraus hervorgehenden wahrnehmbaren Bewegungen, oder das Leben als Erscheinung



ung genommen, produziren, und die zur Fortdauer des Lebens zunächst erforderliche ununterbrochene Aufeinanderfolge derselben Bewegungen unterhalten.

§. 4.

Beide organische Thätigkeiten unterscheiden sich übrigens im Allgemeinen von einander dadurch, daß die eine, nämlich die Sensibilität vom Innern des Organismus heraus nach Aussen strebet, und ihrer ursprünglichen Natur gemäß dadurch dem Organismus Receptivität für Einwirkungen von Aussen auf denselben ertheilt; während dem die andere, nämlich die Irritabilität, von Aussen nach Innen des Organismus wirkt, und dadurch demselben den Charakter der Spontanität, oder der Selbstwirksamkeit mittheilt und ausdrückt. Erstere Funktion des Organismus verhielte sich demnach zur zweiten, wie Leiden oder Passivität zum Handeln oder zur Aktivität, jedoch so, daß beide Funktionen, als solche, nur in und während ihrer wirklichen Entgegensetzung bestehen, erkennbar sind, und dadurch allein auch beide für die Hervorbringung organischer Erscheinungen ihre gegenseitigen Charaktere sich verbürgen

§. 5.

Indessen besteht hinwiederum jede dieser beiden Thätigkeiten, für sich allein betrachtet, als eine eigene und besondere Einheit, welche, als solche, nothwendig eine Differenz in sich selbst nicht nur zuläßt, sondern vielmehr voraussetzt, absolut erfordert und fest in sich einschließt; so zwar, daß, so wie das Leben überhaupt nur solange besteht und bestehen kann, als Sensibilität und Irritabilität sich in ihrer Differenz erhalten, oder



oder erhalten können, gleichfalls auch das mögliche, so wie das wirkliche Bestehen jeder dieser beiden Einheiten zunächst von der Gegenwart und Dauer ihrer eigenen individuellen Differenz abhängt. Demnach müßten wir also in jeder dieser beiden Einheiten ein ähnliches Verhältniß von Funkzionen uns denken und annehmen, wie zwischen Sensibilität und Irritabilität (§. 4.); außerdem daß dieser Ansicht der Konstrukzion beider Thätigkeiten die Wirklichkeit und alltäglichste Erfahrung ganz genau entsprächen. Nämlich:

a) Die Nerven besitzen nicht bloß das Vermögen, äussere Einwirkungen auf den Organismus aufzunehmen - Rezeptivität, sondern dieselben auch von ihrem peripherischen Ende an nach Innen bis an ihr Zentralend fortzuleiten - Spontaneität. (S. meinen Entwurf eines Systems der gesammten Medizin. Th. II. §. 229.)

b) Eben so kömmt allen irritablen Organen ausser der Beugekraft, wodurch sie sich in sich selbst kehren (§. 4) auch noch eine Streckkraft zu, vermittelt welcher sie von Innen nach Aussen ihre Thätigkeit richten, und dadurch dem Ankämpfen der äussern Natur auf sie entgegenstreben (S. meinen Entwurf etc. Th. II. §. 780. 781.)

§. 6.

Eben dieser Antagonismus der beiderley individuellen Funkzionen ist es, welcher die Existenz, Individualität und das Leben sowohl beider Systeme überhaupt, als aller denselben angehörigen besondern Organe setzet, bedingt und erhält, gerade so wie die Existenz Individualität und das Leben des Organismus überhaupt,

als



als Ganzes genommen, von dem allgemeinen Gegensatz oder Antagonismus der Sensibilität und Irritabilität abhängig und bedingt ist.

§. 7.

Aus eben diesem Grunde ist es auch höchst gefehlt, unter Sensibilität weiter nichts anderes, als bloß Receptivität oder das Streben der absoluten Produktivität von Innen nach Aussen, und unter Irritabilität bloß Spontaneität, oder überhaupt das Wirken eben derselben von Aussen nach Innen sich zu denken und vorzustellen. Nur bemerke man hierbey, daß, so wie beide Funkzionen der Irritabilität, oder ihres unmittelbaren Phänomens nämlich des irritablen Systems, durchaus reiner Aktivität sind, jene der Sensibilität, oder des Nervensystems, in ihren beiderley Formen bloß den Charakter der Passivität an sich tragen und ausdrücken.

§. 8.

Iede dieser beiden bisher näher bestimmten Thätigkeiten, als eigene und besondere Einheiten betrachtet, bildet nun in Beziehung auf jene Differenz, die sie in sich enthält, gleichfalls eine eigene und individuel bestimmte Indifferenz. Nimmt man nun noch hinzu, daß beide Thätigkeiten die eigentlichen Faktoren des obersten und allgemeinen Gegensatzes im Organismus sind (§. 2.), so muß man sich innerhalb desselben zwey Indifferenzen, gleich den beiden Brennpunkten der Eliptischen Bahn, vorhanden denken und annehmen.

Wie aber bey eben dieser Beschaffenheit beider Thätigkeiten im Organismus überhaupt Leben, welches wir doch nach §. 2. als den unmittelbaren Ausdruck einer stets regen Differenzirung des Organismus in sich selbst




selbst bestimmt und angenommen haben, denkbar, möglich, und erklärbar sey, werden wir dann sogleich und sehr leicht begreifen, wenn wir erwägen, daß beide Thätigkeiten, als eben so viele besondere Einheiten, nur in Beziehung auf ihre eigene individuelle Gegensätze als Indifferenzen erscheinen und gedacht werden müssen, beide aber, unter sich wieder mit einander verglichen und in Betracht gezogen, wann und wo sie sich begegnen oder beysammen sind, bey ihrer, nur in gedachter Beziehung ihnen zukommenden, Indifferenz sogleich in einem bestimmten Verhältnisse der Differenz zu einander hervortreten, unter sich, und zwar im Inneren des Organismus, eine Differenz setzen und bilden, aus welcher dann erst eine allgemeine Indifferenz des Organismus, und zwar in entgegengesetzter Richtung der eben erwähnten Differenz, nämlich nach Außen hervorgeht.

§. 9.

Da nun aber keine Differenz oder Gegensätze ohne Indifferenz oder Einheit so wenig, als letztere ohne erstere, denkbar noch möglich sind, folglich Eines nothwendig und immer das Andere bedingt, so wie es hinwiederum auch von seinem Entgegengesetzten bestimmt wird, dieses aber der Karakter des Organischen überhaupt ist; so wird schon von daher einleuchtend, daß der Urtypus der gesammten konstruirten oder objektiven Natur der der Organifazion sey, somit jedes individuelle Naturprodukt als ein für sich Organisches im Allgemeinen angesehen werden müsse.

Wodurch aber die belebte Körperwelt von der unbelebten sich unterscheide, erfährt man nur dann, wenn
man



man weiß, daß in der belebten Körperwelt die Differenz nach Innen, und die Indifferenz nach Aussen, in der unbelebten dagegen die Differenz nach Aussen, und die Indifferenz nach Innen gekehrt liege oder falle.

§. 10.

Demzufolge wird dem menschlichen Organismus gerade nur solange Leben zukommen und zu theil bleiben, als das gedachte, die belebte Körperwelt ausschließend charakterisirende räumliche Verhältniß der Differenz zur Indifferenz nur noch einiger Massen in demselben besteht, widrigenfalls, nämlich bey totaler Umkehrung dieses Verhältnisses, nicht allein das individuelle Leben, sondern zugleich auch der individuel bestimmte Charakter der thierischen und ins Besondere menschlichen Organisation sogleich und auf immer von dem menschlichen Organismus entweicht, wo er dann mithin auch aufhört, derselbe zu seyn, und unserer vorigen (§. 9.) Bestimmung gemäß zu dem allgemeinen Organismus zurückkehrt.

§. 11.

An eben dieser Anschauungsart des Lebens läßt sich nun sehr bald und leicht demonstrieren, wie wir uns Gesundheit und Krankheit, beide in ihrer höchsten Abstraktion aufgefaßt, vorstellen können und müssen. — Insofern nämlich jedes organische Individuum zunächst an sich nur der sichtbare Ausdruck einer bestimmten Proportion in dem Verhältnisse der Differenz nach Innen bey gleichmäßig bestimmter Indifferenz nach Aussen ist, folglich nur solange, als eben diese bestimmte Proportion besteht, in seiner Individualität oder Existenz sich erhalten kann, dasselbe bleibt, oder was das
nämliche



nämliche sagt, gesund ist; insofern werden wir unter Gesundheit, sowohl im Allgemeinen, als im Besondern, das Bestehen der eben gedachten und bestimmten Proportion des Verhältnisses der Differenz und Indifferenz am besten uns vorstellen können! somit wird jeder Schritt oder Moment der Umkehrung dieses proportionalen Verhältnisses als Krankheit erscheinen; oder Krankheit vielmehr sich immer dadurch Karakterisiren, daß der Organismus nach Außen sich differenzirt, während dem er nach Innen immer mehr und mehr sich indifferenzirt, bis endlich bey gänzlich vollendeter Indifferenzirung nach Innen der Tod sich einstellt.

§. 12.

Alles bisher Vorgetragene als Erörterung der höchsten Ansicht und Konstruktionsart des Lebens und seiner beiden Grundbeschaffenheiten voraus geschickt, wird es hoffentlich nunmehr weniger Anstrengung des Geistes erfordern, einzusehen und zu begreifen, nicht nur daß Sensibilität und Irritabilität die beiden eigentlichen Faktoren des Lebens und seiner beiden Hauptzustände, sondern daß im Allgemeinen auch Leben, Gesundheit und Krankheit gerade nur solange möglich seyen, als beide Grundkräfte, zunächst der organischen Natur, in irgend einem Grade von Differenz sich erhalten, oder was dasselbe sagen will, sich auf irgend eine Art noch differenziren, wechselseitig sich bestimmen, in einander eingreifen, und gegenseitig sich noch verändern können. Oder wenn man, um sich hierüber bestimmter ausdrücken zu können, zunächst darauf reflektirt, daß Sensibilität und Irritabilität immer und nothwendig in entgegengesetzter Richtung zu einander sich befinden §. 4; so




so kann man es sich auch von daher erklären, daß das Leben und seine Aeussierung nur solange möglich sey, als das wechselseitige Verhältniß der entgegengesetzten Richtungen dieser beiden Thätigkeiten noch rege vorhanden sey, und daß demnach sowohl das Leben, als auch seine besondern Zustände nicht allein von eben denselben bestimmten Richtungen dieser beiden Thätigkeiten gegen einander abhängig, sondern daß diese vielmehr ohne der gedachten Dualität im Organismus weder denkbar noch möglich seyen.

§. 13.

Nehmen wir endlich noch diese Vorstellung zu Hülfe, daß beide Grundkräfte des Organismus sich zu einander verhalten, wie die beiden Endpunkte eines doppelarmigen Hebels; so werden wir uns dieser Anschauung gemäß am deutlichsten das Leben als das beständig rege Balanciren beider Arme, die Gesundheit als das relative Gleichgewicht beider gegen einander, und endlich die Krankheit überhaupt als das Aufgehoben seyn eben dieses Gleichgewichtes vorstellen können, wo dann nämlich eine dieser beiden Thätigkeiten tiefer herabsinkt, die andere dagegen höher hinaufsteiget, als es dem gesundheits gemässen Zustande nach eigentlich seyn sollte.

Indessen muß aber doch hierbey nothwendig bemerkt werden, daß nicht jeder Grad des gegenseitigen Sinkens oder Steigens beider Thätigkeiten darum sogleich auch Krankheit im Organismus setze, oder vielmehr für Krankheit selbst anerkannt werden könne oder dürfe. Es muß im Gegentheile vielmehr eine gewisse Breite angenommen und zugegeben werden, innerhalb deren Grenze
beide



beide Thätigkeiten gegenseitig fallen und steigen können, ohne daß darum und dadurch im Organismus, als Objekt, eine solche Veränderung hervorgebracht würde, bey welcher die individuelle Existenz desselben nicht länger als solche bestehen kann, und die dann allein erst als Krankheit angesehen und angenommen werden darf und kann.

Zur Krankheit also, von diesem Gesichtspunkte aus die Sache angeschaut, wird erfordert eine solche Regsamkeit des Wechselspiels beider Faktoren des Lebens, daß beide die eben gedachte normale Grenze desselben überschreiten. Sobald nämlich dieses geschieht, erleidet der Organismus als Objekt solche Veränderungen, welche sich mit dem Bestehen seiner Existenz und Individualität gar nicht vertragen. Eben diese Unverträglichkeit mit der Existenz des ganzen Produktes ist es, was erst als Krankheit gefühlt wird, als solche sich darstellt, allein Krankheit ist und heißt; so wie nur dergleichen Veränderungen des Organismus allein als eigentlicher Gegenstand oder nächste Aufgabe der praktischen Heilkunde sich qualifiziret.

§. 14.

Indessen kann es geschehen, daß der Organismus wirklich schon solche Veränderungen, welche zur Krankheit, als solche, erfordert werden, in sich eingeschlossen herumtrage, diese selbst aber für uns noch nicht wahrnehmbar sind. Ein solcher Zustand des Organismus ist zwar, wie es sich von selbst versteht, allerdings auch Krankheit, von der ausgebildeten Krankheit nur dem Grade nach verschieden; allein weil er noch außerhalb der Sphäre unserer Wahrnehmung liegt, und eben
darum

darum mit Zuverlässigkeit keine direkte Behandlung bestimmen läßt, hört er von selbst auf, Gegenstand der Therapeutik zu seyn. Insofern dieser Zustand aber die eigentliche Brücke ist, über welche die im Werden begriffene Krankheit zu ihrer ganz nach Aussenhin und für die Wahrnehmung sich qualifizirende Ausbildung schreitet, verdient derselbe allerdings als ein besonderer Zustand des Organismus berücksichtigt und bemerkt zu werden. Dieser ist es auch, den die bisherige Erregungstheorie ausschliessend mit der Benennung Anlage zur Krankheit belegt hat.

Diesen Zustand gehörig gewürdigt könnte man als Aufgabe, wiewohl nur für die einzige und alleinige, der sogenannten prophylaktischen Heilart gelten lassen und annehmen; wie wohl mit dieser Bestimmung freylich die Prophylaxis eine ganz andere Bedeutung und Richtung erhalten würde, als der Sinn der bisherigen Verfahrensart gleiches Namens sagen wollte, oder ausdrückte.

§. 15.

Ausserdem muß hier auch noch bemerkt werden, daß man ja nicht Krankheit mit Uebelseyn oder Uebelbefinden, so wenig als Gesundheit mit Wohlseyn oder Wohlbefinden verwechseln dürfe, indem gerade dieser Verwechslung die symptomatische Therapeutik grösstentheils ihre Entstehung, ihre nunmehr beynahe ganz unvertilgbare Allgegenwart am Krankenbette, so wie auch all das Unheil, was sie seit ihrer Geburt dafelbst schon angerichtet, zu verdanken hat.

Wohlseyn nämlich bezeichnet an sich weiter nichts anders, als die Uebereinstimmung aller zur Er-

B reich-



reichung und Erhaltung der individuellen Zwecke sowohl des gesammten Organismus, als aller seiner Theilorgane erforderlichen Lebensverrichtungen, die Wahrnehmung des Wohlfeyns aber heisst Wohlbe-
finden, und was unmittelbar das Wohlfeyn setzt, Gesundheit §. 11.

Uebelfeyn dagegen heisst blos die Abweichung in dem normalen Zusammenstimmen der Lebensverrichtungen, das Bewusstseyn desselben Uebelbe-
finden, und woraus im Organismus selbst das Uebel-
feyn unmittelbar hervorgeht, Krankheit. §. 13.

Gesundheit und Krankheit verhalten sich demnach zum Wohlfeyn und Uebelfeyn, wie Inneres zum Aeusseren, wie Materie zur Form, wie Ursache zur Wirkung, oder auch wie Unsichtbares zum Sichtbaren. Daher kann man zur Erkenntniß der Krankheit nur durch Schlüsse kommen, während dem das Uebelfeyn nur durch unsere Sinne erkennbar ist. Aus eben demselben Grunde sollte jeder Arzt nothwendig immer beherzigen, daß ohne gründliche Kenntniß und direkte Behandlung der Krankheit, als der Ursache des vorhandenen Uebelfeyns und der dasselbe charakterisirenden Erscheinungen, letztere zu entfernen durchaus unmöglich sey, daß demzufolge des Arztes erste Angelegenheit diese seyn müsse, die vorhandene Krankheit ausfindig zu machen, ihre bestimmte Individualität kennen zu lernen, und dieser gemäß sein Verfahren einzurichten. Nur auf diese Weise kann der Arzt seiner Heilart das Verdienst der Zweckmäßigkeit, und die Achtung der Vernunftmäßigkeit gewinnen.

§. 16.

Da nun ferner, wie oben gezeigt worden, Sensibilität und Irritabilität die ursprünglichen, folglich auch die gemeinschaftlichen Faktoren alles Lebens, und demzufolge auch jeder individuellen Organisation sind, somit durch diese beiden Momente der Konstruktion der gesammten objektiven organischen Natur zunächst und vorzüglich die nothwendige Synthesis aller Theilorgane des menschlichen Körpers zu einem gemeinschaftlichen Ganzen gesetzt und unterhalten wird; so versteht es sich von selbst, daß, wann und wo mehrmalen schon gedachtes proportionales Verhältniß beider Grundkräfte ursprünglich beträchtlich gestört wird, an dieser Störung eben darum nothwendig alle Theilorgane, obgleich nach verschiedenen Graden, theilnehmen werden und müssen, folglich jede Krankheit immer über den ganzen Organismus sich erstrecken werde.

Anmerkung. Obgleich wir indessen damit stillschweigend zugleich auch den Beweis gegeben haben, daß solche Krankheiten, die man bisher örtliche im Gegensatz von allgemeinen nannte, weder denkbar noch möglich sind, so wünschten wir doch, daß die eben angegebene nähere Bestimmung der Wesenheit der Krankheit überhaupt für nichts anderes als für eine bloße Erörterung unseres vorliegenden Gegenstandes angesehen, keineswegs als Folgerung der Lehrsatz daraus abgeleitet werde, daß folglich alle Krankheiten allgemeine seyen. Wenigstens müßten wir es uns verbitten, einen solchen Satz als einen der Unsrigen anzusehen, indem wir es selbst für höchst vernunftwidrig erklären, von allgemeinen, als gleich-



sam von ganz besonderen, Krankheiten zu sprechen, da wir doch auch anderwärts schon selbst, und zuerst die Unmöglichkeit und somit auch die Nichtexistenz aller bisher angenommenen örtlichen Krankheiten deutlich genug erwiesen haben.

§. 17.

Endlich erleidet zuweilen der Organismus Veränderungen, welche zunächst und vorzüglich seine Form, Mischung, Struktur u. s. w. treffen, hervorgebracht entweder durch irgend eine Krankheit, die eben diesen Veränderungen unmittelbar vorherging, oder bewirkt durch Einwirkung mancherley schädlicher Einflüsse dieser Art. In beiden Fällen müssen aber dergleichen Veränderungen bloß als Krankheits Erscheinungen oder Symptome oder als organische Fehler, keineswegs aber selbst für Krankheiten, als solche angesehen, und eben so, wie §. 15. angemerkt worden ist, im Allgemeinen berücksichtigt werden. Denn

a. Wenn krankhafte Veränderungen der Form und Struktur zu irgend einer Krankheit, als Folgewirkung derselben, sich gesellen, so stehen sie ohnedem mit letzterer in dem Verhältnisse von Ursache und Wirkung, folglich etc, S. §. 15.

b. Sind aber dergleichen Veränderungen bewirkt worden unmittelbar durch Einwirkung äußerer sogenannter eindringender Potenzen z. B. durch schneidende oder stechende Instrumente u. s. w., so müssen sie dennoch gerade wie a. angesehen und behandelt werden. Denn Einmal als eigentliche Krankheits Ursache bewirkt nothwendig jede Verletzung der Form und Struktur des Organismus eine bestimmte Veränderung der Synthesis der organi-



organischen Thätigkeiten d. h. Krankheit, welche als solche nothwendig ihren Karakter dem objektiven Theil des Organismus mittheilt, und aus demselben Grunde in dem ursprünglich verletzten Theile erst Krankheit setzt, sondern die ursprünglich schon erlittene Veränderung seiner Form und Struktur nur noch verstärkt und vergrößert, welche aber, um gehoben zu werden, nothwendig Beseitigung der zwar durch die ursprüngliche Verletzung selbst erzeugten Krankheit erfordert. Zweitens ist ja Form und Struktur des Organismus, so wie überhaupt die thierische Materie an sich schon selbst nur Produkt des Lebens und seiner Faktoren, folglich kann auch keine Verletzung derselben anders geheilt werden, als unmittelbar dadurch, daß man zunächst dahin strebe, die Faktoren des Lebens wieder in das gehörige Verhältniß einer durch sie allein nur möglichen Reproduktion zu setzen.

§ 18

Das Hauptresultat von allem bisher Gefagten ist dieses. Es sind nicht nur allein bloß dynamische Krankheiten möglich und wirklich, sondern jede Behandlung irgend einer Krankheit muß nothwendig nach den Prinzipien der Dynamik gewählt und eingerichtet werden.

§. 19.

Nachdem wir aber bisher bestimmt angegeben haben, was Leben sey, welche Vorstellung wir uns von demselben. sowohl an sich, als auch als Naturerscheinung betrachtet, zu machen haben, welches die allgemeinen Zustände des Lebens seyen, wie wir dieselben anzusehen haben, worin der Grund der Möglichkeit des Lebens



Lebens und seiner Zustände liege, wodurch sich Gesundheit und Wohlfeyn von Krankheit und Uebelfeyn u. s. w. unterscheiden, u. d. gl. m.; so fragt es sich nun noch ferner, was ausserdem noch erfordert werde, daß das Leben so wie seine Zustände, welche wir bisher blos in der Möglichkeit ihrer Konstruktion angeschaut haben, auch in der Wirklichkeit, als solche sich darstellen, und in der ihnen eigenthümlichen Beschaffenheit sich wirklich auch erhalten oder fixiren können.

§. 20.

Die Natur nämlich besteht überhaupt nur im Streite mit sich selbst. Stets trennend, was sie vereinigen will, nicht findend, was sie sucht, ewig mit sich selbst entzweiet, versichert sie sich dessen, was sie am wenigsten liebt, nämlich des Lebens um so mehr, je mehr sie es flieht, indem ausserdem alle ihre unendlich viele Anstalten und Operationen, welche sie mit eben so vielen für sich bestehenden Formen bezeichnet, gerade und eigentlich nur dahin abzuwecken, Ruhe zu finden. Sie sucht daher in dem stets regen Antagonismus die größte Harmonie, sie sucht und führt Krieg nur um den Frieden zu erringen. Gelänge ihr dieses, die absolute Harmonie zu Stande zu bringen, so wäre zwar der ewige Friede der Natur gesichert; allein damit hätte sie auch ihr Ende erreicht; es wäre ihr letztes gewesen; sie hätte ihr Grab in und durch sich selbst gefunden, aber damit wäre auch sogleich ihr Andenken auf ewig erloschen.

§. 21.

§. 21

Das eben Gesagte nunmehr auf unsern Gegenstand zunächst angewendet, will dasselbe eigentlich soviel sagen. — Wenn Leben bestehen soll, so muß der organische Gegensatz in stets reger Wirksamkeit vorhanden seyn, die Faktoren desselben, d. h. Sensibilität und Irritabilität, müssen ununterbrochen gegen einander ankämpfen, und sich differenziren.

Allein da beide Thätigkeiten eben aus Ursache ihrer wechselseitig sich entgegengesetzten Tendenzen, sich selbst und allein überlassen, nothwendig sich gegen einander ausgleichen, in das absolute Gleichgewicht mit einander sich setzen werden, damit aber der Tod sich einstellen würde; so folgt, daß, um diesen zu verhüten, oder das Leben überhaupt zu erhalten, beständig die gedachte, und zum Leben selbst absolut erforderliche Entzweyung der organischen Natur mit sich selbst unterhalten werde.

§. 22.

Nun aber ist dieses auf keine andere Art begreiflich, so wenig als möglich, als (wie ich in meinem Entwurfe etc. Th. I. ausführlich bewiesen habe)

a) Gleichfalls nur durch eine Thätigkeit; indem keine Thätigkeit als solche, was doch die beiden Faktoren des Lebens sind, anderst, als wieder durch eine Thätigkeit in Wirksamkeit gesetzt werden;

b) Durch eine Thätigkeit, deren Tendenz gerade jener zunächst der organischen Thätigkeit entgegengesetzt ist, weil ohne Entgegensetzung keine Erregung weder denkbar, noch möglich ist;

c)



c) Durch eine Thätigkeit, welche auſſerhalb der individuellen Sphäre des Organismus liegt, d. h. durch eine äußere Thätigkeit, indem nur dasjenige, was von der Sphäre eines Andern ausgeſchloſſen iſt, demſelben reel entgegengeſetzt ſeyn kann, widrigenfalls Letzteres mit dem Erſteren ſich identifiziren, oder vielmehr ganz identisch ſeyn würde.

Da nun Thätigkeiten dieſer Art, was ſich nunmehr leicht begreifen wird, nur der äußern oder auch ſogenannten unorganischen Natur angehören; ſo bedarf es gegenwärtig hoffentlich keiner weitem Beweisführung, daß demnach der unmittelbare und zureichende Grund der Wirklichkeit, oder was mit einem Worte daſſelbe ſagt, die eigentliche Urfache des wirklichen Lebens in der anorgiſchen oder äußern Natur, oder in den äußeren erregenden Potenzen liege, und nur allda allein geſucht werden dürfe, ſo wie er auch in demſelben allein nur ſicher gefunden werden kann.

§. 23.

Indeſſen ſind nicht immer und auch nicht alle äußere erregende Potenzen oder Einflüſſe auf den Organismus darun, weil ſie dieſelben ſind, geradezu und unbedingt vermögend, Erregung des organiſchen Gegenſatzes hervorzubringen. Es hängt im Gegentheile vielmehr, und zwar zunächſt und allein von der individuellen Beſchaffenheit der organiſchen Funkzionen, und zwar inſbeſondere derjenigen ab, welche dem Organismus die Rezeptivität für äußere Eindrücke, ſo wie die Affizirbarkeit überhaupt, ertheilt, indem bey'm gänzlichen Mangel derſelben auch die ſtärkſten Eindrücke
nicht



nicht im Mindesten Erregung in dem Organismus zu bewirken imstand sind; ausserdem das selbst der vorhandene Grad der Affizirbarkeit eines organischen Individuums allein die Stärke möglicher Erregung durch irgend eine Einwirkung von Aussen auf den Organismus in demselben bestimmt.

§. 24.

Demnach müssen wir also annehmen, das Receptivität für äussere Einflüsse und ein derselben entsprechender Grad der Stärke äusserer Einwirkungen die beiden Bedingnisse sind, von welchen Leben, somit auch Gesundheit und Krankheit überhaupt in der Wirklichkeit bedingt sind und abhängen.

Wirkliches Leben, so wie auch Gesundheit und Krankheit, wären dem zufolge die unmittelbaren Resultate und Ausdrücke der Gegenwirkung des lebenden Organismus gegen die Einwirkungen der äusseren Natur.

§. 25.

Wirkliche Gesundheit existirt daher nur so lange, als die Stärke der äusseren Einflüsse gerade so gross ist, das bey deren Einwirkung diejenige Proportion der organischen Thätigkeiten, bey welcher die Individualität des Organismus, als solchen allein nur bestehen kann, und sie dieselbe bleibt, unverletzt vorhanden seyn kann.

Da nun derjenige Grad des Differenzverhältnisses der organischen Thätigkeiten, welcher die Gesundheit überhaupt bezeichnet, unter allen möglichen Graden der Differenz derselben in die Mitte fällt, d. h. der mittelmässige ist; dieser aber nur bey einer gleichmässig starken Einwirkung von Aussen auf derselben Stufe erhalten.



halten werden kann; so begreift es sich leicht, was man damit sagen wolle, wenn man behauptet, daß Gesundheit nur bey einer mittelmäßigen Gewalt äußerer Einflüsse, so wie nur bey einem mittelmäßigen Grade der Differenz beider Thätigkeiten, oder was dasselbe heißt, der Erregbarkeit, bestehen könne.

Anmerkung. Nur müssen wir bemerken, daß der mittelmäßige Grad der Erregbarkeit bey allen organischen Individuen nicht ein und derselbe sey, sondern daß bey den unzähligen Bestimmungen derselben, und selbst in demselben Subjekte zu verschiedenen Zeiten und bey verschiedenen Umständen ein ganz verschiedener Grad der Erregbarkeit gerade der mittelmäßige sey, (§. 13. und mein Entwurf Th. II. §. 273 — 278. 835. 836.) so wie darnach auch die Gewalt der äußern Einflüsse geschätzt werden muß, um gerade die mittelmäßige aufzufinden.

§. 26.

Sobald dagegen auf irgend eine Weise veranlaßt, die Gewalt der äußeren Einflüsse auf den Organismus von dem Grade ihrer Mittelmäßigkeit §. 25. abweicht d. h. entweder übermäßig und zwar dem Individuum angemessen, in beträchtlichem Grade vermehrt oder vermindert wird, so wird sogleich und nothwendig die Proportion der beiden im Leben ununterbrochen sich differenzirenden Thätigkeiten, oder Faktoren des Lebens, der Erregbarkeit und Erregung aufgehoben, Disproportion zwischen denselben gesetzt, und mit derselben sogleich und eben so nothwendig die Individualität und Existenz des ganzen Produktes verändert, d. h. Krankheit erzeugt.

Krank-



Krankheit entsteht also nur dann, wenn zwischen den Faktoren der Erregung, als der Grundform aller organischen Erscheinungen, d. h. zwischen Sensibilität und Irritabilität Disproportion gesetzt wird, bewirkt oder verursacht durch Veränderung der normalen Stärke äusserer Einflüsse (§. 25. Anmerkung.)

Demnach müssen wir also vorsichtig und genau die Ursache der Krankheit überhaupt von den eigentlichen Faktoren derselben unterscheiden, und am Krankenbette immer gehörig von einander trennen.

§. 27.

Da nun aber Krankheit überhaupt entsteht, je nachdem auf irgend eine Weise Disproportion zwischen den Faktoren der Erregung gesetzt wird, dieses aber hinwiederum von der gemeinsamen Wirksamkeit aller äusserer Einflüsse auf den Organismus abhängt; so versteht es sich von selbst, dass die Lehre von der Entstehung der Krankheit, wenn sie ihre Aufgabe gehörig und vollkommen lösen wolle, sich vorzüglich und zunächst darauf einlassen müsse, bestimmt darzuthun,

- a) Welches die Hauptklassen der möglichen Disproportionen der Faktoren der Erregung seyen,
- b) Welches die unmittelbare Wirkungsarten der gewöhnlichsten äusseren Einflüsse auf den Organismus seyen.

§. 28.

Den ersten Punkt anlangend, bedarf es wohl gegenwärtig keines weitem Beweises mehr, dass vernünftiger Weise nur sovieler Hauptklassen von Krankheiten im Organismus, aber auch nur sovieler allein angenommen werden können, als überhaupt die Faktoren



ren der Krankheit sowohl an und für sich!, als in ihrem normalen Verhältnisse zu einander wesentlich verschiedene Veränderungen erleiden können, nämlich zwey; indem Sensibilität und Irritabilität, durch welche der ganze Kreis des Organismus beschloßen ist, als Thätigkeiten nur Gradeveränderungen ihrer Energie oder Intensität einzig und allein zulassen, und alle mögliche Veränderungen derselben bloß auf Grade Erhöhung oder Verminderung allein reduzirbar sind.

§. 29.

Infofern nun aber die organischen Erscheinungen, somit auch die Krankheit, als Naturerscheinung betrachtet, zunächst und unmittelbar durch denjenigen Faktor der Erregung, welcher dem Organismus den aktiven Karakter mittheilt, im Aeusseren und für die Wahrnehmung dargestellt werden, nämlich durch die ausschliessend sogenannte organische Thätigkeit oder durch die Irritabilität, folglich am zweckmässigsten zunächst die Bestimmung der Charaktere, mit welchen beide Hauptklassen von krankhaften Veränderungen im Organismus sich äussern, von der der Irritabilität allein eigenthümlichen Bestimmung hergenommen werden; die Irritabilität aber vorzüglich die Stärke der Lebensbewegungen setzt und bedingt, während dem dagegen die Sensibilität bloß die Leichtbeweglichkeit des Organismus übernommen und sich angeeignet hat; eben gedachte organische Thätigkeit aber, (sonst auch Vorzugsweise Energie des Organismus genannt,) hinwiederum gleichfalls nur allein Vermehrung oder Verminderung ihrer Intensität fähig ist; so wird es begreiflich seyn, wenn und warum wir behaupten, daß die eine
die-



dieser beiden Hauptklassen von Krankheiten durch Vermehrung, die andere dagegen durch Verminderung der Stärke oder inneren Energie des lebenden Organismus sich charakterisiren, und eben dadurch, aber auch nur gerade dadurch von einander wesentlich sich unterscheiden.

§. 30.

Ziehet man hierbey nun noch in Betracht, daß Irritabilität und Sensibilität immer im umgekehrten Verhältnisse zu einander stehen, somit wie die Intensität der einen Thätigkeit zunimmt, die der andern abnehme, oder die eine steigt, die andere sinke, (§. 13.) so wird man die nähere Bestimmung der innern Beschaffenheit beider Hauptklassen der Krankheiten damit sogleich auch auffinden, nämlich daß bey der einen Hauptklasse derselben, während dem die Irritabilität steigt oder erhöht wird, die Sensibilität sinken oder herabgestimmt werde, bey der andern aber umgekehrt, während dem die Irritabilität sinket oder herabgestimmt wird, dagegen die Sensibilität steigen oder erhöht werde.

§. 31.

Will man nunmehr die eine Hauptklasse der Krankheiten durch die Benennung Sthenie, die andere im Gegensatze aber mit der Benennung Asthenie bezeichnen; so läßt sich nicht nur das bisher §. 28.-30. Ausgesprochene unter den einen Hauptsatz zusammenfassen, nämlich, daß alle nur möglichen Krankheiten auf Sthenie und Asthenie allein sowohl sich reduzieren lassen, als auch darauf allein nur reduziert werden können und müssen;
sondern



sondern es ist damit nunmehr zugleich auch mit bestimmt, was man sich eigentlich unter Sthenie und Asthenie vorstellen müsse.

Sthenie nämlich soll und darf nichts anderes bezeichnen, als bloß Krankheit der erhöhten Irritabilität und herabgestimmten Sensibilität.

Asthenie dagegen gleichfalls nichts anders, als bloß: Krankheit der herabgestimmten Irritabilität und erhöhten Sensibilität.

§. 32.

Wollte man außerdem noch, um den Unterschied beider Hauptklassen der Krankheiten theils im Kürzern, theils auch auf eine noch leichter faßliche und andere Art anzugeben, insbesondere darauf Rücksicht nehmen, daß bey jeder derselben immer eine andere der beiden organischen Thätigkeiten Vorzugsweise erhöht sey, folglich über die andere prädominire, und eben darum alle krankhaften Erscheinungen jedesmal den eigenthümlichen Charakter der gerade prädominirenden Thätigkeit an sich tragen, und in der Wirklichkeit wahrnehmbar darstellen; und wollte man dann demzufolge dieselbe jedesmal prädominirende Thätigkeit bloß des Vorzugs und der Unterscheidung wegen den eigentlichen Faktor eben dieser Krankheit nennen; so würde man sich über den Unterschied beider Hauptklassen der Krankheiten auch auf diese Weise ausdrücken, und erklären können. Nämlich

- a) Sthenie ist diejenige Krankheitsklasse, deren Faktor die Irritabilität ist;
- b) Asthenie dagegen aber diejenige, deren Faktor die Sensibilität ist.

Dem.



Demnach würden wir also die Irritabilität als den Faktor der Sthenie, die Sensibilität dagegen als den Faktor der Asthenie uns vorstellen müssen.

§. 33.

Bey allen dem aber müssen wir jedoch genau bemerken, daß in sthenischen Krankheiten nicht jederzeit, und auch nicht durchaus, d. h. vom Anfang bis zur größten Höhe derselben, oder durch ihren ganzen Verlauf hindurch, die Energie der Irritabilität in ihren beiden Funkzionen (§. 5.) d. h. extensiv und intensiv, zugleich und gleichmäfsig verstärkt werde, oder daß die Stärke der Lebens Bewegungen mit der Zunahme der innern Energie der Irritabilität nicht im gleichem Grade immerhin vermehrt werde,

die extensive oder relative Verstärkung der Irritabilität nämlich hält mit der intensiven oder absoluten Potenzirung oder Zunahme der Energie derselben gleichen Schritt nur bis zu einem gewissen Punkt in dem ganzen Verlauf der Sthenie, welchen wir, da er gerade in die Mitte desselben fällt, den Mittelpunkt der Sthenie nennen wollen. Ueber diesen Punkt hinaus kehrt sich das gedachte Energie Verhältniß der gegenseitigen Funkzionen der Irritabilität zu einander um, und mit diesem zugleich auch die Form, so wie nothwendig gleichfalls auch die Konstrukzion der Sthenie überhaupt. Nämlich die Intensität derjenigen Funkzion der Irritabilität, wodurch sich dieselbe nach Aussen setzt, nimmt von diesem Mittelpunkte sthenischer Krankheiten an ab, oder mit andern Worten: die Irritabilität wird *relativ depotenzirt*; während die Energie der andern Funkzion, wo die Irritabilität nach Innen des Organis-



mus wirkt, im gleichen Grade mehr und mehr zunimmt, oder während die Irritabilität *absolut potenzirt* wird.

§. 34.

Eben dieser Umstände wegen sowohl, als auch aus Ursache der absolut nothwendigen Berücksichtigung derselben zu nächst in therapeutischer Hinsicht wäre es nicht allein blos rathsam, sondern es ist vielmehr durchaus nothwendig, beide Hälften der Sthenie, als ganz besondere, und, wenn auch nicht dem Wesen, dennoch der Form und dem Grade nach von einander verschiedene Ereignisse innerhalb der Sphäre einer und derselben Klasse der Phänomene der organischen Natur, eben darum nicht nur besonders zu bemerken, sondern gleichfalls auch jede dieser beiden Grundformen sthenischer Krankheiten besonders noch zu bezeichnen.

Wollte man demnach für die erste Hälfte des Verlaufes sthenischer Krankheiten die Benennung reine Sthenie d. h. durch die gedachte Umkehrung der Funktionen der Irritabilität noch nicht getrübt Sthenie gelten lassen; so würde man meines Erachtens zur Bezeichnung der zweiten Hälfte derselben, welche doch nur die höheren, über dem Mittelpunkte sthenischer Krankheit hinaus liegenden Grade der eigentlichen Sthenie in sich begreift, oder um die während des Verlaufes sthenischer Krankheiten vorkommende relative Depotenzirung der Irritabilität bey gleichzeitig und gleichmäßig zunehmender absoluten Potenzirung derselben genau zu bezeichnen am besten und zweckmässigsten dafür die Benennung Hypersthenie wählen. Wenigstens werden wir uns im Ver-
folge



folge dieser Schrift an eben diese Bestimmungen, so wie auch an die dafür angenommenen Benennungen genau halten.

§. 35.

Auf dieselbe Weise, wie mit der Irritabilität bey der Sthenie, verhält es sich auch mit der Sensibilität bey der Asthenie. Das heisst soviel: nicht unbedingt, nicht immerhin, und auch nicht vom Anfang bis zum Ausgang asthenischer Krankheiten bleiben beide Funkzionen der Sensibilität (§. 5.) in Betreff ihrer Intensitäten sich gleich; sondern sobald die Asthenie gleichfalls den Mittelpunkt ihres Verlaufes erreicht hat, nimmt die nach Aufsen gehende Funkzion derselben, nämlich die Rezeptivität im gleichen Grade ab, d. h. wird die Sensibilität im gleichen Grade extensiv oder relativ depotenzirt, als die Asthenie höher steigt, während dem im umgekehrten Verhältnisse die Intensität der nach Innen gehenden Funkzionen gleichmässig zunimmt, d. h. die Sensibilität intensiv oder absolut im gleichen Grade potenzirt wird.

§. 36.

Aus gleichem Grunde, wie bey der Sthenie (§. 34.) müssen wir daher nothwendig auch bey der Asthenie in Rücksicht des Verlaufes derselben zwey Hälften der Asthenie unterscheiden, und jede derselben besonders bezeichnen, und zwar würde man hier, wenn man die erste Hälfte asthenischer Krankheiten ausschliessend die reine Asthenie nennen wollte, die zweite Hälfte derselben am besten mit der Benennung Hyperasthenie belegen.



§. 37.

Dieses vorausgesetzt, ergiebt sich also, daß wir neben den zweyen Hauptklassen der Krankheiten auch noch vier Gattungen derselben annehmen müssen, wovon jede Hauptklasse zwey Gattungen in sich begreift, nämlich :

- a) Zerfällt die Sthenie in die
 - α) Reine Sthenie und
 - β) Hypersthenie.
- b) Zerfällt die Asthenie in die
 - α) Reine Asthenie, und
 - β) Hyperasthenie.

§. 38.

So wichtig und nothwendig indessen zum Behuf der richtigen Konstrukzion irgend einer Krankheit die Kenntniß, Berücksichtigung und Anwendung aller bisher in diesem Kapitel vorgetragenen Momente, Lehr- und Grundsätze ist, so wenig vermögen dennoch dieselben den Arzt am Krankenbette ganz zubefriedigen, und ihm alle diejenigen Vortheile zu gewähren, welche sie ausserdem, nur in näherer Beziehung genommen, demselben zu verschaffen fähig sind. Denn bis itzt haben wir den lebenden Organismus, so wie auch Leben, Gesundheit und Krankheit bloß im Allgemeinen aufgefaßt und betrachtet, ohne noch der besondern Individualität des menschlichen Organismus, so wie er sich nämlich in der Wirklichkeit und in seiner Besonderheit ausspricht und darstellt, auch nur mit einem Worte gedacht zu haben; da doch gerade dieser Umstand den Arzt, als solchen, und ins Besondere den klinischen Arzt am Meisten intressiret; indem derselbe zunächst mit dem

be-

besondern Organismus, so wie auch nur mit bestimmten individuellen Krankheitsfällen allein es immer zu thun hat, und eben darum ohne nähere Bekanntschaft mit der Besonderheit des menschlichen Organismus nicht nur alle Augenblicke sich selbst in der trostlosesten Verlegenheit versetzt fühlen, sondern bey der alleinigen Kenntniß der bisher erörterten bloß allgemeinen Ansicht des Organismus, Lebens und seiner Hauptzustände ein eben so oberflächlicher gelehrter Arzt, als auch unsicherer Heilkünstler seyn und bleiben, und eben in dieser allgemeinen Nacht blindlings herumtappen wird, ohne je am Krankenbette, selbst bey den unbedeutendsten Vorfällen seiner Sache gewiß zu seyn, noch vielweniger sich oder andern über sein Heilverfahren vernünftigen Aufschluß, oder die erforderliche Rechenschaft geben zu können.

Demnach müssen wir also, und um die wichtigste Forderung, welche wir und andere an die Heilkunde zu machen nicht nur berechtigt, sondern vielmehr verpflichtet sind, zu erfüllen, zugleich auch nunmehr den Organismus in seiner Besonderheit kennen zu lernen suchen, dabey aber auch darthun, wie derselbe in seinem individuellen Leben und dessen Hauptzuständen sich ausweise und angeschaut werden müsse.

§. 39.

Nachdem wir nun aber oben §. 8 — 11. gezeigt haben, wie die beiden ursprünglichen Thätigkeiten der organischen Natur und derer Konstrukzion zu einander sich verhalten, nämlich daß sie im Zustande des Lebens nicht allein einen zum Leben zunächst erforderlichen Gegensatz im Organismus bilden, ununterbrochen ge-




genfeitig ſich differenziren, ſondern gleichfalls auch beſtändig nach einer gemeinſchaftlichen Indifferenz ſtreben; ſo fügen wir hier noch die Bemerkung hinzu, daß, ſo wie alles Objektive in der Natur, oder irgend ein Produkt nur durch das Gleichgewicht der daſſelbe konſtruirenden Thätigkeiten möglich iſt und zu Stande kömmt, gleichfalls auch in dem Zuſtande gedachter Indifferenz nicht nur beide urſprüngliche organiſche Thätigkeiten, nämlich Senſibilität und Irritabilität, mit dem gemeinſchaftlichen Karakter der Produktion oder Produktivität d. h. als Produktionskraft ſich äußern, ſondern dann erſt der Organismus, als wirkliches Objekt oder Produkt zum Vorſchein komme.

§. 40.

Indeſſen kann und darf dieſer Zuſtand der Indifferenz nicht für immer beſtehen, weil in demſelben die organiſche Thätigkeiten ſich kompensiren, und damit der Organismus ſich in ſich ſelbſt verlieren, ſomit aufhören würde, ſein eigenes Objekt, d. h. Organismus zu ſeyn §. 9; ſondern wenn nach Vollendung der Produktion der Organismus noch beſtehen, das Leben noch fortdauern ſoll, ſo muß eben dieſer Indifferenzzuſtand beſtändig geſtört, kontinuierlich aber auch wieder hergeſtellt werden, der Organismus muß in ſich ſelbſt zurückkehren, das Produzirte muß ſelbſt wieder Bedingung ſeiner eigenen Produktion, der Selbſtproduktion des Organismus überhaupt werden oder was daſſelbe ſagen will: der Organismus muß beſtändig ſich ſelbſt reproduziren, ſomit die Produktionskraft eine Reproduktionskraft werden.

§. 41.



§. 41

Die nähere Bestimmung der eigentlichen Ansicht des menschlichen Organismus, als Produkt von bestimmter Art, und wie er sich vorerst als solches in der Wirklichkeit verkündet, betrachtet, wäre also diese, daß Sensibilität, Irritabilität und Reproduktionskraft die drey Grundkräfte seyen, auf welchen Konstruktion so wie das Bestehen der Individualität des menschlichen Organismus sowohl überhaupt, als aller seiner besondern Erscheinungen gegründet ist.

§. 42.

Jede individuelle Organifazion wäre demnach an sich weiter nichts anderes, als der gemeinschaftliche Ausdruck einer bestimmten proportionalen Mischung eben dieser drey Grundkräfte, welche sich gegenseitig auf eine bestimmte Sphäre beschränken; jede Sphäre wäre aber dann selbst wieder nur etwas Beharrendes, in dem Konflikte eben dieser organischen Grundkräfte Entstandenes, gleichsam das Residuum des Wechselspiels derselben.

§. 43.

Jede dieser Grundkräfte äußert sich nicht nur in einer bestimmten nothwendigen Handlung, welche, da sie aus dem organischen Konflikte nothwendig resultiren, als Funkzionen des Organismus angesehen werden müssen; sondern alle diese Funkzionen, da sie aus dem Wesen des Organismus hervorgehen, müssen eben darum allen organischen Individuen gemein seyn, so zwar, daß alle Verschiedenheit im organischen Naturreich, somit aller besondern Organifazion, einzig und allein nur auf der Verschiedenheit der Proportion dieser Funkzionen beruht.

§. 44.




§. 44.

Infofern nun aber alle diese Funkzionen sich entgegengesetzt sind, folglich eine die andere von sich ausschliesst, somit dieselben so wenig absolut, als in einem und demselben Individuum vereinigt seyn können; so folgt nicht nur hieraus, sondern es ist auch zugleich erklärbar, dass und warum zunächst der menschliche Organismus, in welchem nothwendig alle diese Funkzionen vereinigt gegenwärtig sind, aus mehreren einzelnen Individuen zusammen bestehe, welche, da sie zusammenwirken, um jene Einheit des Organismus zu erhalten, und beständig zu reproduziren, wie Ursache und Wirkung ihrer Thätigkeiten zu einander sich verhalten, nicht nur eben so viele und besondere Systeme oder Organe darstellen, sondern dieselben verschiedenen Funkzionen einzeln sich angeeignet haben.

§. 45.

Eben darum ist auch, obgleich in jedem Systeme und Theilorgane des menschlichen Organismus nothwendig alle Funkzionen zugleich vorhanden sind, dennoch nicht nur von denselben Eine die herrschende sondern gerade durch den Charakter derselben vorherrschenden Funkzion von den uebrigen Organen unterschieden. — Wann und wo daher

a) In dem menschlichen Organismus die Sensibilität das Uebergewicht vor den übrigen ihr gleichzeitig koexistirenden Funkzionen erlangt, muss nothwendig auch ein besonderer Organismus hervortreten, der gleichsam allein nur Sensibilität ist, oder die Sensibilität zunächst und Vorzugsweise sich angeeignet hat; und darum das sensible System heissen kann. Ein solcher




cher Organismus ist auch das Gehirn und Nervensystem. (S. meinen Entwurf, Th. II.)

b) In demselben Verhältnisse dagegen, als irgendwo im Organismus die Irritabilität das Vorspiel über den übrigen Funktionen hat, muß ein Organismus hervortreten, welcher gleichsam allein nur Irritabilität ist, und demjenigen, welcher nur Sensibilität ist, koexistirt, und das Gleichgewicht hält; und eben darum gleichfalls das irritable System genannt werden kann. Ein solcher Organismus ist nun das Herz, und seine Fortsetzungen, die Arterien, Muskeln u. s. w. (S. meinen Entwurf, Th. II.)

c) Da nun endlich, damit es zu wirklichen Produkten in der organischen Natur kommen könne, Sensibilität und Irritabilität sich synthetisiren und indifferenziren müssen, (§. 39.) was aber aus der Synthese dieser beyden, in welcher sie nothwendig erlöschen, hervorgeht, die Reproduktionskraft ist (§. 40); so wird dieselbe nicht nur in irgend einem Theile des Organismus vor den beyden erst genannten Funktionen die Vorherrschaft besitzen, sondern derselben zugleich auch ein individueller Organismus korrespondiren, welcher sich ausschliessend die Reproduktionskraft angeeignet hat, und eben das reproduktive System genannt zu werden verdient. Ein solcher Organismus sind alle Organe der Digestion und Nutrizion. (S. meinen Entwurf, Th. II.)

§. 46.

Eben diese drey Hauptsysteme konstituiren und vollenden erst den lebenden Organismus sowohl in seiner Totalität, als auch jedes einzelne Organ desselben, so



so zwar, daß nicht nur jedes dieser Systeme in die Konstruktion jedes individuellen Organs nothwendig mit eingeht, sondern sogar jedes der individuellen Organe als demjenigen Systeme angehörig angenommen werden muß, dessen Funktion den größern Antheil vor den übrigen an der Konstruktion desselben hat, wie z. B. die Sinnesorgane zu dem sensibeln, die Muskeln zu dem irritabeln, der Darmkanal zu dem reproduktiven Systeme gerechnet werden.

§. 47.

Da nun diese Funktionen, oder ihre Phaenomene, nämlich die gedachten Hauptsysteme in einem gewissen Kausalitäts-Verhältnisse gegen einander stehen, (§. 44.) d. h. wechselseitig sich bedingen und bestimmen, so begreift es sich von selbst, daß das individuelle Leben zunächst des menschlichen Organismus nur solange bestehen könne, als eben diese Funktionen noch gegenseitig auf einander einwirken, und sich ihre Individualitäten wenigstens einiger Massen noch erhalten und verbürgen können.

§ 48.

Eben so versteht man eigentlich unter Gesundheit des menschlichen Organismus ins Besondere weiter nichts anderes, als das Vorhandenseyn derjenigen Proportion der organischen Funktionen, bey welcher allein nur die Individualität des menschlichen Organismus bestehen kann; (§. 13.) daher gerade nur solange, als jene gegenwärtig ist, auch diese oder die Gesundheit sich erhalten kann. Dasselbe gilt auch von jedem einzelnen Theilorgane desselben Organismus.



Sobald dagegen gedachte Proportion auf eine mit der Individualität oder Existenz unverträgliche Weise gestört und verändert wird, entsteht Krankheit des menschlichen Organismus; somit heißt Krankheit des menschlichen Organismus jede mit der Existenz desselben durchaus unverträgliche Veränderung der normalen Proportion seiner individuellen Funktionen; (§. 13.) gleichviel ob dieselbe den gesammten Organismus, oder eines seiner besondern Organe treffe.

§. 49.

Nicht gleichviel aber ist es, so wenig als dem gründlichen und vernünftigen Arzte gleichgültig, zu wissen, welche der drey organischen Funktionen in vorkommenden Krankheitsfällen vorerst, unmittelbar und am heftigsten durch die Einwirkung derjenigen Einflüsse, welche die vorliegende Krankheit herbeygeführt haben, angegriffen worden sey, oder auf welches System die eigentliche Krankheitsursache vorerst, unmittelbar und am heftigsten eingewirkt habe; indem, obgleich keine dieser Funktionen in irgend einem Theile des menschlichen Organismus ohne gleichzeitige Affektion auch der beyden andern Funktionen verändert werden kann, dennoch die direkt oder am stärksten angegriffene Funktion oder deren System als primäre Affektion oder Ursache der anderweitigen, derselben zwar koexistirenden, krankhaften Veränderungen der beyden andern Funktionen oder deren Systeme angesehen und in Anschlag gebracht werden muß, in welchem Falle dann die krankhaften Affektionen der übrigen beyden Funktionen



zionen nur für secundäre Wirkungen, oder nur für Symptome der erst angegriffenen Funkzion gelten können und betrachtet werden müssen.

§. 50.

Da nun eines Theils jedes der besondern Systeme zur Erhaltung seiner Individualität und Integrität eines gewissen, bestimmten qualitativen Reitzes bedarf, andern Theils aber auch andere äussere Einflüsse zufällig gerade auf dieses oder jenes System mehr direkt und bey weitem mit grösserer Heftigkeit, als auf die beyden übrigen Funkzionen oder Systeme einwirken können, folglich so wie im letzten Falle eben so auch im ersten Falle, nämlich entweder bey Verstärkung oder bey Verminderung der Gewalt desselben qualitativen Reitzes gerade die gemeinte Funkzion, oder das derselben entsprechende System zunächst vorzüglich und anfänglich auch am Meisten angegriffen seyn wird; so wird nothwendiger Weise die auf diese Art hervorgebrachte Krankheit, der Art nach wenigstens, von derselben Krankheit, wenn sie eine andere Funkzion ursprünglich befallen hat, eben so von letzterer verschieden seyn, oder sich unterscheiden, wie die bewussten organischen Funkzionen selbst von einander.

§. 51.

Giebt man nun zu, dass alle noch so individuellen Funkzionen des menschlichen Organismus auf Sensibilität, Irritabilität und Reproduktionskraft, so wie alle noch so verschiedene und kleine Organe auf die drey Hauptsysteme, nämlich auf das sensible, irritable und reproduktive System sich zurückführen lassen; so bedarf es wohl nach der (§. 49. 50.) angegebenen Erörterung
keiner



keiner weitem Dedukzion, um sich überzeugen zu können, daß man außer den Hauptklassen §. 29. 30. und außer den Gattungen der Krankheiten §. 37. nicht nur auch noch gewisse und besondere *Arten der Krankheiten* anerkennen, sondern daß die Bestimmung derselben allein von der Verschiedenheit der drey Hauptfunktionen oder Hauptsysteme des Organismus entlehnt, und darnach ausgesprochen werden müsse.

§. 52.

Demnach würden wir also, was aber zunächst in Betreff asthenischer Krankheiten zu bemerken von der größten Wichtigkeit ist, die Krankheiten ihrer möglichen Arten nach eintheilen in

- a) Krankheiten des sensibeln Systems oder sensibler Art,
- b) Krankheiten des irritablen Systems, oder irritabler Art, und
- c) Krankheiten des reproduktiven Systems, oder reproduktiver Art,

§. 53.

Alle diese Krankheits Arten sind übrigens aller der Veränderungen fähig, welche die Sthenie und Asthenie während ihres Verlaufes erleiden können §. 37. Daher giebt es eben so gut sthenische und hypersthenische Krankheiten sowohl des irritablen, als reproduktiven Systems etc. als häufig, wiewohl bisher ganz und gar verkennt, Asthenie und Hyperasthenie sowohl von sensibler als irritabler und reproduktiver Art am Krankenbette vorkommen, und nicht gehörig berücksichtigt, sowohl zu falschen Konstruktionen, als auch zu zweckwidrigen Behandlungsarten vorliegender Krankheiten verleiten.

§. 54.



§. 54.

Indessen können wir von allen diesen Kenntnissen dennoch nicht den gehörigen und erwünschten Gebrauch machen, so wenig als die möglich grossen Vortheile davon ziehen, solange wir nicht auch zugleich genau davon unterrichtet sind, *wie Krankheit überhaupt entstehe*, auf welche Sthenie und Asthenie sowohl im Allgemeinen, als auch in seinen besondern Modifikationen, so wie auch deren besondere Arten erzeugt werden können.

Da ich mich aber übrigens der hier nöthigen Kürze wegen auf die Ausführung der Gesetze der Entstehungsarten aller dieser Krankheiten dieses Ortes nicht einlassen kann, so verweise ich vielmehr meine Leser deshalb auf meinen Entwurf Th. I. und begnüge mich hier blos damit, einige allgemeine Winke zur Leitung des Ganzen anzugeben.

§. 55.

Ueberhaupt genommen nämlich müssen wir, was wir früher schon (§. 22.) bewiesen haben, vor Allem hier bemerken, daß, so wenig als Leben überhaupt ohne Einwirkung von Aussen möglich ist, gleichfalls auch ohne dieselbe keine Krankheit entstehen könne. Allein da die Gewalt der äussern Einflüsse immer nur eine relative und keine absolute ist, sondern von dem gerade vorhandenen Erregbarkeitsgrade des zu affizirenden organischen Individuums abhängt, so müssen wir dennoch zum Behuf der gehörigen Einsicht in die Entstehungsart der Krankheit überhaupt wissen, ob, in wiefern und wieviel die organische Erregbarkeit zu derselben beytrage: daher im Allgemeinen folgende Bemerkungen

kungen zu der Berichtigung dieses Umstandes dienen können.

§. 56.

Sensibilität und Irritabilität nämlich stehen bekanntlich immer in einem umgekehrten Verhältnisse zu einander. Je größer daher der Grad der Rezeptivität eines organischen Individuums ist, desto geringer ist nicht nur die Energie der eigentlichen organischen Thätigkeit desselben, sondern desto leichter kann auch dieselbe in Aktivität überhaupt gesetzt, und eben darum desto leichter zu einem solchen Grade von Energie potenziert werden, welcher sich mit der Existenz desselben nicht wohl verträgt, d. h. desto leichter kann Krankheit erzeugt werden. Desto schwerer dagegen, je geringer der Grad der Rezeptivität eines organischen Individuums ist, weil der zur leicht möglichen Entstehung der Krankheit erforderliche Grad von Rezeptivität, welche doch allein die Möglichkeit der Einwirkung äußerer Einflüsse auf den Organismus vermittelt, demselben mehr oder weniger entgeht.

§. 57.

Da indessen eine gewisse Breite zugegeben werden muß, innerhalb deren Grenze jenes bekannte Wechselspiel der beyden Faktoren der Erregbarkeit verändert werden kann, ohne daß darum sogleich auch krankhafte Veränderungen im Organismus, als Objekt, erfolgen müssen, so folgt, daß nicht jede Einwirkung von Außen sogleich auch Krankheit im Organismus hervorbringen könne, müsse oder werde; sondern damit dieses geschehe, müssen die schädlichen Einflüsse mit einer beträchtlichen, für das zu affizierende Individuum übermäßigen Stärke auf dasselbe einwirken.



§. 58.

Nehmen wir besonders auf die Entstehungsart der beyden Hauptklassen von Krankheiten Rückficht; so versteht es sich von selbst, dafs, da wir unter sthenische Krankheiten die Krankheiten der erhöhten Irritabilität und gleichzeitig, so wie auch gleichmäfsig herabgestimmten Sensibilität verstehen, sthenische Krankheiten nur dann entstehen können, wenn solche Einflüsse von Aussen auf den Organismus einwirken, welche vermögend sind, die Energie der Irritabilität zu verstärken.

Da wir nur dergleichen Einflüsse positiv wirksame Potenzen, oder positive Reitze nennen, so folgt nunmehr nothwendig hieraus, dafs sthenische Krankheiten nur bey beträchtlicher Stärke einwirkender äusserer Einflüsse entstehen können.

§. 59.

Versteht man dagegen unter asthenische Krankheiten der erhöhten Sensibilität und herabgestimmten Irritabilität; so begreift es sich gleichfalls von selbst, dafs, da die Sensibilität nur potenzirt werden kann, sowohl durch Entziehung innerer erregenden Potenzen, als auch durch Einwirkung solcher Einflüsse, deren Wirkungsart gerade die entgegengesetzte der positiven Reitze ist §. 58., und die wir darum auch negative Reitze nennen, asthenische Krankheiten nur dann entstehen können, wenn entweder die Summe der innern erregenden Potenzen beträchtlich vermindert, oder die Gewalt der von Aussen auf den Organismus einwirkenden negativen Reitze übermäfsig verstärkt wird.

§. 60.

§. 60.

Was endlich die Entstehung der drey Arten von Krankheiten anlangt, habe ich derer oben schon §. 50. im Allgemeinen gedacht, und berufe mich hier nur noch, um alle mögliche Zweydeutigkeit zu vermeiden, auf die obige allgemeine Regel der Entstehung der Krankheit überhaupt §. 57.

§. 61.

Was ferner die Ausbildung irgend einer Krankheit, so wie die Zunahme ihrer Grade anlangt, so begreift es sich leicht, daß je größer die Gewalt der äußern Einwirkung bey gleichem Energiegrade ist, oder je größer der Grad der Rezeptivität eines organischen Individuums bey gleicher Stärke äusserer Einwirkungen ist, desto größer nothwendig auch der Grad derselben Krankheit seyn werde und müsse.

§. 62.

Aus eben demselben Grunde folgt und erklärt es sich auch, daß, und warum Hypersthénie, so wie Hyperasthenie nur dann entstehen können, wenn die Gewalt derselben äusseren Einflüsse so stark ist, daß diese Krankheiten nicht unter ihrem Mittelgrade sich halten können.

§. 63.

Außerdem giebt uns die Natur des menschlichen Organismus, da derselbe als der sensible Pol des organischen Naturreiches meistens nur asthenischen Krankheiten unterworfen und ausgesetzt ist, gleichsam in bestimmten Urbildern die Hauptgrade der Asthenie, so wie die bestimmte Anzahl derselben zu erkennen, nämlich in den Hauptverschiedenheiten der körperlichen Konstitutionen.

Näm-



Nämlich, um mich nur an die eine Form derselben zu halten, zerfallen sie (S. meinen Entwurf Th. II.) in drey Hauptarten, d. h. in das reizbare, träge und robuste Temperament. — Das reizbare Temperament zerfällt wieder in zwey Spielarten, nämlich in das cholerische und sanguinische, deren Indifferenz oder Mittelgrad das reizbare Temperament selbst bildet. Diese drey Konstitutionsarten zusammen bezeichnen gleichsam als Anlage die drey Grade der reinen Asthenie, wovon den ersten das cholerische, den zweiten das reizbare, und den dritten das sanguinische bezeichnet.

Eben so zerfällt auch das träge Temperament in zwey Spielarten, nämlich in das Melancholische und Phlegmatische, so daß wir dem Urbilde nach das melancholische Temperament dem ersten Grade, das träge dem zweiten, und das phlegmatische dem dritten Grade der Hyperasthenie gleich setzen können. Das Weitere hierüber in der Folge.

Demnach könnten wir also durch die organische Natur selbst gerechtfertigt *sechs Hauptgrade der Krankheiten* festsetzen, welche jede vom Anfang an bis an ihren Ausgang durchlaufen muß.

§. 64.

Auch die Arten der Krankheiten wechseln mit den Graden derselben, wie ich der hier nöthigen Kürze wegen bey dem Verlauf und Heilverfahren der besondern Krankheitsformen bestimmt jedesmal anmerken werde.

§. 65.

Indessen giebt uns die Kenntniß der Wirkungsart der äusseren Einflüsse auf den Organismus über diese Punkte

te gerade den sichersten Aufschluss, daher wir auch dieser noch mit einigen gedenken müssen.

§. 66.

Unter erregenden Potenzen verstehen wir jeden Gegenstand, welcher ausserhalb derjenigen organischen Masse, welche erregt wird, sich befindet, auf dieselbe, durch Eindruck von aussen, wirkt, und die Lebensthätigkeit derselben rege macht.

§. 67.

Solche Gegenstände können nun selbst alle organische Bestandtheile des lebenden Körpers seyn, in wie ferne sie selbst in Thätigkeit versetzt sind. Denn jeder organische Bestandtheil wirkt, wenn er in Erregung gesetzt ist, (Lebensbewegung äussert,) selbst wieder durch Eindruck von aussen in die ihm zunächst gelegenen, mit ihm verbundenen erregbaren Theile, und macht die Lebensthätigkeit, die Selbstwirksamkeit in ihnen rege, d. i. ist selbst inzitirende Potenz für diese Theile. Folglich müssen wir annehmen, dass jeder in Erregung versetzte organische Theil als inzitirende Potenz für den ganzen Organismus wirke oder doch wirken könne.

§. 68.

Da nun solche Potenzen innerhalb der organischen Masse in den erregbaren organischen Bestandtheilen selbst existiren, so können wir dieselben auch innere erregende Potenzen nennen.

Dagegen müssen aus eben demselben Grunde alle inzitirende Gegenstände, welche nicht in, in Lebensbewegung gesetzten, Bestandtheilen des Organismus, oder in dieser Lebensthätigkeit selbst bestehen, äussere in-

D

ziti-



zitirende Potenzen genannt werden; da sie etwas aufserhalb der organischen in Erregung zu versetzenden Masse befindliches sind.

Daher können wir auch die sämtlichen erregenden Potenzen füglich in zwey Klassen eintheilen:

- a) in innere, und
- b) in äussere inzitirende Potenzen.

§. 69.

Alle unter die eben gedachten Rubriken zu rechnenden inzitirenden Gegenstände wirken zwar sämtlich auf den ganzen erregbaren Organismus. Allein dennoch herrschen unter diesen so mannigfaltigen Dingen nothwendig noch mannichfaltigere Verschiedenheiten, von welcher zu unserer vorliegenden Absicht folgende besonders uns merkwürdig sind.

§. 70.

Erstens: die Geschwindigkeit, mit welcher ihre inzitirende Wirkung sich durch den erregbaren Organismus verbreitet. In dieser Hinsicht unterscheiden wir auch zweyerley Klassen.

- a) Mehr durchdringende, flüchtig reizende.
- b) Mehr anhaltende, weniger flüchtig durchdringende Potenzen.

Letztere unterscheiden sich selbst noch von einander in Rücksicht ihrer Stärke, z. B. Maderawein inzitirt stärker als Burgunder, grosse Freude mehr als eine geringe.

§. 71.

Zweytens: die Gewalt, womit dieselben einwirken. Da nun zu grosse und zu geringe Gewalt des Inzitaments jede Beschaffenheit des Uebelbefindens hervorbringt,



bringt, so können auch alle inzitirende Schädlichkeiten in diesem Betracht in zwey Klassen eingetheilt werden:

- a) in solche, wodurch die Gewalt des Inzitaments vermindert wird,
- b) in solche, wodurch die Gewalt des Inzitaments vermehrt wird.

§. 72.

Ie nachdem nun die Wirkfamkeit der inzitirenden Potenzen beschaffen ist, und sich zur Stärke des Wirkungsvermögens verhält, die dem gegenwärtigen Grade der Erregbarkeit des individuellen Organismus zukommt; eben so wird auch die Wirkung derselben, Erregung nämlich, und dieselben entsprechenden Zustände von Uebelbefinden beschaffen seyn. Wir wollen daher dieselben einzeln betrachten, und nach obiger Eintheilung ganz kurz abhandeln.

§. 73.

I. Innere inzitirende Schädlichkeiten.

Hierunter gehören:

- 1) Die Lebensbewegung der kleinsten organischen Theile, und der daraus gebildeten kleineren und größeren Organe.

Schon daraus, daß die Erregung eines Organes oder nur organischen Bestandtheiles inzitirend für den ganzen erregbaren Organismus wirkt, folgt, daß die Erregung der kleinsten und größeren organischen Massen, worinn das Leben selbst besteht, und welche nie ohne Verlust des Lebens aufhören kann, wichtigen Einfluß auf Erzeugung von gehöriger oder krankheitgemäßer Stärke sämmtlicher Lebensverrichtungen habe, folglich



lich unter die ersten inzitirenden Schädlichkeiten gezählt werden müsse. Denn so wie die Erregung einiger solcher organischen Theile, oder eines besondern Organs, z. B. des Magens, der Lungen, an Stärke entweder beträchtliche Vermehrung, z. B. durch Exzesse im Essen und Trinken, oder Verminderung, z. B. durch Ueberladung oder starken Blutverlust, erlitten hat, so ist eben dadurch in derselben Masse eine beträchtliche Vermehrung oder Verminderung der Gewalt des Inzitaments für den ganzen erregbaren Organismus entstanden; folglich wird dadurch auch entweder sthenisches oder asthenisches Uebelbefinden veranlaßt. Um sich hiervon noch mehr überzeugen zu können, will ich nur auf einige besondere Verrichtungen aufmerksam machen, in wiefern dieselben, und mit ihnen alle übrigen, nach angegebenen Verhältnisse, entweder verstärkt oder geschwächt werden.

a) Das Verdauungsgeschäft. Ist die Lebensthätigkeit aller kleinsten organischen Bestandtheile verstärkt, so ist es auch das Verdauungsgeschäft. Die Eßlust wächst, besonders im Anfange; es werden mehrere Nahrungsmittel genossen, dieselben auch kräftiger verdaut, besser verarbeitet und mehr verähnlicht, folglich der Nahrungsaft vermehrt und verstärkt, und damit alle andern Verrichtungen unsers Körpers, und umgekehrt.

b) Das Geschäft der Assimilation der Säfte wird auf gleiche Weise affizirt. Gehet dasselbe mit größerer Stärke und Lebhaftigkeit vor sich, so gehen auch alle Verrichtungen dahin, die unnützen Theile abzuföndern, die wohlreizenden und ernährenden Theile

zu

zu konzentriren, und dadurch sowohl die Menge als die inzitirende Kraft des Milchsaftes, des Blutes und aller abgefonderten Säfte zu erhöhen, und umgekehrt.

c) Der beständige Kreislauf des Blutes geht mit größerer oder geringerer Stärke und Thätigkeit vor sich, und mit ihm die Lebensverrichtungen, je nachdem die Stärke der Erregung aller organischen Bestandtheile verändert wird; und umgekehrt.

Vergleichen wir nun damit dasjenige, was oben von der möglichen Entstehung sthenischer und asthenischer (direkt und indirekt) Krankheiten gesagt haben, so wird es uns leicht erklärbar seyn, auf welche Art die Lebensbewegungen aller Art im Stande seyn können, Krankheiten von gedachter Art hervorzubringen.

Darum füge ich hier auch noch die Erinnerung bey, daß wir bey jeder Entstehung und dem Verlaufe aller Krankheiten auf den Zustand der Lebensbewegungen des erregbaren Organismus vorzüglich unsere Aufmerksamkeit richten müssen.

2) Gemüthsaffekten und Leidenschaften.

Daß bey jedem Affekte, jeder Leidenschaft die Erregung des ganzen lebensfähigen Organismus und besonders jener Organe, die zunächst durch dieselben affizirt werden, an Stärke zu- oder abnehmen, folglich sthenische und asthenische Zufälle des Uebelbefindens dadurch erzeugt werden können, ist eine zubekannte und alltägliche Thatfache, als daß dieselbe noch eines weiteren Beweises bedürfe. Indessen herrscht doch unter denselben, in Rücksicht ihrer Wirksamkeit, eine gewaltige Verschiedenheit, welche wir genau kennen müssen.



§. 74.

Unter diejenigen Gemüthsbewegungen und Leidenschaften, bey denen eine Verstärkung der Erregung in gewissen, besonders der unmittelbar affizirten Organe entsteht, gehören hauptsächlich folgende:

- a) Zorn, wirkt am stärksten, schnellsten, und führt wegen der dadurch zu schnell entstandenen Heftigkeit bald in indirekte Asthenie der Lebensverrichtungen, z. B. Koliken, Blutflüsse, Zuckungen, Gicht, Schlagflüsse.
- b) Enthusiasmus in jeder Richtung, wirkt nicht so stark und heftig als Zorn, dauert aber länger.
- c) Freude, jeder Grad derselben. Je heftiger dieselbe, desto leichter und grösser ist die Sthenie. Zulange anhaltende oder übermässige erzeugt indirekte Asthenie, oft den Tod.
- d) Ueberraschung, angenehme oder unangenehme, hat sogar manchmal indirekt asthenische Zustände, z. B. Blutflüsse, epileptische, gichtische Zufälle, ja zuweilen den Tod verursacht.
- e) Hoffnung. Ihre Wirkung gleicht derjenigen, die einem mittelmässigen Grade von Freude zukommt.
- f) Beglückte Liebe, wirkt ungleich mächtiger, wenn ihr unglückliche Liebe vorhergieng.
- g) Munterkeit, Fröhlichkeit, Zufriedenheit, Vergnügen, sind die gelindesten und sanftesten unter den Erregung verstärkenden Gemüthsaffekten.

§. 75.

Unter diejenigen hingegen, bey denen Schwäche der Erregung, besonders in den unmittelbar affizirten Organen eintritt, gehören besonders folgende:

- a) Niedergeschlagenheit, Verdrießlichkeit, Misvergnügen. Ihre Wirkungen sind, Abnahme der Kräfte, blaßes Aussehen, Mangel an Eßlust, üble Verdauung, Abmagerung, u. d. gl.
- b) Unzufriedenheit, schwächt noch auffallender als erstere, daher Bleichsucht, Fieber, Durchfälle, Wassersuchten etc.
- c) Heimlicher Aergir schadet ungleich mehr noch, bringt oft den Tod.
- d) Traurigkeit, Betrübniß, wirkt noch heftiger und schneller, erzeugt leicht Tieffinn, Melancholie, Wahnsinn.
- e) Schrecken, sein schädlicher Einfluß ist unbekante Thatfache, verursacht leicht allerley Nervenkrankheiten, Veitstanz, Gicht, nicht selten den Tod.
- f) Furcht, daher leicht Mattigkeit, Zittern, Schwindel, Schauer, Gicht, Durchfälle, und bey großer Furcht nicht selten den Tod.
- g) Angst wirkt heftiger noch als hoher Grad von Furcht.
- h) Unglückliche Liebe kann auch weit mehr schaden als Angst, erzeugt leicht Wahnsinn, Melancholie, hektisches Fieber etc.
- i) Verzweiflung, die schädlichste und schrecklichste aller niederschlagenden Gemüthsaffekten, u. s. w.



§. 76.

3) Erregung des Seelenorganes beym Denken.

Da wir annehmen müssen, daß jeder Vorstellung des Verstandes immer auch eine organische Bewegung eines Theils des dazu qualifizirten Denkorganes entspreche, so folgt, daß jeder Gedanke auch einigen Einfluß auf die Erregung des Organismus habe, mithin die Bewegungen des Denkorganes unter die inzitirenden Potenzen gezählt werden müssen.

Daher müssen wir auch annehmen, daß bey jeder zu grossen Anstrengung der Seele im Denken die organischen Bewegungen mit zu grosser Gewalt in die zunächst gelegenen organischen Theile, und so mittelbar in den übrigen Organismus wirken, die Stärke der Erregung vermehren; ihre Unterbrechung hingegen, oder ungewöhnlich seltene Erweckung, eine Verminderung der Stärke der Erregung zur Folge habe.

In beyder Rücksicht kann daher die Erregung des Seelenorganes, in demselben Verhältnisse, wie die Gemüthsaffekten und Leidenschaften, sthenische und asthenische Krankheiten hervorbringen.

§. 77.

4) Willkührliche Bewegungen des Körpers.

Leibesbewegungen sind, wie jedem bekannt ist, in mäßigem Grade zur Erhaltung des Wohlbefindens nöthig. Sobald sie aber nicht innerhalb des gehörigen, der individuellen Beschaffenheiten irgend eines Körpers angemessenen Masses von Stärke und Dauer vorgenommen werden, d. h. sobald sie zu heftig und zu übermässig sind, so erhöhen sie nicht nur die Erregung aller
Organe

Organe, sondern ertheilen auch den Säften mehr Schnelligkeit, geben ihnen mehr inzitirende Kraft, und müssen darum auch unter die innern inzitirenden Schädlichkeiten gerechnet werden.

Hieraus wird man sich schon überzeugen können, in wie ferne zu heftige Leibesbewegungen zur Erzeugung der Sthenie der Erregung, und sogar zur indirekten Asthenie beytragen können; zu wenige Bewegung hingegen, d. i. Ruhe und träges Leben, geradezu direkte Asthenie herbeyführen müsse.

Indefs unterscheiden sich dennach die verschiedenen Arten der Bewegungen in Rücksicht der Stärke, mit welcher der Körper dadurch in Erregung gesetzt wird, wesentlich von einander, und zwar:

a) Aktive Bewegungen, d. i. diejenigen, die von eigener Anstrengung der Kräfte, von innerer Selbstwirksamkeit hervorgebracht werden, verursachen von den übrigen Leibesbewegungen die größte Stärke von der Erregung. Zu derselben gehören das Gehen, Laufen, Springen, das Fechten, Tanzen, Ringen, Balgen, Baxen, Stoßen, Werfen, das Ballschlagen, die sämtlichen gymnastischen und militärischen Uebungen, Holzfägen, Hauen, Tragen, alle Verrichtungen von Handwerkern, und die sämtlichen körperlichen Geschäfte von Männern und Weibern.

b) Passive Bewegungen, d. i., solche, die bloß durch äußere Gewalt auf unsern Körper und mit demselben bewirkt werden, besitzen eine geringere Gewalt, womit sie die Erregung der organischen Masse hervorbringen. Hieher gehört das Getragen, -- Gefahren; -- das Geschaukeltwerden, (wenn wir uns dabey



bey ganz leidend verhalten) das Reiben gewisser Theile, u. s. f.

c) Gemischte Bewegungen hingegen, d. i. solche, die theils durch äussere Gewalt, theils aber auch durch innere Selbstwirksamkeit erzeugt werden, wirken stärker und heftiger, als die passiven. Hierher gehören das Selbstfahren, das Reiten, das Selbstschaukeln, u. s. w.

Ich muß hier noch bemerken, daß durch alle diese besonderen Arten von Bewegungen entweder der ganze Organismus mit einiger (selten mit völliger) Gleichmässigkeit, oder einige Organe mehr als andere, und zwar bald diese, bald jene mehr als andere, geradezu inzitiret werden, da hingegen mehrere in relativer Ruhe bleiben, folglich nur mittelbar inzitiret werden.

Hierauf müssen wir besonders aufmerksam seyn, um uns in vorkommenden Fällen erklären zu können, welche Organe vorzüglich affiziret seyen, und in welchem Grade von Stärke der Erregung dieselben vor andern sich befinden.

§. 78.

5) Uebungen der Sprach- und Sinnesorgane.

Unter den Uebungen der Sprachorgane versteht man bekanntlich das Reden in Gesprächen, in Kanzelvorträgen, das Schreyen, Lärmen, Singen, Pfeifen, Jauchzen, das Blasen von Instrumenten, als Flöte, Trompete u. s. f.

Uebungen der Sinnesorgane können alle Bewegungen der Organe heissen, welchen sinnliche Vorstellungen, Wahrnehmungen entsprechen oder doch entsprechen können. Hierher gehören demnach Bewegungen



gungen der Sehorgane durch jeden Eindruck des Lichtes, der Gehörorgane durch die Modifikation des Schalles, der Fühlorgane durch Eindruck von berührenden oder berührten Gegenständen, von Wärme, der Geruch- und Geschmacksorgane durch riechbare oder schmeckbare Gegenstände erweckt.

Werden nun diese Uebungen in zu großer oder zu geringer Stärke, als gewöhnlich in gefunden Tagen erweckt, so wird im ersten Falle die Erregung für den ganzen Organismus, besonders aber in den unmittelbar affizirten Organen, z. B. der Lunge beym Flötenblasen, über ihren mittelmässigen Grad verstärkt, im zweyten Falle aber geschwächt und folglich sthenische und asthenische Krankheiten hervorgebracht.

§. 79.

Eben dasselbe gilt auch von den angestregten oder vernachlässigten Uebungen anderer Organe, z. B. des Magens und der Verdauungsorgane, der Gedärme, der lymphatischen Gefässe, der Arterien und Venen, der Haut, und der zunächst darunter liegenden Organe, Drüsen, kleinen Arterien, Venen etc, der Lungen und Lungengefässe, u. s. w.

Je nachdem nämlich durch irgend eine Ursache die Erregung dieser Organe vermehrt oder vermindert wird, eben so wird auch die Menge und inzitirende Kraft ihrer enthaltenen, bereiteten u. d. gl. Säfte vermehrt und vermindert, und dadurch den übrigen Organen, welche von daher ihren Lebensunterhalt ziehen, entweder mehr und stärkere, oder weniger und schwächere inzitirende Potenzen, mithin auch geringere oder stärkere Erregung mitgetheilt.

§. 80.



§. 80.

II. Aeussere inzitirende Potenzen.

Hierher gehören:

1) Die atmosphärische Luft und ihre Bestandtheile.

Jene durchsichtige und elastische Flüssigkeit, welche unsern Erdball umgiebt, und die wir Luft nennen, ist allen belebten Körpern zur Erhaltung des Lebens eben so unentbehrlich als der gesammten Natur, indem ohne ihre Gegenwart kein Prozeß der Natur gelingt. Dessen ungeachtet hört man so oft und so häufige Klagen, daß die Atmosphäre an einem Orte der Gesundheit nachtheiliger sey, als an andern. Bald reizet, (erregt) die atmosphärische Luft zu viel oder zu wenig, erzeugt sthenische und asthenische Zustände des Uebelbefindens, je nachdem die Beschaffenheit derselben ist, woraus wir sodann den Schluß ziehen müssen, daß die atmosphärische Luft mit allem Rechte unter die inzitirenden Potenzen gerechnet werden könne und müsse.

§. 81.

Diejenige atmosphärische Luft, in welcher Menschen und Thiere gehörig athmen und fortleben, die Pflanzen gedeihen, und die Flamme hell fortbrennen kann, ist nach aller Erfahrung diejenige, welche nach den neuern Chemikern $\frac{72}{100}$ Theile Stickgas, und $\frac{27}{100}$ Theile Sauerstoffgas in ihrer Mischung enthält, und gewöhnlich reine Luft genannt wird.

Allein selten, vielleicht nie, ist die atmosphärische Luft in ganz reinem Zustande. Gewöhnlich sind in derselben mannichfaltige Stoffe, in grösserer oder geringerer Menge enthalten, welche der atmosphärischen Luft
bald

bald zu stark bald zu schwach inzitirende Gewalt ertheilen, und die wir auch darum unter die inzitirenden Schädlichkeiten zählen müssen. Wir schränken uns hier nur auf folgende ein.

§. 82.

a) Wärme der atmosphärischen Luft.

Wärme, sie mag uns auf eine Art, welche es immer wolle, mitgetheilt werden, ist nicht nur ein nothwendiger Bestandtheil unseres Körpers, sondern im mäßigen Grade (welcher freylich aus leicht erklärbaren Gründen in verschiedenen Individuen verschieden, aber dennoch der mittelmäßige seyn kann) der nöthigste Reiz zur gehörigen Stärke der Erregung, indem dieselbe ihrer Natur nach die Wirksamkeit, das Ineinandewirken der organischen Grundstoffe verstärken, und die Gewalt der sämmtlichen Lebensverrichtungen zu vermehren vermag.

Jeder zu häufige Uebergang der Feuermaterie aus andern Körpern in besondere Theile des Organismus, d. i. zu hoher Grad der Wärme, verursacht Sthenie der Erregung, und bereitet nach und nach, oder auch jähling, wenn ihr Grad zu übermäßig ist, (wo sie dann Hitze heißt) indirekte Schwäche der Erregung. Dieses kann geschehen an heißen Sommertagen, bey stechender Sonnenhitze, in sehr warm geheizten Zimmern u. s. w. welche uns leicht sthenische und indirekt asthenische Krankheiten zuziehen können.

Wenn aber dem also ist, so kann die Behauptung keinem Zweifel ausgesetzt seyn, daß bey jedem geringern Grade der Wärme, wenn er unter dem nothwendigen, gesundheitsgemäßen und mittelmäßigen Grade vermindert



dert ist, nothwendig das Inzitamement verringert, die Stärke des Wirkungsvermögens geschwächt, die Erregung absolut vermindert, mithin direkt asthenische Krankheiten erfolgen müssen. Dieses ist der Fall bey kalter Luft, Zugluft, bey Winden.

b) Dünste, dämpfe, u. d. gl. in der Luft.

α) Kohlendämpfe, Die Erfahrung lehrt, daß eine durch Kohlendämpfe verdorbene Atmosphäre anfangs die Lebensbewegungen der darinn befindlichen Menschen erwecke und einiges behagliche Gefühl verursache; bald aber entsteht Schläfrigkeit, selbst Schlaf, und zuletzt der Tod aus indirekter Schwäche. Hieraus können wir den Schluss ziehen, daß eine auf diese Art verdorbene Luft eine ungleich grösser reizende Gewalt besitze, als eine reine, unverdorbene, wohlgemischte Luft.

β) dieselbe Bewandniss hat es auch mit jener Luft, welche durch Dünste von wohlriechenden Dingen und Rauchwerken, Dämpfe von Blumen, durch Dünste von Lichtern, durch fixe Luft, wie z. B. in Kellern, Gewölben, wo viel junger Wein oder Bier liegt, und durch viele metallische Dünste verdorben ist.

γ) Jene Luft hingegen, welche durch Blähungen, durch Dünste, die von Speisen, z. B. Sauerkraut, Köhl, Stockfisch aufsteigen, und durch allerley in ihr aufgenommene scharfe Bestandtheile, z. B. Urintheile, Bestandtheile von allerley Exkrementen, Seife, welche von der Wäsche ausdünstet u. d. gl. verunreiniget ist, hat einen grossen Theil ihrer absolut inzitirenden Gewalt verlohren,

δ) Da-



δ) Dasselbe gilt auch von Ausdünstungen aus Sümpfen, Morästen, stehenden Wässern, nach Ueberschwemmungen aus unreinen Kanälen.

c) Feuchtigkeit der Luft.

So wie jede Feuchtigkeit, sie mag auf irgend eine Art erzeugt und mit unserem Körper in Berührung gebracht werden, die Erregung des Organismus direct schwächt, eben so auch die Feuchtigkeit der Luft,

d) Winde.

Die Nordluft ist durchgehends rauh, trocken, rasch, durchdringend, stürmisch reissend, und schwächt gewöhnlich nicht nur durch die in ihr enthaltenen Wasserdünste, wohl aber auch durch zu häufiges Entziehen des Wärmestoffes die Erregung durch absolute Verminderung der Gewalt des Inzitants.

Milder ist die Ostluft, zwar meistens trocken, aber weniger kalt.

Die Süd- und Westluft ist ebenfalls wärmer, besonders die erstere, aber gewöhnlich feuchter.

Ueberhaupt müssen wir bey der Bestimmung der Wirkksamkeit gegenwärtiger Winde mehr auf ihre gedachte Beschaffenheit, als auf die Gegenden, woher sie kommen, Rücksicht nehmen.

e) Ansteckungsstoffe.

Man theilt die Ansteckungsstoffe gewöhnlich in Miasmen und Kontagien ein. Unter letztern versteht man feine, unsern Sinnen sich nicht darstellende Stoffe, welche, wenn sie lebende Körper affiziren, Anlage und wirkliche Krankheiten von bestimmter Form hervorbringen, und die uns blos mittelbar durch die atmosphärische Luft mitgetheilt werden, z. B. Blattern, Masern, Pest u. d. gl. Ansteckung.



Miasmen heißen aber jene Ansteckungstoffe, welche nicht so fein, sondern sichtbar sind, unmittelbar durch Berührung uns mitgetheilt werden, und bloß örtliche Krankheiten erzeugen, z. B. die Krätze und venerische Ansteckung.

Da nun hier bloß von jenen inzitirenden Schädlichkeiten gehandelt wird, welche allgemeine Krankheiten hervorzubringen im Stande sind, so verstehen wir hier unter Ansteckungstoffen bloß nur die Kontagien. Von diesen lehrt nun die Erfahrung, daß sie überhaupt sthenische, d. i. zu stark inzitirende Schädlichkeiten sind, welche darum auch manchmal die von dem Kantagium unmittelbar berührten Organe durch ihre Heftigkeit, mit welcher sie einwirken, in einen Zustand indirekter Schwäche versetzen können, und gegen alle sonstige Gewohnheit oft eine sthenische Behandlung nöthig machen. Hierher gehören z. B. Blattern, Masern, Scharlach, Nesselfriesel, Pest. u. d. gl. m.

§. 83.

2) Stoffe, welche auf die Sinnesorgane einwirken.

a) Der Lichtstoff gehört nebst dem Wärmestoffe unter die wichtigsten äußern inzitirenden Potenzen, und beide haben dieselbe Wirksamkeit in Rücksicht der Erzeugung starker Erregung gemein, das heißt:

Mangel an gehörigen Lichte vermindert die absolute Stärke des Inzitaments; gehöriges Licht giebt gehörige starke Erregung; stärkeres Licht vermehrt dieselbe, und zu grelles Licht tilgt offenbar die Sehekraft.

b) Der Schall wirkt auf die selbe Weise.

c) Die



c) Die Gerüche. Davon haben wir oben schon das Nöthige angeführt,

d) Die Stoffe, welche die Geschmacksgane affiziren. Diese theilt man in geschmackhafte, und geschmacklose ein. Nur von erstern ist hier die Rede. Unter diese gehören aber alle Körper, welche salzige, saure, laugenhafte, (alkalische) süsse, weinigte, bittere, gewürzhafte, scharfe, herbe, u. d. gl. Bestandtheile in ihrer Mischung enthalten.

Von diesen sind die ätherischen Oele, Weine, Biere, der Ammoniak, der Kampfer, Bisam, die Vitriolnaphta, das Opium, die Gewürze, manche bittere Körper u. d. gl. diejenigen, denen eine Inzitant vermehrende Kraft zukommt; dagegen die Salze, Säuren und Neutralsalze offenbar die Gewalt des Inzitaments und die Stärke der Erregung vermindern.


e) Eindrücke auf die Gefühlorgane.

Ich rechne hierher das Reiben und Peitschen, welche bekanntlich unter die Inzitant verstärkenden Potenzen gehören.

§. 84

3) Bäder, Halbbäder, Umschläge.

Dass warme Bäder, Halbbäder und Umschläge die Stärke der Erregung vermehren, Kälte hingegen dieselbe vermindere, wird sich jeder aus den oben angegebenen Gründen leicht schon erklären können. Uebrigens dependirt die mehr oder weniger Inzitant vermehrende oder vermindernde Eigenschaft derselben von dem Grade der Wärme und jenen Körpern ab, deren man sich dazu bedient, z. B. China, Chamillen, oder Seife und Salpeter.



§. 85.

4) Kleidungen und Betten.

Hierbey kommt es vorzüglich auf folgende Rücksichten an:

a) In wie fern sie dazu beytragen, das Maafs des dem Körper zukommenden Wärmestoffes zu vermehren oder zu vermindern.

b) In wie fern sie auf den Körper reibend wirken.

c) In wiefern sie die Theile des Körpers, an welchen sie zunächst angebracht sind, drücken, pressen.

Hieraus allein schon läßt sich die Verschiedenheit ihrer Wirkungen auf die Stärke der Erregung hinlänglich ableiten und erklären. Uebrigens aber vergesse man nie, daß wir diesfalls die Gewohnheiten hierbey gehörig mit in Anschlag bringen.

§. 86.

5) Speisen und Getränke.

Da eine vollständige Behandlung dieses Gegenstandes für den mir hier beschränkten Raum viel zu weitläufig seyn würde, so verweise ich auf einen andern Ort, wo ich die hier einschlagenden Gegenstände ausführlich detailliret habe. Ich füge daher nur einige allgemeine Bemerkungen bey.

a) Eine grössere als die gewohnte Menge von Speisen und Getränken, so lange dieselben noch gehörig verdaut und verarbeitet werden können, nahrhaft und inzitirend sind, vermehrt die Gewalt des Inzitants theils durch die dadurch erzeugte grössere Quantität der Säfte, theils durch die mittelst derselben verstärkte inzitirende Kraft derselben, und kann folglich unter jene

inzi-

inzeitirenden Schädlichkeiten gerechnet werden, deren Wirkung sthenische Zustände von Uebelbefinden sind.


Hingegen jede übermäßige Menge derselben dehnet den Magen und die Gedärme zu sehr aus; der Zusammenhang dieser Theile wird vermindert, es entsteht Schlaffheit nach der Ausleerung; die Lebensverrichtungen dieser Eingeweide werden beträchtlich geschwächt, oft unterbrochen, und dadurch absolute Verminderung der Gewalt des Inzitaments erzeugt, woraus abermals direkt asthenische Zustände von Uebelbefinden entstehen.

Dasselbe gilt auch mit einiger Einschränkung von Mangel an Speisen und Getränken.

b) Je kräftiger nährend die genossenen Speisen sind, je größer die inzeitirende Gewalt der Getränke ist, desto leichter, schneller und heftiger wird die Erregung der organischen Masse verstärkt, welche bey größerer Verstärkung, oder länger dauernder Einwirkung bald in indirekte Asthenie übergeht.

c) Fleischspeisen kommen in Rücksicht ihrer Bestandtheile mit denen, woraus der menschliche Körper besteht, am nächsten überein, werden darum auch von unserem Magensaft leicht und schnell aufgelöst, assimiliren sich bald unsern Säften, geben folglich eine unserem Körper völlig angemessene Nahrung ab, vermehren schnell, leicht und stark die Quantität unserer Säfte, denen sie überdem noch stark inzeitirende Eigenschaften mittheilen, und müssen darum unter die sthenischen Schädlichkeiten gerechnet werden.

Die inzeitirende Gewalt der Fleischspeisen wird aber noch mehr verstärkt, wenn die Zubereitungen der-



selben aus sehr konzentrirten Fleischsäften bestehen, viele Gewürze und geistige Dinge in ihrer Mischung enthalten, und überdem noch warm genossen werden.

d) Pflanzennahrung inzitirt bey weitem schwächer, als Fleischspeisen, und um so mehr, je wässriger und säuerlicher sie selbst an sich oder durch ihre Zubereitungen sind.

e) Unter den Getränken inzitirt das Wasser am wenigsten, und zwar desto weniger, je kälter es ist. Mehr reizende Gewalt besitzt das Bier, und zwar je mehr es Stärke besitzt, Mehr noch reizen die Weine, je nachdem ihr Antheil an Weingeiste groß, an Säure hingegen gering ist.

Die deutschen Weine inzitiren weniger als die französischen; doch noch mehr inzitiren die spanischen, oder solche, welche auf Inseln unter dem heißen Himmelsstriche wachsen z. B. Madera, Cyperwein, Malaga, doch sind auch unter den deutschen Weinen viele, besonders wenn sie etwas alt sind, und in guten Weinjahren wuchsen, welche treffliche inzitirende Wirkung hervorbringen.

Indessen müssen wir bey der Beurtheilung aller dieser Dinge nie vergessen, die Gewohnheit, Alter, Geschlecht, und Körperkonstitution mit in Anschlag zu bringen, indem mancher Körper vor dem andern manche Dinge besser und mehr davon ohne Nachtheil vertragen kann.

§ 87.

6) Arzneyen und Kuhrmethoden.

Da es gleichfalls hier zu weitläufig seyn würde, jedes einzelne Arzneymittel seiner Wirkung nach zu prüfen



prüfen und hier aufzustellen, so begnüge ich mich, hier nur auf die gewöhnlichsten und dem Laien grösstentheils auch unbekannten Arzneyen, und die meist gewöhnten Kuhrmethoden mich einzuschränken. Daher rechnen wir unter die

a) Inzitant erhöhenden Mittel, Opium, Moschus, Vitriolnaphta, Kampfer, Hofmannischen Liquor, Baldrianwurzel, Chinarinde, bittere Extracte, Quassia, Zimmtrinde, Branntwein, Zimmtwasser, und die sogenannte stärkende Methode.


b) Unter die Inzitant absolut vermindernden Mittel: Weinsteinrahm (Cremor tartari), Glaubersalz, Salmiak, Salpeter, alle Laxanzen, Brechmittel, Schweis- und Urin treibende Mittel, Aderlässe, Blasenpflaster, welche die Eiterung bewirken, Fontanelle, alle sogenannte auflösende Mittel, kalte Bäder u. s. w.

§. 88.

7) Aeufserliche Krankheiten.

Hierher gehören: Vereiterung, Verwundung, eingeklemmte Brüche, die Krätze, der Grindkopf, Erbsgrind, Geschwüre, offener und verborgener Krebs, Knochenfäule, heisser und kalter Brand, Steine, Quetschungen, Verrenkungen, Knochenbrüche, Verhärtungen, Vorfälle, Fleischgewächse, Ausdehnung des Magens und Gedärme durch hart verdauliche Speisen u. s. w. Alle diese Krankheiten schwächen entweder die Verrichtung dieses oder jenes Theils unseres Körpers, oder entziehen demselben eine Menge nöthiger Säfte, auf welche beyderley Art sie die Gewalt des Inzitaments absolut vermindern, und direktaethenische Krankheiten verursachen können.

§. 89.



§. 89.

Dieses wären nun die inzitirenden Schädlichkeiten, welche auf die angegebenen mannichfaltigen Arten zur Erzeugung krankhafter Erregungen und denen entsprechender Krankheiten beytragen können.

Allein wir müssen hier noch anmerken, daß die Gewalt aller dieser inzitirenden Schädlichkeiten entweder vergrößert, oder vermindert wird, stärkere oder schwächere Erregung hervorbringt, je nachdem der Grad der Erregbarkeit, welcher dem von Krankheit befallenen Körper vor dem Anfalle seines Uebelbefindens zukam, verschieden, d. i. größer oder geringer.

Diese Verschiedenheit des Grades der Erregbarkeit richtet sich aber nach folgenden Umständen, welche denselben zunächst bestimmen. Nämlich:

§. 90.

Das Alter. Je näher der Mensch seinem Ursprunge ist, desto höher ist der Grad der Erregbarkeit, desto schwächer die Stärke seines Wirkungsvermögens, desto geringere Reitze bedarf und verträgt er, aber auch desto leichter und schneller können durch Inzitanten erhöhende Mittel sthenische Zustände von Uebelbefinden erzeugt werden, welche hingegen schwerer und seltener hervorgebracht werden, je weiter der lebende Körper in seinem Alter vorrückt und je mehr durch dieselben der Grad der Erregbarkeit vermindert wird.

§. 91.

Das Geschlecht. Im Durchschnitte ist der Grad der Erregbarkeit bey einem Weibe viel höher als bey einem Manne, wenn auch beyde in demselben Alter und in durchgehends gleichen Umständen sich befinden.

Folg-

Folglich gilt hier dasselbe, was ich von dem Alter gesagt habe: indessen ist diese Verschiedenheit bey dem verschiedenen Geschlechte minder auffallend, und der angegebene Fall oft umgekehrt.

§. 92.

Die Konstitution des Körpers. Manche Individuen sind außerordentlich empfänglich für jeden auch noch so kleinen Reitz, der bey vielen gar keine besondere Reitzung hervorbringen kann. Der Grund liegt in ihrem erhöheteren Grade von Erregbarkeit, welcher aber nach und nach durch stärkere äußere Einflüsse vermindert, so wie die sehr irritable Konstitution nach und nach in weniger irritable, und umgekehrt, durch verschiedene Einflüsse umgeschaffen werden kann.

§. 93.

Die Lebensart. Wer nährhafte Speisen genießt, reizende Getränke zu sich nimmt, sich viel und anhaltend, (doch nicht übermäßig) beschäftigt, in gesunder Luft stets sich aufhält, von keinen niederschlagenden Leidenschaften gequält wird, sich fleißig Bewegung macht, meist Fleischspeisen genießt u. s. w. derjenige besitzt einen geringern Grad der Erregbarkeit, dagegen eine größere Stärke von Wirkungsvermögen, bedarf und verträgt stärkere Reitze ohne zu erkranken, als derjenige, welcher beym Wasserkrüge, Obst, Gemüsespeisen, bey sparsamer Kost überhaupt erzogen wird, weniger Anstrengung des Körpers und Geistes erfährt, müßig sitzt, u. s. w.

§. 94.

Das Klima. Je wärmer dasselbe ist, desto geringer ist der Grad der Erregbarkeit, aber desto größer
die



die Stärke des Wirkungsvermögens u. s. w. seiner Bewohner. Je kälter hingegen das Klima ist, desto reizbarer sind seine Bewohner, desto weniger stark inzitirende Potenzen dürfen auf den Körper derselben einwirken, um Sthenie der Erregung in ihnen zuwege zu bringen, aber auch desto weniger verträgt derselbe Entziehung von inzitirenden Potenzen, ohne in direkt asthenische Krankheiten zu verfallen.

§. 95.

Mächtig ist endlich überhaupt die Gewohnheit in dieser Rücksicht. Wer an wenige Reize gewöhnt ist, verträgt auch gelinde Reize nicht immer, ohne von sthenischen Krankheiten befallen zu werden, und erkrankt sogleich, wenn ihm etwas von seinen gewöhnlichen Reizen entzogen wird.

§. 96.

Ferner im Winter und Morgens Früh ist unser Körper in der Regel immer reizbarer als im Frühling, Sommer, Herbst, und den Tag hindurch.

Eben so nimmt die Reizbarkeit eines weiblichen Körpers während der Zeit ihrer Reinigung, Schwangerschaft und Wochenbette zu, und vermindert sich wieder nach derselben Zeit.

§. 97.

Auf alle diese Punkte müssen wir vorzüglich vor der Anwendung irgend einer Verfahrensart genaue Rücksicht nehmen, indem dieselben, wie wir gehört haben, die Umstände mächtig abändern.

§. 98.

Nachdem wir nun wissen, was Krankheit ist, welches die Bedingungen ihrer Möglichkeit sind, auf wie
viele



viele Klassen, Gattungen und Arten alle Krankheiten sich reduzieren lassen, wie dieselben entstehen, welches die Hauptgrade des ganzen Verlaufs derselben sind, und endlich welches im Allgemeinen die Wirkungsarten der gewöhnlichsten äusseren Einflüsse sind, durch welche gedachte verschiedene krankhafte Zustände des Organismus erzeugt und hervorgebracht werden; wird es uns nunmehr um so leichter möglich seyn, mit grösserer Bestimmtheit und Zuverlässigkeit die für die Hauptabsicht dieses Buchs wichtigste Frage zu beantworten, nämlich, wie überhaupt verfahren werden müsse, die gedachten Krankheiten, so wie die daraus entspringenden bestimmten Arten des Uebelseyn gehörig zweckmässig und gründlich zu beseitigen.

Allein in so fern die Möglichkeit der Heilung irgend einer Krankheit die Kenntniss der Gegenwart, der Natur und Beschaffenheit derselben nothwendig voraussetzt, indem wir ohne dieser durchaus nicht mit der erforderlichen Bestimmtheit und Gewissheit den direkten Heilplan entwerfen, noch vielweniger mit Zuverlässigkeit anwenden können; so versteht es sich von selbst, dass wir uns vor allen Dingen am Krankenbette besonders darum bekümmern müssen:

- a) Die vorhandene Form des Uebelseyns, so wie die demselben zu Grunde liegende Krankheit gehörig zu untersuchen. (Untersuchungskunst.)
- b) Ihre Natur, Wesenheit, qualitative Beschaffenheit, so wie den Grad derselben genau zu bestimmen. (Diagnostik.)

c) Und



c) Und endlich den möglichen Ausgang derselben bestimmt vorherfagen zu können. (Prognostik.)

Alle diese Erfordernisse, welche, gehörig befriedigt, nur in gehöriger Verbindung miteinander, die wahre Einsicht in die Beschaffenheit irgend eines krankhaften Zustandes uns zu verschaffen vermögend sind, und die ich eben darum unter eine Rubrick zusammenfasse, bedürfen gewisse Regeln, welche der Heilkünstler genau kennen und innen haben muß, um darnach seine Handelsweise am Krankenbette einzurichten.

§. 99.

Da nun aber alles dasjenige, was Regeln zur Realisirung irgend einer Idee enthält, technisch heißt, so folgt, daß die gedachten sämtlichen Regeln, wonach der Arzt, seine Idee zu realisiren, angeleitet wird, nicht nur ausschließend technische Regeln genannt werden müssen, sondern daß, weil der Inbegriff aller derer Regeln, welche den Arzt bey der Realisirung seiner Idee, d. h. bey dem Bestreben die Gesundheit wieder herzustellen, leiten, technische Heilkunde oder Heilkunst heißt, daß eben darum nachstehende Untersuchung nebst den dabey aufgestellten Regeln nicht nur überhaupt als ein Theil, sondern vielmehr als der erste Theil der Heilkunst angesehen werden müsse. Nämlich:

Zweytes Kapitel.

Erkenntniß der Krankheiten.

§. 100.]

Krkrankheit erkennen heißt soviel als wissen:

- a) Ob die Lebensverrichtungen sowohl des gesammten Organismus, als auch seiner einzelnen und besondern Organe von ihrer Gesundheits gemäßen (normalen) Beschaffenheit abgewichen seyen oder nicht.
- b) Worinn diese Abweichungen selbst und eigentlich bestehen;
- c) welches die Ursache derselben, oder bestimmter ausgedrückt, welches überhaupt die Veränderung sey, die die normale Synthesis und Proportion der organischen Funkzionen erlitten, und dadurch die vorhandene Abweichung der Lebensverrichtungen hervorgebracht habe, d. h. zu welcher Klasse von Krankheiten die vorhandene gerechnet werden müsse, nämlich ob die Krankheit selbst sthenischer oder asthenischer Natur sey.
- d) Welcher der vier Gattungen der Krankheiten dieselbe angehöre;
- e) Welchem der Hauptsysteme des Organismus die Krankheit ursprünglich angehöre, oder von welcher Art die Krankheit sey.

f)




- f) Auf welchem Grade der Heftigkeit dieselbe Krankheit sich befinde, d. h. ob sie von dem ersten, zweyten oder dritten Grade der Sthenie oder Hypersthenie, der Asthenie oder Hyperasthenie sey?
- g) Ob die Heftigkeit der Krankheit durch den ganzen Organismus dieselbe, oder in einem oder dem andern Organe gröfser sey, oder nicht, und in welchem.

§. 101.

Von allen diesen Punkten mufs der Arzt genau und vorerst unterrichtet seyn, bevor er sich nur einfallen lasse, an den Entwurf irgend eines Heilplans auch nur zu denken, indem letzterer zunächst auf Berichtigung ersterer Punkte beruht, und am leichtesten gefunden werden kann, wenn wir die Untersuchung gedachter Momente in der so eben angegebenen Ordnung vornehmen.

§. 102.

Da indessen beyde ersten Punkte a) b) bloß für die Erforschung der Form der Krankheit, d. h. der Beschaffenheit des Uebelseyns berechnet sind, die übrigen Punkte aber c) d) e) zunächst die Erforschung der Natur und Wesenheit der Krankheit, oder mit andern Worten, der Krankheit selbst angehen, beyde Umstände aber wie Wirkung von Ursache von einander verschieden sind; so unterscheiden wir nicht nur gleichfalls auch zwischen Erkenntniß der Form der Krankheit oder des Uebelseyns, und Erkenntniß der Natur der Krankheit oder der eigentlichen Krankheit, sondern wir müssen vielmehr sowohl in nosologischer und diagnostischer, als auch ins Besondere in therapeutischer




tischer Hinsicht gedachte nothwendige Unterscheidung genau berücksichtigen; indem die bisherige Medizin häufig und deutlich genug uns bewiesen hat, wie groß die Nachtheile sind, welche aus der Verwechslung beyder Punkte für die Klinik entspringen.

Die Untersuchung der bestimmten Form einer Krankheit nämlich bekümmert sich blos um das Ausfindigmachen aller Abweichungen der Lebensverrichtungen in sämmtlichen Organen von ihrer normalen Beschaffenheit, in wiefern dieselben einzeln oder gesamt, mehr oder weniger, von der individuel normalen Stärke, Dauer, Leichtigkeit der Ausübung, und von dem behaglichen Gefühle, welches sie gewähren, abweichen.

Die Untersuchung der Krankheit selbst hingegen schränkt sich zunächst auf die Erforschung der krankhaften Veränderung der normalen Proportion der organischen Funkzionen, so wie des Grades ihrer Entfernung von der Normalität derselben ein.

§. 103.

Demungeachtet aber muß der Arzt beyderley Untersuchungen jedesmal, wenn es anderst geschehen kann, zugleich anstellen, und genau miteinander verbinden, wenn die Heilung eines vorliegenden Krankheitsfalles gründlich und vollkommen geschehen soll; denn da die wahrzunehmenden Erscheinungen des Uebelseyns bloße Wirkungen des gestörten normalen Verhältnisses der organischen Funkzionen, d. h. der eigentlichen Krankheit sind; so können wir, wenn wir die Zeit und das Beginnen der ersten Erscheinungen des Uebelseyns, jede Vervielfältigung, jedes Heftigerwerden, jeden Wechsel, jede



jede Abnahme derselben genau erforschen, hieraus nicht nur mit gröfserer Zuverlässigkeit, sondern vielmehr einzig und allein auf das Entstehen, Steigen, Fallen und jede Veränderung der zu Grunde liegenden Krankheit, es mag dieselbe entweder ihren Grad, oder ihre Qualität betreffen, schliessen, und mithin unsere Behandlung der Krankheit darnach genau bestimmen, d. h. sowohl der Art, als auch dem Grade derselben anpassend einrichten.

Die Methoden, beyderley Untersuchungen gehörig anzustellen, sind indessen folgende.

§. 104.

I. Um ausfindig zu machen, ob, worin und in wiefern die Lebensverrichtungen des gesammten Organismus von ihrer Normalität abgewichen seyen, müssen wir sowohl die besondern Verrichtungen aller einzelnen Theile, vom Kopfe bis zu den Füßen, als auch diejenigen Verrichtungen, woran der ganze Organismus Theil nimmt, durchgehen, ihre gegenwärtige Beschaffenheit mit der gesundheitsgemäßen vergleichen, und zugleich die Folgen bemerken, welche solche Abweichungen erzeugten.

§. 105.

Das erste Erforderniß, zur Erkenntniß der Form einer Krankheit gelangen zu können, wäre also die genaue Bekanntschaft mit allen jenen Zeichen, woraus man den normalen Zustand aller Lebensverrichtungen erkennen kann. Dafs hievon kein einziges Organ des menschlichen Körpers ausgeschlossen sey, wird jeder meiner Leser eben so begreiflich finden, als dafs ich bey den bestimmten Grenzen dieser Schrift

mich



mich nicht in eine ausführliche Angabe aller Kennzeichen der normalen Beschaffenheit der Lebensverrichtungen aller einzelnen Organe einlassen könne, sondern diesfalls meine Leser auf meinen Entwurf Th. II. verweisen müsse; während dem ich mich dieses Ortes schon damit begnüge, die vorzüglichsten Kennzeichen der Gesundheit des menschlichen Organismus überhaupt anzugeben.

§. 106.

Da indessen der Arzt doch vor allen Dingen der Lebendigkeit des zur Behandlung ihm übertragenen Individuums versichert seyn muß, so bemerken wir hier, um denselben Gang unserer Untersuchungen, dem wir im vorhergehenden Kapitel gefolgt sind, auch hier beizubehalten, daß man überhaupt die Gegenwart des Lebens erkenne an der ungestörten Aeufserung der Empfindungen, Bewegungen und Vorstellungen bey vorhandener Integrität und Wirksamkeit der Organe, und ununterbrochener Fortdauer der davon abhängigen Geschäfte, die wir im Allgemeinen gleich näher bestimmen und beschreiben werden.

§. 107.

Uebrigens kann man die Gegenwart der Gesundheit im Allgemeinen an folgenden Zeichen erkennen.

A) Von Seiten des äufsern Habitus des Körpers. Der Körperbau eines ganz gefunden Menschen ist wohlgestaltet, alle Theile haben ihre gehörige Form, Struktur, Gröfse, Lage und Zahl; das Hinterhaupt ist groß und breit, die Brust stark, breit und gewölbt, der Unterleib weich und nicht gespannt, das Muskel-



Muskelfleisch an Waden und Schenkeln prononcirt; die Stirne frei und glatt; der Blick heiter und ungetrübt, die Gesichtszüge gesund, verändern und verwirren sich nicht leicht, sondern bleiben sich gewöhnlich gleich, und verrathen Ruhe und Kraft.

§. 108.

B) Von Seiten des sensibeln Systems.
Die äusseren Sinne empfinden gehörig, sind weder zu stumpf, noch zu fein; alle Sensationen erfolgen mit gehöriger Stärke, sind weder zu schwach, noch übermächtig lebhaft, und erfolgen nur bey adäquater Einwirkung äusserer Einflüsse auf das Nervensystem; die dunkeln Empfindungen des Gemeingefühls fliessen in eine Totalempfindung zusammen, verbunden mit einem Gefühle von Wohlfeyn, und einer thierischen Lust. Die geistigen Funkzionen stehen im harmonischen Verhältnisse zu einander; die Phantasie und Einbildungskraft sind nicht zu lebhaft; keine dieser Funkzionen ist übermächtig verstärkt auf Kosten der andern; der Geist kann mit voller Freyheit seine Herrschaft über alle dieselben ausüben, ohne von letztern auf irgend eine Art selbst beherrscht zu werden. Der Gefunde ist immer zum Denken aufgelegt, übereilt sich nicht in seinem Urtheile, und räsonirt vernünftig. Bey unerwarteten Zufällen bleibt derselbe sich gleich standhaft; seine Affekten sind mässig stark, und gehen bald wieder vorüber; Herz und Kopf sind immer offen und frey. Zwischen Geist und Körper herrscht das schönste Ebenmaass und Einverständnis. Die willkührlichen Muskeln gehorchen nur dem Willen, kommen weder wider, noch ohne den Willen zum Vorschein, und erfolgen sogleich, als es dem Willen gefällt. u. s. w.

§. 109.

§. - 109.

C) Von Seiten des irritabeln Systems. Die gewöhnliche Temperatur eines gesunden Menschen ist 96. Grad Fahrenheit; bleibt sich immer gleich, oder wird wenigstens nicht so leicht durch äussere Einflüsse verändert. Der Puls ist gleichförmig, mässig stark, voll und geschwind; das Blut mehr hoch als dunkelroth, einförmig, fest, konsistent, hat nicht viel Wasser, und gerinnt aus der Blutader genommen leicht und bald. Die Bewegung des Herzens wird nicht bemerkt, nicht gefühlt. Das Athemholen ist leicht, gross, voll und nicht leicht in Unordnung zu bringen, durch Gähnen selten unterbrochen. Alle Muskelbewegungen gehen harmonisch mit einander von Statten; erfolgen mit der gehörigen Leichtigkeit nach der Einwirkung ihrer qualitativen Reitze, und ihre Rezeptivität für dieselben stellt sich bald nach ihrer Zusammenziehung wieder her. Eben fühlt sich der Mensch in gesunden Tagen schlank, und leicht in seinen Gliedern, und Bewegung ermüdet ihn nicht leicht, etc. etc.

§. 114.

D) Von Seiten des reproduktiven Systems. Alle zur Reproduktion gehörigen Funktionen erfolgen mit mässiger Stärke, Lebhaftigkeit, gleichmässiger Zusammenstimmung, und nur bey gehöriger Einwirkung nahrhafter Stoffe, ohne auf irgend eine Art das Zusammenstimmen der dunkeln Empfindungen des Gemeingefühls in ihrer Totalempfindung zu stören. Der Appetit ist mässig, stellt sich immer zur gewöhnlichen Zeit wieder ein; die Verdauung ist kräftig, frey von der geringsten Beschwerde im Unterleibe, und in zwey

F

bis



bis drey Stunden vorüber.. Die Zunge ist rein, des Morgens nicht belegt; der Durst mäßig, die Leibesöffnung leicht, und des Tages gewöhnlich Einmal; die Exkremeute rundgeformt, und von brauner Farbe; Die Haut ist weder feucht oder schweißsig, noch trocken, und fühlt sich immer weich, nachgiebig und warm an. Nirgends eine Spur von Desorganifazion, als Hautausschlägen etc. etc.; der Urin ist gewöhnlich zitronengelb, nicht stinkend ohne Bodensatz. Uebrigens ist der äußere Habitus genau der Individualität der Konstitution des organischen Individuums entsprechend, wovon weiter unten noch ein paar Worte.

§. III.

So wie daher von den bisher gedachten Zeichen bald mehr bald weniger, da oder dort, verschwinden, und an deren Stelle die gerade entgegengesetzten derselben treten, nicht bald wieder vorübergehen, sondern sich fixiren, einen gewissen Umfang annehmen, ändert sich im gleichen Verhältnisse das Bild der Gesundheit ab, und damit nimmt die Befugniss zu, denselben Organismus für an sich wirklich krank anzunehmen und zu erklären. Daher beruht der Grund nicht nur sowohl des Rechtes, als vielmehr unserer Verpflichtung, Iemanden für wirklich krank anzuerkennen, einzig und allein auf der Umkehrung der das Wohlfeyn überhaupt bezeichnenden äußeren Wahrnehmungen.

Indessen will es dem Arzte nicht immer gelingen, das ganze Bild vorliegender Krankheit, gehörig, leicht und schnell aufzufassen, weil zuweilen die Krankheitsform selbst etwas versteckt liegt. Zuweilen ist aber dieses keineswegs der Fall, und dennoch fällt

es mitunter manchen, zunächst angehenden Aerzten, schwer, die eigentliche Form derselben Krankheit aufzufinden. Um daher das Geschäft gerade dieser Untersuchung einiger Massen zu erleichtern, will ich im Allgemeinen die wichtigsten Hilfsmittel hierzu, in Kurzem zusammengefaßt, hier angeben.

§. 112.

Außerdem daß der Arzt am Krankenbette sein Augenmerk auf alle Theile des Kranken Individuums hinrichten muß, und dadurch schon zur Anschauung des vorhandenen Uebelseyns grösstentheils gelangen kann, darf er doch hierbey folgende Punkte ja nicht zu leicht nemen, oder vielleicht ganz und gar übersehen. Nämlich

1) Nicht zu ernst und aber auch nicht läppisch, unbefangen, ungezwungen und bescheiden, aber auch nicht übertrieben freundlich, mit Decenz und Schonung und einem Herzen voll aufrichtigen und guten Willens nähere sich der Arzt seinem Kranken, fasse ihn fest ins Auge, und beginne seine Fragen und Untersuchungen.

2) Ruhig, gelassen, ohne entweder eine lächelnde oder ahndungsvolle Miene anzunehmen, höre er mit Geduld die Leiden Erzählung des Kranken an, ohne denselben zu unterbrechen, und ihn in dem Entwurf seiner vorher vielleicht mit Mühe in einer bestimmten Ordnung sich zusammen gedachten Krankheitsgeschichte zu stören. Daher so häufig die Nachträge des Kranken zu seiner Geschichte oft einige Tage später, wo zuweilen darum, weil der Artz wegen der Unkunde eben der nachgetragenen Punkte seinen Heilplan nicht genau genug berechnet hat, die Krankheit unheilbar geworden ist.

F 2 3) Be-



3) Bemerkt der Arzt in der Erzählung des Kranken vielleicht mancherley Undeutlichkeiten, Unbestimmtheiten oder Lücken, welche in Bezug auf die Bestimmung der Form der Krankheit von Bedeuten seyn können, so befrage er vorerst darüber den Kranken selbst, und wenn dieser ihm keine, oder wenigstens nicht gehörig befriedigende Aufschlüsse geben kann, dann erkundige er sich darüber bey den Umstehenden, Verwandten u. s. w.; und lasse dabey nichts aus den Augen, was ihm der allgemeine Ueberblick des Kranken selbst, seiner Lage, Gesichtszüge u. s. w. ohne weiteres Nachfragen sagen können. Genug der Arzt darf nicht eher mit alle dem zufrieden seyn, bis er jeden Umstand, der in das Gebiet eben dieser Untersuchung eingreift, ausgekundschaftet hat.

4) Nicht immer darf aber der Arzt auf mündliche Bestätigung seiner Diagnose von Seiten des Kranken, am allerwenigsten in Gegenwart anderer Menschen, entweder Fremden oder Verwandten, dringen oder hartnäckig bestehen, besonders dann nicht, wenn Schamhaftigkeit oder andere Ursachen das Detail verbieten. In dergleichen Fällen muß sich der Arzt oft mit einem Winke, oder schamhaften Erröthen, oder mit der am Kranken selbst bemerkbaren geflissentlichen Verschwiegenheit u. s. w. begnügen; und im Falle er selbst noch an der Wahrheit seiner etwanigen Vermuthung zweifelt, nach solchen Dingen Fragen, die dem Kranken indifferent, nicht verdächtig oder verrätherisch scheinen, dem Kenner aber wegen ihrer nahen, obgleich nur mittelbaren Beziehung auf das vermeintliche Objekt über seine Vermuthung mehr oder weniger aufklären können.

5) Hierher gehört auch, daß der Arzt mit denen in dieses sein Fach einschlagenden Provinzialausdrücken, oder mit den unter gewissen, besonders unter den höhern Ständen, üblichen modernen synonymen Benennungen und ihren Bedeutungen bekannt seyn müsse; theils weil manche Menschen über gewisse Dinge gar nicht anders sich ausdrücken und erklären können, theils weil andere hinwiederum durchaus das Kind bey seinem eigentlichen Namen nicht nennen wollen, oder nur nennen hören können, ohne zu erröthen, oder d. g. m.

6) Der Arzt muß ferner von allen denjenigen Dingen, die ihm der Kranke in Bezug auf seine Krankheitsform anvertraut, soviel wie möglich durch seine eigene Sinne sich zu überzeugen suchen, widrigenfalls er immer nicht gewiß seyn kann, ob er sich nicht in seiner Diagnose geirrt habe.

7) Nachdem dieses alles geschehen ist, ist es sehr zweckmässig, und besonders angehenden Aerzten sehr anzuempfehlen, dem Kranken die vernommene Krankheitsgeschichte, soviel es Zeit und Umstände erlauben, in gehöriger Ordnung (worüber gleich noch ein Mehreres) noch zu referiren und dann erst zur eigentlichen Untersuchung der Krankheit selbst zu schreiten.

§. 113.

Das Zweite Erfordernis zur richtigen Erkenntnis der Form einer Krankheit gelangen zu können ist, die wesentlichsten Erscheinungen einer Krankheit auszuforschen, unter diesen selbst wieder das wichtigste und ursprünglich erste, oder das Hauptsymptom heraus zu finden, den kausalen Zusammenhang derselben in Rücksicht ihrer Zeitfolge nach einander zu entwickeln, und
durch



durch diese Vergleichung aller vorhandener Zufälle mit einander die erforderliche Ordnung in die vorhandene Krankheits Geschichte zu bringen. — Dieses ist nicht allein das wichtigste, obgleich auch das schwierigste, Geschäft des untersuchenden Arztes, sondern zugleich auch der einzige Weg, zur wahren Bestimmung der Form der Krankheit und deren richtigen Beurtheilung zu gelangen. Zu diesem Behufe dienet.

a) Sehr oft schon die eigene Aussage des Kranken, welcher gewöhnlich mit seinem größten Leiden, was meistens auch die Haupterscheinung seiner Krankheit ist, seine Klagen und Erzählungen anfängt.

b) Indessen ist dieses doch nicht immer der Fall; oder zuweilen kennt der Kranke sein Hauptleiden selbst nicht, oder dasselbe liegt zuweilen so versteckt, daß es nur mit Mühe ausfindig gemacht werden kann. In diesem Falle wird man sich am besten dadurch helfen, wenn man mit dem Kranken bis auf jene Zeit zurückgeht, wo der Kranke damals sich noch ganz wohlbe- funden hat. Von diesem Zeitpunkte an müssen wir mit dem Kranken nun in seiner Lebensgeschichte vorwärts gehen, genau auf die ersten Spuren krankhafter Aeusserungen, ähnlicher Gefühle u. s. w. aufmerksam seyn, und, wenn während dieser Untersuchung die Geschichte etwas bestimmt sich aufklärt, hin und wieder aber noch dunkle Stellen übrig bleiben, den Kranken anhalten, und bitten, ehe er weiter schreite, vorerst und zunächst die ihm vorzulegende Fragen zu beantworten.

c) Diese Fragen selbst aber müssen von der Art seyn, daß sie unmittelbar auf den Hauptgegenstand der Untersuchung, welcher nur noch mehr beleuchtet werden

den soll und muß, sich beziehen; dabey aber die sinnlose und alles verwirrende Sucht nach Symptomen allerley Art, so wie dergleichen zeitverderbenden und unnützen Fragen durchaus vermieden würden. Zu erstlerem Behufe wird man am besten auf diese Weise verfahren, wenn man die Funkzion desjenigen Systems oder Organs, in welchem die Krankheit ursprünglich ihren Sitz genommen hat, sich ins Gedächtniß zurückruft, und nach denjenigen Kennzeichen, woran man die einzelnen möglichen krankhaften Veränderungen desselben erkennen kann, der Reihe nach genau sich erkundigt, und sodann auf ähnliche Weise zur Erforschung der vorhandenen Zustände zunächst jener Organe übergeht, welche mit dem ursprünglich affizirten entweder überhaupt und wie gewöhnlich, oder aus andern Ursachen z. B. wegen prädominirender habituellen Schwäche vor den übrigen Organen, in der nächsten Verbindung stehen,

d) Außerdem kann auch die Kenntniß der Qualität der eigentlichen Krankheits Ursache zur Erforschung der wesentlichsten Erscheinung der Krankheit verhelfen. u. s. w.

§. 114.

Das dritte Erforderniß zur gehörigen Untersuchung! dieser Art ist die geschichtliche Verbindung aller vorhandener Zufälle, womit das Bild der Krankheit seine eigentliche Vollendung erst erlangt, und die Diagnose der Krankheitsform erst mit Bestimmtheit und Sicherheit ausgesprochen werden kann. Am Zweckmäßigsten wird man aber deshalb auf die §. 113. c. angegebene Weise nebst! gehöriger Berücksichtigung des ganzen



zen Verlaufes der Krankheit, und der sich allmählich nacheinander entwickelnden, und in der Wahrnehmung sich darstellenden einzelnen Erscheinungen, verfahren.

Dabey trenne man aber sorgfältig diejenigen Zufälle, welche mit dem Hauptlymptom der Krankheit, derer Art und Entwicklung in gar keiner kauffalen Verbindung stehen, blos zufällig sind, bald nach ihrer Entstehung wieder verschwinden, das Aussehen der Krankheit nicht im Mindesten entstellen, oft nur Kinder des Tageswechsels sind u. s. w. indem sie die wahre Verbindung der wesentlichen Zufälle oft sehr verdunkeln.

Eben so wenig lasse man sich aber durch dergleichen Erscheinungen, die meist nur Folgewirkungen eines oder des anderen wesentlichen Zufalls sind, wenn sie auch noch so schrecklich sich ansehen lassen, weder in seiner Diagnose noch in sonstiger Hinsicht abschrecken und irre leiten.

§. 115.

Das vierte Erforderniß zum Behufe dieses Geschäftes ist endlich die Erforschung und bestimmte Angabe des gangbaren oder naturhistorischen (nosologischen) Namens der Krankheit, weil man mit der Kenntniß des gewöhnlichen Namens einer Krankheit nicht nur dieselbe Andern bestimmt bezeichnen, sondern gleichfalls auch von Andern darüber anderweitige Nachrichten einziehen, und seine Kenntniß derselben dadurch um vieles aufklären kann.

Ob indessen keine bessere Terminologie hierzu nöthig sey, kann mich hier eben so wenig interessiren, als es ganz außer meinen Plan fallen würde, mich hier in der Angabe der hierzu nöthigen Kriterien, Regeln u. s.

f. w. einzulassen. Daher wir auch in dem zweyten Theile die bisher üblichen Benennungen der dort abgehandelten Krankheiten beybehalten werden.

§. 116.

II. Nachdem nun alle diese Punkte §. 113 — 115. vorher berichtet sind, muß nicht nur der Arzt, sondern kann und darf er nunmehr erst zur *Untersuchung der Krankheit selbst* schreiten, d. h. erforschen, welches die dem vorhandenen Uebelseyn koexistirende ursprüngliche und ursachliche Veränderung des höhern Organismus oder welches die Veränderung sey, die die normale Synthesis oder Proportion der organischen Funktionen erlitten, und als solche das vorhandene Uebelseyn hervorgebracht habe.

Nur dann erst, wenn wir dieses ausgekundschaftet haben, aber auch nur dann allein erst können wir nicht sowohl mit Rechte behaupten, die Krankheit selbst ihrer Natur und Wesenheit nach ausgeforschet, oder die wahre Konstruktion der Krankheit gefunden zu haben, als wir vielmehr verpflichtet sind, unsere Untersuchung der Krankheit nicht eher einzustellen, oder als erschöpft und vollendet anzuerkennen, bevor wir die bestimmte Disproportion der organischen Funktionen erforscht, und aus derselben die Nothwendigkeit sowohl des vorhandenen individuellen Erregungszustandes des Kranken organischen Individuums, als auch der durch denselben bewirkten und vorhandenen wahrnehmbaren krankhaften Veränderungen und Erscheinungen deduzirt und bewiesen haben.



§. 117.

Daß man übrigens, streng genommen, und der Möglichkeit nach betrachtet, zur Erkenntniß des wesentlichen Karakters einer Krankheit (§ 116) durch genaue Erforschung der vorhandenen diagnostischen Zeichen absolut auch gelangen könne, will ich vorerst wenigstens nicht durchaus, d. h. für alle möglichen Krankheitsfälle, geradezu absprechen, sobald wir nur erst in dem Besitze einer gehörig und gründlich bearbeiteten Semiotik seyn werden. Allein, außerdem daß nicht selten sich geradezu entgegengesetzte Krankheiten in der Wirklichkeit und für die Wahrnehmung durch dieselben Erscheinungen sich ankündigen und darstellen, würde es selbst in dem ex hypothesi angenommenen möglichen Falle einer gehörigen Bearbeitung der Semiotik auch dem geübtesten und schärfsten Auge nicht nur sehr oft ganz unmöglich seyn, die möglichen feinen Nuanzen, wodurch sich dem ersten Ueberblicke nach ganz gleichscheinende Erscheinungen dennoch von einander unterscheiden sollen, oder auch wirklich unterscheiden, gehörig und sogleich, als es erfordert wird, heraus zu finden.

Demnach bleibt uns nichts übrig, als der Erforschung aller auch der mindesten diagnostischen Zeichen die zur Ergründung des eigentlichen Krankheits Karakters erforderliche Zuverlässigkeit vorerst wenigstens abzuspochen oder doch zu suspendiren.

§. 118.

Bey alle dem aber gebricht es uns doch nicht an Hilfsmitteln, derer wir uns zu diesem Geschäfte mit mehr Zuverlässigkeit bedienen können. In sofern nämlich den organischen Funkzionen zunächst nur das Vermögen zukommt

kommt, wechselseitig sich zu differenziren; dieses Vermögen derselben aber nur solange sich erhält, als die organischen Thätigkeiten wirklich sich differenziren; die Wirklichkeit oder das Bestehen gedachter Differenzirung hinwiederum zunächst von den Einwirkungen von Außen auf den Organismus abhängt, begreift es sich von selbst, daß die Beschaffenheit der organischen Differenz, als Wirkung, immer und nothwendig nicht nur gleich seyn werde dem Charakter und der Eigenthümlichkeit oder Individualität der äußern Einflüsse, als Ursache der ersten, sondern daß das bestimmte Differenzverhältniß der organischen Funktionen in demselben Augenblicke und auf dieselbe Weise verändert werde, als sich die äußeren Einwirkungen auf den Organismus abändern.

§. 119.

Der bis itzt wenigstens bekannte sicherste Weg, den wesentlichen oder Heilungskarakter irgend einer Krankheit zu erforschen, wäre demnach die Ergründung der eigentlichen Krankheits Ursache, d. h. der äußeren Einflüsse, welche die Krankheit herbeygeführt haben, und deren Wirkungsart, so wie der direkte Schluss von der Beschaffenheit derselben auf jene des Organismus oder der organischen Synthesis.

§. 120.

Dieses vorausgeschickt, bemerken wir nunmehr, daß zur Erleichterung und Leitung der *Erforschung der eigentlichen Krankheit* überhaupt folgende Regeln die wichtigsten sind, und genau am Krankenbette berücksichtigt und befolgt werden müssen. Nämlich

- 1) Suche man sorgfältig alle Momente der Ursache der vorhandenen Krankheit auszukundschaften, und sodann



dann ihre gemeinsame Wirkungsart, d. h. ob positiver oder negativer Natur seyen, aufzufinden.

2) Nicht immer aber vermag (es der Kranke oder auch selbst die Umstehenden, dem Arzte die eigentliche Ursache anzugeben, entweder weil der Kranke wenig oder gar nicht sowohl über sich, seine körperliche Existenz, als über die äußern Umgebungen, und deren Verhältnisse zu derselben reflektirt, bewußtlos in den Tag hinein lebt, oder weil ihn die Krankheit ganz unerwartet und plötzlich überfallen hat, oder weil er so manche Dinge für ganz unschuldig ansieht, in ihnen kein Arges setzt, und darum derselben bey seiner Relazion gar nicht, auch nicht in der weitesten Ferne gedenket u. s. w. Darum ist es durchaus nothwendig, daß der Arzt die sämmtlichen Ursachen, welche die gegenwärtige Krankheit hervorbringen können, kenne, und bey der Untersuchung der Krankheit stets vor Augen habe, um den Kranken über dieselben einzeln vernehmen zu können, und auf diesem Wege eher zur sichern Kenntniß der wahren Krankheitsursache, und mittelst derselben zur Einsicht in die Natur und Wesenheit der Krankheit zu gelangen. (Was diesen Punkt der Untersuchung der Krankheit anlangt, werde ich bey den Untersuchungen über die im zweyten Theile dieser Schrift aufgestellten Krankheiten die gewöhnlichsten Momente der Ursache derselben jedesmal mit angeben.)


3) Zu eben dieser Absicht ist es ferner auch nöthig, alles dasjenige, was vor dem Ausbruche gegenwärtiger Krankheit zunächst mit oder in dem Kranken selbst vorgegangen ist, genau zu erforschen, indem nicht selten die wichtigsten und mehresten Momente
der



der Ursache irgend einer Krankheit oft in dem nunmehr erkrankten Organismus selbst liegen, und sich ausgebildet haben. Daher muß der Arzt genau sich zu unterrichten suchen, wieviel Zeit zwischen der Einwirkung der äußern schädlichen Einflüsse, und dem Ausbruche gegenwärtiger Krankheit verstrichen sey. Eine gründliche Kenntniß der Nosohistorie wird ihm dann schon von selbst sagen, was mittlerweile auf Veranlassung der ursprünglichen Krankheits-Ursache im Innern des Organismus selbst vorgegangen seyn könne, oder wirklich vorgegangen sey, und von welcher Beschaffenheit dann die im Organismus selbst erzeugten Momente seyen u. s. w.

4) Eben so wichtig, als zu diesem Behufe höchst nothwendig ist es auch, daß der Arzt mit allen Umgebungen des Kranken, insofern sie Ursache des gegenwärtigen Krankheitszustandes seyn können, sich bekannt mache. Dahin gehören der epidemische Zustand der Luft, die allgemein herrschende Krankheits-Konstitution, durch deren Kenntniß beym Mangel sicherer Kriterien unsere Diagnose oft allein noch mit einiger Wahrscheinlichkeit, oder wenigstens mit mehr, als außerdem möglichen Zuverlässigkeit bestimmt werden kann. Ferner die inneren und äußern Verhältnisse des Kranken z. B. eine geheime Liebenschaft. Eben so wichtig ist die Kenntniß der diätetischen und medizinischen Behandlung u. s. w.

5) Hat man indessen so genau wie möglich alle die einzelnen Momente, welche zur Erzeugung der gegenwärtigen Krankheit abwechselnd mit beygetragen haben, zu erforschen gesucht, so hüte man sich doch, nur nicht so schnell über den etwanigen Charakter derselben Krankheit abzuurtheilen. Denn sehr oft giebt uns entweder
der



der Kranke selbst dasjenige als Ursache seiner Krankheit an, was er nach seiner Ueberzeugung dafür hält, z. B. Erkältung; oder der Arzt selbst begnügt sich leider nur zu oft entweder mit der eigenen Aussage des Kranken, ohne ihre Gültigkeit gehörig geprüft zu haben, oder mit seinem eigenen allgemeinen Ueberblick einer ihm höchst wahrscheinlichen Ursache; daher denn die falschen Diagnosen, und eben so zweckwidrigen Behandlungsarten so mancher Krankheiten.

Das einzige und sicherste Mittel, diesen so leicht möglichen, als eben so leicht höchst nachtheiligen Verirrungen in diesem Punkte auszuweichen, besteht dagegen darin, daß der Arzt von dem Zeitpunkte der Einwirkung der angegebenen vermeintlichen Krankheitsursache an mit dem Kranken seine ganze Lebensgeschichte, welche zwischen diesem Zeitpunkte und dem Momente des Ausbruches der Krankheit selbst fällt, genau durchgeht, seiner etwanigen eigenen Unkunde nach (§. 113. b) angegebener Weise zu Hülfe kommt, und nicht eher sich zur Ruhe giebt, bis er ausgekundschafftet, was und von welcher Beschaffenheit dasjenige gewesen sey, was unmittelbar vor dem Ausbruche der Krankheit selbst auf den Kranken eingewirkt habe. So z. B. klagt sich zuweilen der Kranke an, sich bloß erkältet zu haben, ohne zu bemerken, daß er aus der strengsten Kälte schnell in ein stark geheiztes Zimmer gekommen sey, oder sehr erhitzende Getränke, und auch diese in nicht kleinen Porzionen zu sich genommen habe u. d. gl. Jedes Uebersehen dieses Umstandes, welcher der wichtigste für die wahre Diagnose der Krankheit ist, muß und wird auch immer in jeder Hinsicht höchst nachtheilig seyn,



feyn; oder vielmehr ist ohne Berücksichtigung gerade dieses Umstandes oder dieser Regel gar keine sichere Diagnose der Krankheit möglich.

§. 121.

III. Eben diese letztens gedachte Regel (§. 120. 5.) ist es, vermittelt welcher wir nicht nur am sichersten, sondern beynahe allein mit Zuverlässigkeit erfahren können, zu welcher *Klasse von Krankheiten* die gegenwärtige gerade gehöre, d. h. ob sie *sthenischer* oder *asthenischer* Natur sey (§. 118.) Demzufolge muß es der klinische Arzt sich vorzüglich angelegen seyn lassen, bey seiner Untersuchung irgend einer Krankheit die Beschaffenheit und Wirkungsart derjenigen Schädlichkeiten, mit welchen dieselbe in ursachlicher Verbindung steht, genau zu betrachten, und dieser gemäß die Diagnose der Krankheit selbst zu entwerfen.

§. 122.

Bevor wir aber noch etwas bestimmtes über die allgemeine Beschaffenheit irgend einer Krankheit entscheiden dürfen, oder mit Rechte können; müssen wir uns über folgende Punkte, welche hierauf mächtigen Einfluß haben, und deren Vernachlässigung zu ganz falschen Resultaten in jeder Hinsicht verleiten, vorerst genau zu unterrichten suchen. Wir müssen nämlich wissen:

a) Welches die individuellen Verhältnisse des affizirten Organismus seyen, d. h. welches seine Konstitution, wie groß der Grad sowohl seiner Rezeptivität als Kapazität oder Vertragsamkeit äußerer Einwirkungen seyen, in welchem Jahre derselbe stehe, zu welchem Geschlechte er gehöre, was für Gewohnheiten er an
sich



sich habe u. s. w.; indem alle diese Momente, ob sie gleich zunächst für die Gradebestimmung einer Krankheit besonders wichtig sind, dennoch auch die Möglichkeit der Erzeugung sowohl sthenischer als asthenischer Krankheiten mannichfaltig abändern, was hier keiner weitem Erörterung nunmehr noch zu bedürfen scheint.

b) Welche Einflüsse gewöhnlich auf diesen Körper wirken, und einwirken mußten, um die gehörige und erforderliche Integrität seiner individuellen Gesundheit zu unterhalten, d. h. wie viele und welche erregende Potenzen gerade, und in welchem Grade dieselben wirkten, um die gewöhnliche Summe und Stärke der Einwirkung derselben zu geben, bey deren Einwirkung er sich wohl befand.

c) Welche Veränderung mit der Summe der gewöhnlichen Lebensreize vorging; d. h. ob sie mit neuen beträchtlich verstärkt, oder ob von derselben ein beträchtlicher entweder hinweggenommen worden, oder an deren Stelle zunächst negativ wirksame Potenzen getreten seyen, das heist aber unmittelbar vorher, als die gegenwärtige Krankheit ihren Anfang nahm, oder zum Vorschein kam.

§. 123.

Von sthenischer Beschaffenheit werden wir also eine Krankheit anerkennen müssen.

a) Wenn die schädlichen Einflüsse, welche unmittelbar vor der Erscheinung der Krankheit auf den Organismus eingewirkt haben, positiv wirksamer Natur waren.

b) Wenn die Gewalt ihrer Einwirkung größer war, als der normale Energiegrad desselben Organismus;

mus; denn nur dadurch vermögen positive Reize erst Sthenie hervorzubringen. (§. 122. a.)

c) Zuweilen ergiebt es sich aber, daß die Energie der Krankheits-ursachlichen Einflüsse bey weitem noch geringer war, als die des Organismus selbst. In diesem Falle entscheidet hierüber zunächst erstens die Fortdauer der schädlichen Einwirkung, zweytens die Länge der Dauer der der Krankheit selbst vorhergegangenen Unpäßlichkeit, bey drittens völliger Abwesenheit oder auch Unbedeutenheit sowohl der gewöhnlichen, als auch anderer zufälliger negativer Einflüsse; wie wohl dieses Kriterium nicht nur die allerstrengste Prüfung aller Nebenumstände der im Werden begriffenen Krankheit erfordert, sondern bey Weitem nicht den Grad von Zuverlässigkeit giebt, als a und b.

d) Noch unzuverlässiger als c) ist der Schluss von den diagnostischen Zeichen auf die Natur und Beschaffenheit einer Krankheit (§. 117.) Indessen können wir doch auch, mit gehöriger Würdigung ihrer Gültigkeit, die Erscheinungen, welche im Zustande der wirklich ausgebrochenen Krankheit sich offenbaren, im Nothfalle wenigstens einiger Massen als Hilfsmittel zur Untersuchung, und folglich zur Bestimmung des vorhandenen Krankheits-Karakters benutzen.

Die bey sthenischen Krankheiten gewöhnlichen Erscheinungen und Zufälle aber sind.



Erhöhung der Sinne, der Bewegungen und der Geisteskraft mit ungewöhnlicher Ausdauer ihrer Verrichtungen, voller, starker, harter und etwas frequenter Puls; vermehrte Stärke in allen Lebensverrichtungen; daher Zunahme des Appetits, verstärkte Verdauung verbunden mit grösserer oder geringerer Stuhlverhaltung, heftiger Durst bey beschleunigter Respiration und erhitztem Athem, mehr trockene Haut, mit Blässe und Röthe abwechselnd; dunkelbrauner oder abwechselnd heller und heisser Urin; verstärkte Kontraktion in den willkürlich beweglichen Muskeln, Röthe in den Gefässen der Oberfläche der Augen, oder Funkeln derselben, Kopfweh, Irrereden, Hitze über den ganzen Körper, Heiserkeit, Husten meist trockener Art, mehr zusammengezogener, als aufgetriebener Unterleib bey meist trockenem Munde u. s. w.

§. 124.

Asthenischer Natur wird dagegen eine Krankheit seyn, so wie auch dieselbe dafür angenommen werden müssen:

a) Wenn entweder die Summe der gewöhnlichen Lebensreize um ein beträchtliches vermindert worden ist, oder die schädlichen Einflüsse, welche die vorhandene Krankheit unmittelbar hervorgebracht haben, negativ wirkfame Potenzen waren.

b) Wenn entweder die Grösse der Verminderung der Summe der gewöhnlichen Lebensreize, oder die Gewalt der negativ wirkfamen Einwirkungen

gen denjenigen Grad, bey welchem die Integrität der Gesundheit oder die Individualität desselben Organismus allein noch bestehen kann, um ein beträchtliches überschritten hat.

- c) Wenn gedachte Ursache der Asthenie, obgleich an sich von geringer Gewalt, dennoch aber eine Zeitlang ununterbrochen auf den Organismus eingewirkt, z. B. Kummer, die dadurch erregte Unpäßlichkeit unausgesetzt lange schon andauert, und mittlerweile wenig, oder gar keine positiven Reize, oder wenn auch, dennoch nicht mit der erforderlichen Energie auf denselben Organismus eingewirkt haben.
- d) Ausserdem sind die gewöhnlichen und allgemeinen Erscheinungen bey der Asthenie:

Schauer oder Frost mit schnell vorübergehender Hitze abwechselnd, zunehmende oft unerträgliche und den Kranken peinigende Schärfe der Sinne, vermehrte Leichtbeweglichkeit aller Theile des Organismus, verbunden oder abwechselnd mit einer gewissen Hastigkeit in den Verrichtungen derselben, grössere Behändigkeit aller geistigen Funktionen, wobey aber durchaus Energie und Ausdauer mangelt, jede leicht übermässige Anstrengung vielmehr totale Abspannung aller dieser Verrichtungen bewirkt. Ferner schwacher, kleiner, weicher und sehr frequenter Puls; Mangel an Appetit, Ekel vor Speisen, mitunter mit Heishunger abwechselnd, wobey aber die Verdauung mehr oder weniger leidet;



gestört und geschwächt ist, verbunden mit Drücken, Schmerzen, Spannen im Magen, oder dem übrigen Darmkanal, wozu sich gewöhnlich Säure im Magen, Auftreiben des Unterleibes mit flüssigen und zu leichten, oder mit harten und schweren Stuhlgang noch gesellt. Ferner: beständiges Gefühl von Kälte auf der Haut, stets mit Röthe und Trockenheit, Blässe und Schweiß abwechselnd; meistens vermehrte, zuweilen aber unterbrochene und erschwerte Urinabsonderung; sehr leicht mögliche Anfälle von Krämpfen und Konvulsionen, die mehr oder weniger des ganzen Körpers sich bemächtigen; Schlaflosigkeit oder Schlaffucht; Verwirrungen der Lunge mancherley Art mit meist kaltem Athem, und Husten, welcher aber mehr feucht als trocken ist, wenn er nicht zwischendurch durch Krampfanfälle der Lungen prellend und trocken wird; totale Abspannung des Körpers mit unter mit Delirien oder Betäubung vergesellschaftet bey mehr matten und eingefallenen Augen, Schläfen, Wangen u. s. w.

§. 125.

IV Nachdem wir nun nach den bisher §. §. 123. 124. angegebenen Kriterien ausgemittelt haben, zu welcher Klasse von Krankheiten irgend ein vorhandener Krankheitsfall gehöre; müssen wir in unserer Untersuchung der Krankheit weiter schreiten, und zu erforschen suchen, zu welcher Gattung von Krankheiten derselbe gerechnet werden könne oder müsse, d. h. mit andern Worten: ob der vorliegende Krank-

Krankheitsfall rein sthenischer oder hypersthenischer, rein asthenischer oder hyperasthenischer Beschaffenheit sey.

§. 126.


Im Ganzen und streng genommen gehört dieser Gegenstand zwar zur Untersuchung über die Gradeverschiedenheiten der Krankheiten; allein um ihn wenigstens an seinem Orte, den er in der Folge der zur Untersuchung der Krankheit erforderlichen Momente einnimmt, im Allgemeinen aufzufassen, und eben so überhaupt nur zu bezeichnen, indem wir unsere Leser, die nähere Beleuchtung dieses Gegenstandes betreffend, zunächst auf die nachstehende Untersuchung V verweisen, bemerken wir zum Behuf dieser Erkenntniß dieses Ortes überhaupt nur folgendes:

§. 127.

Erstens wird eine Krankheit um so länger rein sthenischer oder rein asthenischer Natur seyn, bleiben, und dafür anerkannt werden müssen,

- a) Wenn der Grad der Rezeptivität an sich schon nicht sehr groß, und der Kapazitätsgrad des Organismus an sich schon nicht sehr gering war, als die Krankheits Ursache auf denselben einwirkte;
- b) Wenn Verhältnismässig die Gewalt der schädlichen Einflüsse nicht gar zu stark war, und diese auch nicht auf einem Male in ihrer Gesamtheit auf den kranken Organismus einwirkten.
- c) Wenn zu der schon vorhandenen Krankheitsursache noch neue ähnliche Momente sich hinzugesellen.

d)



- d) Wenn die Krankheit selbst noch nicht lange angedauert hat;
- e) Wenn die Krankheit selbst nicht sehr schnell verläuft; und endlich:
- f) Solange im Durchschnitte die die Krankheit selbst begleitenden Erscheinungen noch dieselben sind, wie wir §. §. 123. 124. angegeben haben.

§. 128.

Zweitens aber wird eine Krankheit für eine hypersthenische oder hyperasthenische angenommen werden müssen,

- a) Wenn so eben erwähnte Punkte §. 127. a — e gerade umgekehrt, oder entgegengesetzter Art sind;
- b) Wenn sich einstellen totale Gefühl -- und Empfindungslosigkeit, Verlust aller willkührlichen Bewegungen, häufige, heftige und hartnäckig andauernde Krampfszufälle; gänzlicher Mangel an Esslust, und Verdauung, heftiges und häufig wiederkehrendes Erbrechen; besonders von Schleim und Galle, Meteorismus, Trommelfucht, Diarrhoe, die bewusstlos vorhanden ist, stark gelbfüchtiges Aussehen, Flockenlesen, epileptische und apoplektische Zufälle, beständiger Schauer mit abwechselnd fliegender Hitze; welcher endlich in die schrecklichste Kälte über den ganzen Körper übergeht, häufige und klebrige, mehr kalte als warme Schweisse, profusse Haemorrhagien u. s. w.

Hierbey muß zugleich aber auch bemerkt werden, daß Hypersthenie und Hyperasthenie, beide der äußern Form



Form nach sich völlig gleich sind, aus Gründen, die ich in meinem Entwurfe bestimmt angegeben habe. Daher man aus den angegebenen Zeichen nur erkennen kann, ob der vorhandene Krankheitsfall überhaupt der Hypersthenie oder Hyperasthenie angehöre, keineswegs aber ob derselbe bestimmt hypersthenischer und nicht hyperasthenischer Beschaffenheit, und umgekehrt sey. Um letzteres zu erfahren, müssen wir vorerst die III. §. 121. — 124. gedachte Untersuchung vornehmen.

§. 129.

V. Indessen können wir auch dann, wenn selbst der eben erörterte Punkt berichtigt ist, unsere Untersuchung der Krankheit keineswegs für wirklich vollendet ansehen, sondern nunmehr ergeht ferner die Forderung an den klinischen Arzt, zu erforschen, welche von den organischen Funkzionen in Betreff der Erzeugung und Darstellung der vorhandenen krankhaften Erscheinungen das Vorspiel, d. h. welcher Funkzion, oder welchem Systeme die gegenwärtige Krankheit angehöre; oder, *von welcher Art dieselbe sey*; nämlich ob sie sensibler, irritabler oder reproduktiver Art sey. Denn jeder Einfluss von aussen auf den Organismus stehet schon durch die Unmittelbarkeit seiner Einwirkung auf einen oder den andern Theil desselben mit diesem nothwendig auch in näherer Beziehung, und causaler Verbindung. Obgleich an der Einwirkung von Aussen nothwendig alle Funkzionen und zwar in einem und demselben Momente zugleich Theil nehmen, d. h. in Thätigkeit gesetzt werden, indem die Regsamkeit jeder einzelnen Funkzion von der gleichzeitigen Wirksamkeit der beiden

den



den andern ihr Koexistirenden nicht nur abhängt, sondern erstere ohne letztere gar nicht möglich ist; so wird dennoch der Grad der Affektion derjenigen Funktion, auf welche der äußere Eindruck zunächst und unmittelbar eingewirkt hat, eben aus dieser Ursache immer größer seyn, als jener der nur mittelbar affizirten Funktionen; erstere folglich zunächst in Beziehung auf die Form oder äußere Darstellung irgend einer Krankheit die erste Rolle spielen, die Grundzeichnung und Hauptfarben, welche den Gegenstand des Gemäldes und seinen Hauptcharakter bestimmt darstellen, hergeben; während die beiden andern gleichzeitig affizirten Funktionen nur die Schattirung und Nuancirung des Ganzen liefern, und nur dazu dienen, die bestimmte Individualität des eigentlichen Gegenstandes des Gemäldes nur mehr zu pränonciren.

§. 130.

Gelegentlich mag daher die Bemerkung hier stehen, nämlich daß wir nicht mit zur Erkenntniß der wesentlichen und charakteristischen, oder pathognomonischen Erscheinungen einer Krankheit einzig und allein durch die Kenntniß der Art derselben gelangen können, sondern daß wir, um erstere zu erforschen, nothwendig letztere vorerst ausfindig machen müssen. (§. 113.)

§. 131.


Die Mittel, zu dieser Erkenntniß zu gelangen, sind indeß folgende:

Erstens) Die Erforschung der eigentlichen Konstitution des Kranken. Im Durchschnitte genommen sind zwar die organischen Funktionen allen Individuen gemein; demungeachtet aber
ist

ist die Mischung oder Proportion derselben nicht durch das ganze organische Naturreich sich ganz gleich, sondern ändert sich auf mannichfaltige Weise ab, wobey immer eine oder die andere derselben Funkzionen, ohnerachtet ihres Gleichgewichtes zu einander, dennoch einen relativ größeren Antheil an der Konstruktion derselben haben, und vor den übrigen prädominiren wird. Eine so bestimmte Mischung der organischen Funkzionen, wobey immer die eine derselben einiger Massen wenigstens das Vorspiel vor den übrigen hat, nennen wir Konstitution, die wir zum Behuf der Erforschung der Art einer Krankheit jedesmal bestimmt kennen müssen, weil überhaupt, (wenn nicht andere Umstände, deren wir gleich auch gedenken werden, die Sache anderst modifiziren,) die äußeren Einwirkungen nothwendig die prädominirende Funkzion, eben ihres Vorspiels wegen, immer zuerst ergreifen wird, somit die Haupterscheinungen der Krankheit meistens und vorzüglich nicht nur in dem derselben entsprechenden Phänomen oder System zum Vorschein kommen, stets um dasselbe herumkreisen, sondern eben darum auch ganz, wenn auch nicht immer (wovon weiterhin ein Mehreres) doch wenigstens anfänglich und meistens den demselben eigenthümlichen Karakter annehmen und beybehalten werden.

Die Hauptverschiedenheiten der Konstitutionen im Allgemeinen übrigens anlangend, lassen sich dieselben auf drey Hauptarten reduzieren, nämlich auf die sensible, irritable und reproduktive Konstitution. Man erkennt dieselben, so wie ihre Verschiedenheiten an folgenden Aeußerungen, mit welchen sie

in-



in der Welt der Erscheinungen ihre Gegenwart verkünden und darthun. Nämlich

a) Die sensible Konstitution. Die vorzüglich eigenthümlichen Charaktere derselben sind: blaue Augen, blonde Haare, Empfindlichkeit ohne Kraft bey bestehender Reizbarkeit, ein schwammichter und zarter Körperbau, mehr weiche als feste, mehr nachgiebige als elastische Muskeln, sehr feine, volle und leicht ausdehnbare Gefäße nebst davon abhängender Röthe des Gesichtes auf sehr weisem Grunde desselben, bey gutem Appetit, gleicher Verdauung und Ernährung, ein geschwinder, voller, oder auch kleiner, schwacher und weicher Puls, Leichtigkeit aller Gliederbewegungen bey meist schlanken und biegsamen Wuchse mit baldiger Ermüdung nach jeder ungewohnten, wenn auch nicht gerade übermäßigen Anstrengung, Neigung zu vielen und erquickenden Schlaf, lebhafte Augen, vortreffliche Geistesanlagen ohne Anstrengung und Ausdauer, ausnehmende Empfänglichkeit für alles, aber ohne Haltung, Flüchtigkeit und Unstätigkeit des Charakters, Hang zur Weichlichkeit und Ausschweifung, körperliche Ungeduld und Unerträglichkeit schmerzhafter Gefühle, Anlage zu Fiebern, Entzündungen, Ohnmachten und Blutflüssen u. f. w.

Diese Konstitution ist übrigens meistens Kindern, Jünglingen und Frauenzimmern eigen.

b) Die irritable Konstitution, im Durchschnitte dem mittlern Alter eigenthümlich, hat im Durchschnitte folgende Kennzeichen: schwarz braune Augen, schwarze Haare, ein dichter stark begliederter, kräftiger und sehr behaarter Körper, glänzende feurige Augen, grofse


große und starke Gefäße mit leichter Anschwellung, schneller, starker und heftiger Puls, guter Appetit besonders nach Fleisch, bey guter Verdauung, eine große Lebhaftigkeit und Thätigkeit bey körperlichen Beschäftigungen, Schnelligkeit und Leichtigkeit in allen Bewegungen, mäßiger aber fester und erquickender Schlaf, Schärfe der Beurtheilungskraft, erhöhte Geistesfähigkeit, heftiger Zorn bis zur Rachsucht, ungewöhnliche Ausdauer und Vertragbarkeit der Arbeit, Beschwerlichkeiten und Gefährlichkeiten, Anlage zu Krämpfen, Schlagflüssen, heftigen Entzündungen, Gelbsucht.

c) Die reproduktive Konstitution meistens Jünglingen, dem mittlern Alter, jungen Männern und arbeitsamen Leuten eigen, charakterisirt sich durch einen Mittelgrad von Reizbarkeit und Empfindlichkeit, verbunden mit einer beträchtlich starken Energie und Ausdauer der Irritabilitätsäußerungen, geringe Verwundbarkeit, schnelle Wiedererzeugung ersetzbarer Theile, mehr langsamen als schnellen, vollen und kräftigen, aber dennoch mehr weichen als harten Puls, vollen und runden Körperbau, mehr bleiche oder rothe Farbe der Haut und des Gesichtes, vielen, starken und öfteren Appetit bey schneller und kräftiger Verdauung und Ernährung, Langsamkeit aller geistigen Funktionen, Unfähigkeit zu vielem und anhaltendem Denken, Trägheit bey körperlichen Arbeiten, Neigung zur Ruhe und Schläfrigkeit, u. f. w.

§. 132.

Zweytens. Die Erforschung der wahren Krankheitsursache (§. 118.), und zwar ins Besondere folgender Punkte:

a)



- a) Dessen, was überhaupt die einzelnen ursachlichen Momente in ihrer kausalen Verbindung im Bezuge auf den lebenden Organismus im Allgemeinen hervorzubringen vermögen.
- b) Dessen, was jeder Faktor der Krankheitsursache einzeln, seiner Qualität gemäß im Organismus produziren werde und könne.
- c) Welches das Gradeverhältniß jedes einzelnen Faktors der Totalursache zu den übrigen sey, d. h. welches Moment derselben das Meiste zur Totalität der Krankheitsursache beygetragen habe, das wichtigste sey.
- d) Von welcher Qualität eben dieses wichtigere Moment der Krankheitsursache sey, d. h. zu welcher Funkzion dasselbe die nächste Beziehung habe.

§. 133.


Drittens. Die Erforschung desjenigen Organs oder Systems, auf welche die Totalursache der Krankheit unmittelbar einwirkt habe. Sobald nämlich die Qualität der Krankheitsursache selbst die Sache nicht bestimmt modifizirt, wird immer diejenige Funkzion, welche in dem angegriffenen Organe die vorherrschende, am meisten affizirt werden und seyn, und eben darum die Art der vorhandenen krankhaften Affekzion nach der Qualität eben derselben Funkzion bestimmt und angenommen werden müssen. (§. 120. 5.)

§. 134.

Viertens. Die Erforschung der Art der Veränderung der eigentlichen Proportion
oder

oder des normalen Kaufalverhältniffes der organifchen Funkzionen in dem urfprünglich affizirten Organismus. Jedes organifche Individuum nämlich, fo wie jeder individuelle Organismus ins Befondere des menfchlichen Körpers, beſteht aus einer beſtimmten Miſchung der organifchen Funkzionen. Sobald dieſe beträchtlich verändert wird, entſteht nicht nur Krankheit, ſondern die Art der Krankheit wird im Durchſchnitte gleich ſeyn der Qualität der vorherrſchenden Funkzion deſſelben urſprünglich und unmittelbar affizirten Organismus.

Indeſſen behält aber nicht jede Krankheit, beſonders aſtheniſcher Natur, auſſer den urſprünglich krankhaften Affekzionen des ſenſibeln Systems, durchaus, d. h. bis zu ihren tödlichen Ausgang, denſelben urſprünglichen erſten Karakter bey. Im Gegentheile, da Krankheit überhaupt nur in der Umänderung der normalen Proportion der organifchen Funkzionen beſteht, bey dieſer Umänderung derſelben aber an der Totalſumme der gegenseitigen Intenſitätsgrade der geſamnten organifchen Funkzionen durchaus nichts verloren gehet, ſondern ſoviel als die Energie der einen Funkzion zunimmt, eben ſoviel die andere verliert, und umgekehrt um ſoviel Grade, als die Energie der einen Funkzion geſchwächt, die der andern verſtärkt wird, muß es nicht nur endlich kommen, ſondern es geſchieht auch wirklich, daß mit der Zunahme der Krankheit, z. B. bey vorhandener Aſthenie, die urſprünglich affizirte Funkzion, ob ſie gleich in dem unmittelbar angegriffenen Organismus das Uebergewicht der Stärke vor den übrigen Funkzionen hatte, dennoch ſo ſehr depotenzirt wird, daß endlich die entgegengeſetzte



setzte Funkzion das Uebergewicht erhält, als die vorherrschende hervortritt, und damit nicht nur die Form der Krankheit verändert, sondern der Krankheit selbst einen qualitativ anderen Karakter mittheilt.

Sobald dieser Moment in der Verlaufszeit einer Krankheit sich einstellt, ändert sich nämlich sogleich das Kaußalitätsverhältniß der organischen Funkzionen um, d. h. diejenige Funkzion, welcher im normalen Zustande sowohl, als auch bis zu diesem Moment der Krankheit wegen ihrer überwiegenden Energie die Richtung und den Gang der übrigen Funkzionen bestimmte, hört nicht nur nun auf zu bestimmen, sondern wird vielmehr von der nunmehr überwiegenden Funkzion bestimmt; d. h. vormals eigentlich Ursache der bestimmten Koexistenz der übrigen Funkzionen als gleichsam ihrer Wirkungen, ist sie nunmehr selbst zur Wirkung depotenzirt, während sie die andere Funkzion gleichsam als ihr Ursachliches oder vielmehr Bestimmendes anerkennen muß. Mit dieser Umänderung des Kaußalitätsverhältnisses der organischen Funkzionen wird auch zugleich die Qualität der Krankheit ungeändert, d. h. sie ist nun nicht mehr die vorige und ursprüngliche, sondern sie ist nunmehr eine andere, ganz gleich der Qualität derjenigen Funkzion, welche mit der Zunahme der Krankheit nunmehr über die ursprünglich affizirte Funkzion das Uebergewicht erhalten hat.

§. 135.

Man nehme nämlich z. B. an, in einem organischen Individuum, oder in irgend einem dem irritablen Systeme zunächst angehörigen Organe, verhalte sich im Normalzustande die Sensibilität zur Irritabilität wie 10:

20. Irgend eine negative Potenz wirke nun auf dasselbe ein, und ergreife vorzüglich die Irritabilität, so wird wie die Irritabilität von 20 z. B. zu 17 depotenzirt wird, die Sensibilität zwar bis zu 13. potenzirt werden, dennoch aber die Irritabilität wegen ihrem Uebergewichte noch die den Charakter oder die Art der Krankheit bestimmende Thätigkeit bleiben. Sobald aber die Irritabilität noch mehr z. B. von 17 bis zu 12 oder 10 depotenzirt wird, wird nicht nur die Sensibilität bis zu 18 oder 20 potenzirt werden, sondern eben dem nunmehrigen Uebergewichte der Sensibilität über die Irritabilität erstere an die vormalige Stelle der Irritabilität treten, d. h. die Form so wie den individuellen Charakter der Krankheit bestimmen, und ihrer Qualität gemäß umändern, d. h. die vormals irritable Asthenie wird nun mehr als eine gleichsam ursprünglich sensible angesehen werden müssen.

§. 136.

Auf beynahe ähnliche Weise verhält es sich mit den besonders asthenischen Affektionen entweder eines reproduktiven Subjectes, oder irgend eines demselben angehörigen Organs. Man nehme z. B. an, es verhalten sich in demselben die Sensibilität wie 12, und die Irritabilität wie 18 zur Reproduktion 20. Durch irgend eine negative Schädlichkeit werde nun die Reproduktion angegriffen, und z. B. von 20 zu 16 depotenzirt. Die Reproduktion verliert zwar ihren indifferenten Charakter, d. h. die beiden in der Reproduktion in einer relativen Indifferenz sich befindenden ursprüngliche organische Thätigkeiten werden in Differenz gesetzt, und weil mit der Depotenzirung der Reproduktion eigentlich
die




die Irritabilität in derselben vermindert wird um 4 Grade, so gewinnt die Sensibilität in der Reproduktion gerade um so viel Grade, d. h. von 12 zu 16 potenziert, allein da die Irritabilität an sich 18 Grade Energie besitzt, so behält letztere noch das Uebergewicht über erstere, und die vorhandene Asthenie der Reproduktion muß gegenwärtig noch angesehen werden, als eine ursprünglich irritable Asthenie, bis endlich die Reproduktion noch mehr depotenzirt wird, und dann ein ähnlicher Fall wie §. 137. sich einstellt.

Uebrigens aber muß jedoch hierbey bemerkt werden, daß zur Beurtheilung der individuellen Art asthenischer Krankheiten der Reproduktion das Meiste darauf ankommt, welche von den beyden Funkzionen in der Reproduktion theils aus Ursache der Unmittelbarkeit der Einwirkung, theils aus Ursache der Qualität der negativen Einflüsse auf dieselbe, die erst und am Meisten angegriffene sey. (S. meinen Entwurf Th. II. Vierter Hauptabschnitt.)

§. 137.

Bey dieser Gelegenheit möchte es auch nicht ganz unschicklich seyn, zu bemerken, daß derjenige Moment in der Verlaufszeit einer Krankheit, in welchem beyde Funkzionen sich gleichstehen in ihrer Stärke, derselbe ist, wo die Krankheit keinen bestimmten und individuellen Karakter hat, den ursprünglichen beynahe ganz verloren hat, ohne noch einen bestimmten andern angenommen zu haben, oder mit kurzen Worten derjenige Moment der Krankheit sey, den man im besseren Sinne der Worte den entscheidenden, indifferenden, oder kritischen Zeitpunkt derselben nennen könnte.

§. 138.



§. 138.

Dass dieser bisher erörterte Umstand bey der Erforschung der Individualität einer Krankheit einer der wichtigsten Punkte sey, sowohl für die Diagnose der Krankheit während des Verlaufes derselben, als auch für die Prognose, so wie ins Besondere für die Rekonstruktion jeder, besonders beträchtlichen Krankheit, bedarf hoffentlich nunmehr keines weitem Beweises mehr, wenn ich auch nur auf das einzige aufmerksam machen, und hinweisen sollte, dass eine Krankheit, welche z. B. ursprünglich irritabler Art war, während ihres Verlaufes aber sensibler Beschaffenheit geworden ist, bey der Rekonstruktion den letzten angenommenen Charakter allmählig wieder ablege, und zu ihrem ursprünglichen übergehe, was genau beobachtet werden muss, wenn man sich nicht durch ein Uebersehen dieser Art zu falschen Diagnosen, Prognosen und Verfahrensarten verleiten lassen will, was gewöhnlich geschieht, nämlich wenn man einmal mit einer gewissen Klasse von Mitteln angefangen hat, mit Mitteln derselben Klasse die Kur der Krankheit auch beschliessen zu können, oder zu müssen glaubt.

Es fragt sich demnach also hier noch, auf welche Weise, und durch welche Mittel wir eben diesen Umstand ausfindig machen können.

§. 139.

Die Mittel hierzu anlangend, können wir uns überhaupt zu dieser Absicht folgender Kriterien bedienen:

- a) Der Erforschung der eigenthümlichen Konstitution des Kranken überhaupt. §. 131.

H

b)



- b) Die Dauer der Krankheit, die Schnelligkeit ihres Verlaufes, und die Heftigkeit oder Gewalt der Einwirkung der individuellen Krankheitsursache; d. h. je länger die Krankheit schon gedauert hat, je rascher sie verläuft, je stärker die Gewalt der äussern schädlichen Einflüsse war, desto mehr, und desto früher wird die Krankheit ihre ursprüngliche Art verändern, oder verändert haben.
- c) Der Grad der Entfernung der Lage des unmittelbar oder zunächst affizirten Organs von der dynamischen Thätigkeitsquelle, oder dem Hauptvereinigungspunkte der Nerven, so wie die Grösse seines Konsensus; d. h. je weiter es davon entlegen, je geringer der Grad seines Konsensus ist, desto länger wird dasselbe seinen ursprünglichen Karakter beybehalten, und umgekehrt:
- d) Die Form, in welcher die schädlichen Einflüsse auf denselben Organismus einwirken. Je differenter dieselbe, je grösser der Grad ihrer Subjektivität war, desto eher wird die Krankheit ihre Qualität ändern, aus Gründen, die wir bey b) schon gedacht haben.
- e) Die gleichzeitige Vergleichung und Prüfung der gerade vorhandenen krankhaften Erscheinungen, d. h.
 - α) Ob und in wiefern dieselben das ursprünglich affizirte System mehr verlassen, in einem andern und in welchem sie hervortreten.
 - β) Wenn die ursprünglichen krankhaften Erscheinungen an Heftigkeit und Extension verlieren, während andere in einem andern Systeme



Systeme mit verstärkter Intension und Extension zum Vorscheine kommen.

- γ) Die Umänderung oder totale Umkehrung des äußeren Habitus des ursprünglich affizirten Systems nach oben §. 108. — 110. §. 131. a, b, c. angegebenen Kennzeichen erkennbar.

Die Hauptsache indessen bleibt immer die genaue Kenntniss der Hauptfunktionen, ihrer Aeusserungen, möglichen krankhaften Affektionen und deren pathognomonischen Kennzeichen; worüber ich zur näheren Unterrichtung der hier mir vorgeschriebenen bestimmten Gränze wegen auf meinen Entwurf Th. II. verweisen muß.

§. 140.

VI. Dafs man zur Erkenntniss der Art einer Krankheit auch durch die Kenntniss des vorhandenen *Grades* desselben gelangen könne, wird nunmehr wahrscheinlich Niemand mehr unbegreiflich finden. Indessen wäre auch ausserdem der klinische Arzt verpflichtet, nach Berichtigung der vorerwähnten Punkte, auszukundschaften, auf welchem Grade der Heftigkeit eine Krankheit stehe, d. h. ob sie vom ersten, zweiten, oder dritten Grade der reinen Sthenie, oder reinen Asthenie, der Hypersthenie oder Hyperasthenie sey; indem ohne Kenntniss des Grades einer Krankheit die Prognose eben so unsicher und schwankend ist, als die Behandlungsart wegen der darum nothwendigen Unkunde der erforderlichen Stärke derselben unbestimmt und sehr leicht gefährlich seyn und werden kann.



§. 141.

Um aber auch von dieser Seite der Untersuchung der Krankheiten den erforderlichen Grad von Vollkommenheit zu verschaffen, und unsern Zweck, so sicher und so gut wie möglich zu erreichen, dürfen wir nur folgende Punkte genau zu erforschen suchen, und gehörig nachher erwägen:

1) Die Vergleichung der eigentlichen Gewalt der Krankheitsursache mit dem vorhanden gewesenen Grade der Rezeptivität des organischen Individuums.

Im Allgemeinen gilt daher überhaupt hier die Regel:

Der Grad jeder Krankheit steht in zusammengesetztem Verhältnisse sowohl ihrer Ursache, als des der Einwirkung derselben gleichzeitigen Grades der Affizirbarkeit des kranken Individuums; oder im geraden Verhältnisse der Gewalt der Krankheitsursache, und im umgekehrten der Rezeptivität des affizirten Organismus.

Das heisst mit andern Worten: Je grösser die Summe oder Gewalt der ursachlichen Momente war bey einem bestimmten Grade der Affizirbarkeit, desto grösser wird der Grad der darauf erfolgten Krankheit seyn, und umgekehrt; je geringer aber der Grad der Affizirbarkeit des kranken Individuums war bey einer bestimmten Gewalt äusserer Schädlichkeiten unmittelbar vor der Einwirkung derselben, desto geringer wird der Grad der dadurch ursprünglich erzeugten Krankheit seyn, und umgekehrt.


2)

2) Die Qualität der Krankheitsurfache. Jeder positive Reiz nämlich wird nicht nur in demjenigen Systeme, welchem er durch seine Qualität am meisten entgegengesetzt ist, (S. meinen Entwurf Th. I.) zunächst und vorzüglich Sthenie bewirken, sondern der Grad derselben wird zugleich auch größer seyn, als außerdem. Auf dieselbe Weise wird auf der andern Seite nicht nur Asthenie überhaupt entstehen, wenn entweder die Summe der positiven Lebensreize vermindert, oder negative Reize bestimmter Art auf den Organismus einwirken, und die dadurch erzeugte Asthenie wird gleichfalls auch nicht nur in demjenigen Systeme zunächst und vorzüglich hervorspringen, dessen Individualität bey Entstehung gedachter Lebensreize oder Einwirkung derselben negativen Potenzen am Meisten interessirt ist, sondern aus eben demselben Grunde wird auch der Grad der Asthenie größer seyn, als im entgegengesetzten Falle, u. s. w.

3) Die Form der krankheitsurfachlichen Momente, d. h. je differenter dieselbe, desto größer der Grad derselben Krankheit, je indifferent, desto geringer derselbe. (§. 139. d)

4) Die Dauer der Krankheit. Je länger dieselbe, desto größer der Grad der Krankheit, je kürzer dagegen erstere, desto geringer auch letztere. (§. 139. b) Eben so auch, was zum Theil noch hier mit einschlägt.

5) Die Entwicklung derselben oder die Verlaufszeit. Je näher im Durchschnitte eine Krankheit (den ungewöhnlich schnellen Verlauf einer solchen abgerechnet,) noch ihrer Ausbruchszeit liegt, desto kleiner



ner im Durchschnitte ihr Grad, je weiter dagegen desto gröfser.

6) Die Mittelbar - oder Unmittelbarkeit der Krankheitsurfache. Je unmittelbarer dieselbe auf das kranke Individuum eingewirkt hat, desto gröfser der Grad derselben, und umgekehrt.

7) Der Grad der Entfernung des ursprünglich affizirten und individuellen Organismus von der dynamischen Quelle. (§. 139. c.)

8) Der gleichzeitige Grad der Gewalt und Extension der Irritabilitäts - und Sensibilitätsäufserungen. Das heifst:

a) Je mehr die Irritabilitätsäufserungen an Energie und Extension zugenommen haben, desto höher wird der Grad der Krankheit seyn, die eben darum noch innerhalb der Sphäre der reinen Sthenie liegend gedacht und angenommen werden mufs.

So wie aber die Krankheit selbst noch fortdauert, die Irritabilitätsäufserungen sowohl sich vermindern, als an Extension verlieren, mufs nicht nur dieselbe Krankheit als in Hypersthenie übergegangen angesehen werden, sondern der Grad der Hypersthenie wird um so gröfser seyn und angenommen werden müssen, je mehr sowohl die Anzahl der einzelnen Irritabilitätsäufserungen sich verringert, als letztere selbst an Extension mehr und mehr verlieren.

b) Je lebhafter die Aeufserungen der Sensibilität sind oder werden, und je mehr sie an Extension gewinnen, um so mehr mufs dieselbe Krankheit
heit

heit nicht nur noch als rein asthenischer Beschaffenheit, sondern um so gröfser auch der Grad derselben Asthenie angenommen werden. In demselben Verhältnisse aber, als mit der Extension zugleich auch die Lebhaftigkeit der sensiblen Funkzionen und Ihrer Aeufserungen abnimmt, die Krankheit selbst aber noch fortwährt, müssen wir nicht nur annehmen, dafs die reine Asthenie in Hyperasthenie übergegangen sey, sondern der Grad derselben steht immer in dem geraden Verhältnisse mit der gradweisen Abnahme der Lebhaftigkeit sowohl, als der Extension der Phänomene der Sensibilität.

Was uns aber zur unmittelbaren Kenntnifs des gerade vorhandenen bestimmten und individuellen Grades der reinen Sthenie oder Hypersthenie, der reinen Asthenie oder Hyperasthenie am sichersten noch verhelfen kann, ist

9) Die Kenntnifs der ganzen Lebensgeschichte jeder wesentlichen Erscheinung der kranken organischen Natur; insofern dieselbe der sicherste Grademesser der ganzen Verlaufszeit einer Krankheit ist. Ob ein solcher übrigens möglich sey, habe ich in meinem Entwurfe Th. II. soviel es mir allda erlaubt und möglich war, dargethan, weshalb ich der Kürze wegen dorthin verweisen mufs.

Das allerzuverlässigste Hilfsmittel gerade für die individuelle Gradebestimmung einer Krankheit zunächst asthenischer Natur ist aber unter allen

10) Die genaue Bekanntschaft mit den Kennzeichen und dem Sinne der verschiede-



nen Temperamente, und ihres Gradeverhältnisses. — Indem ich auch hier wieder auf meinen Entwurf Th. II. verweisen muß, bemerke ich nur überhaupt folgendes:

a) Das reizbare Temperament zerfällt in zwey Spielarten, deren Indifferenz es bildet, nämlich in das cholerische und sanguinische. Alle drey zusammen stellen uns das Grundschema der reinen Asthenie nach ihren drey Hauptgraden dar; nämlich das cholerische den ersten und niedrigsten, das reizbare den zweyten und mittlern, das sanguinische den dritten und höchsten Grad der reinen Asthenie.

b) Das träge Temperament zerfällt gleichfalls in zwey Spielarten, nämlich in das melancholische und phlegmatische. Alle drey zusammen geben uns das Urbild zunächst der Hyperasthenie zu erkennen; nämlich das melancholische stellt uns den ersten und untersten, das träge den zweyten und mittlern, und das phlegmatische den dritten und höchsten Grad der Hyperasthenie dar.

Nimmt man nun noch hinzu, daß Krankheit an sich überhaupt weiter nichts anders ist, als Umänderung der Konstitution oder des Temperamentes, so wird es so gleich auch begreiflich, daß wir, um den bestimmten Grad einer vorhandenen Asthenie zu finden, nur wissen dürfen, welche Konstitution dem Kranken eigenthümlich und ursprünglich zukomme, und welche er nunmehr angenommen habe, was man aus den am angezeigten Orte angegebenen Zeichen erkennen kann. Sodann vergleiche man dieselbe mit der hier erwähnten Temperaments - Leiter, und der Grad der Krankheit ist gefunden, und aufs genaueste bestimmt.



§. 142.

VII. Nachdem nun alle vorhergehende Punkte ins Reine gebracht sind, dann suche man sich noch davon zu unterrichten, ob die Heftigkeit der Krankheit durch den ganzen Organismus dieselbe, oder ob in einem oder dem anderen Organe, und zwar in welchem zunächst sie größer sey. Dieses aber erfahren wir, wenn wir wissen:

1) Ob die Wirksamkeit der Krankheitsursache zum Organismus überhaupt mehr indifferent, als bestimmt different sich verhalte.

2) Ob die Krankheitsursache auf ein Organ unmittelbar und vorzüglich eingewirkt habe, und auf welches.

3) Wenn die krankhaften Erscheinungen vorzüglich auf einen bestimmten Theil des Organismus gleichsam sich konzentriert haben.

4) Wenn der Kranke mit einem besonders schwachen Theile behaftet ist, in welchem darum die Krankheit auch immer oder doch meistens vorzüglich wüthen wird, u. d. gl. m., was aus den vorhergehenden anderweitigen Erörterungen nunmehr deutlich und begreiflich genug seyn wird.

§. 143.

Was endlich die Prognostik anlangt, so beruht die Vorhersagung bey einer Krankheit vorzüglich

a) auf die Kenntnisse der Gradeverschiedenheiten der Krankheit selbst.

b) Auf die Kenntniß der ganzen Lebensgeschichte jedes individuellen sowohl, als des gesammten Organismus überhaupt.

c)



- c) Auf die Beachtung der Schnelligkeit des Verlaufes einer Krankheit, entweder aus Ursache der Konstitution des kranken Individuums, oder aus Ursache der durch die zugroße Heftigkeit der Einwirkung der Krankheitsursache bewirkten zu großen Höhe der Krankheit selbst u. s. w.

Da ich mich übrigens auf die Erörterung dieses Punktes nicht besonders einlassen kann, so werde ich im zweyten Theile einiger Massen wenigstens bey der Exposizion der Krankheiten durch die That ersetzen, was ich hier vorübergehen muß.

§. 144.

Dieses wären nun die Hauptregeln, nach welchen wir unsere Untersuchung der Krankheit anstellen müssen, wenn wir zur wahren Erkenntniß der Natur, Beschaffenheit u. s. w. derselben gelangen wollen. Eine solche Untersuchung müssen wir jedesmal vornehmen, bevor wir es wagen dürfen oder können, etwas entscheidendes über den wirklichen Heilungskarakter irgend einer Krankheit zu bestimmen. Nur dann erst aber auch, wenn alles dieses geschehen ist, können und dürfen wir an die eigentliche Behandlung derselben denken. Haben wir alle diese Punkte genau erforscht, dann können wir auch bey gehöriger Beurtheilung, und Konsequenz des wo möglich erwünschten Erfolges unseres Heilverfahrens vergewißert seyn. Nur müssen wir kürzlich noch dardun, wie wir unser Heilverfahren überhaupt entwerfen und einrichten müssen.

Drittes Kapitel.

Heilung der Krankheiten.

§. 145.

Krankheiten heilen, oder den kranken Zustand in den gesunden umändern, will nichts anderes sagen; als dem gestörten Verhältnisse der Differenz des Organismus zu seiner Indifferenz die zum Bestehen der Individualität des kranken Subjektes absolut erforderliche Richtung wieder zu geben, oder andersst ausgedrückt: die vorhandene mit der individuellen Existenz des kranken Individuums durchaus unverträgliche Disproportion der organischen Funkzionen in die normale, d. h. mit der Existenz desselben allein verträgliche Proportion umändern.

Heilung der Krankheiten hiesse demnach jede in dem lebenden Organismus absichtlich veranstaltete und hervorgebrachte Umänderung des gegenseitigen Verhältnisses der organischen Funkzionen, welche vermögend ist, das kranke Individuum auf demselben Standpunkte, den es ursprünglich in der Gliederreihe der organischen Naturprodukte einnimmt, wieder zurückzubringen.

§. 146.

Infofern nun aber die beyden Faktoren der Krankheit, nämlich Sensibilität und Irritabilität, als organische Thätigkeiten, nicht nur überhaupt einzig und allein zweyer wesentlichen Veränderungen, nämlich einer

Ver-



Vermehrung oder Verminderung ihrer Intensitäten fähig, oder mit andern Worten, im Organismus überhaupt nur zwey wesentlich verschiedene Klassen von Krankheiten, nämlich Sthenie und Asthenie, möglich sind, sondern alle noch so viele und mannichfaltige Formen des Uebelseyns auf diese beyde Hauptklassen von Krankheiten sich reduzieren lassen, und eben darum auf diese allein auch nur reduziert werden können und müssen, versteht es sich gewiss von selbst, daß es gleichfalls auch nur zwey Wege gebe und möglich seyen, auf welchen wir zur Heilung aller nur möglichen Krankheiten gelangen können, daß folglich zu dieser Absicht überhaupt nur zwey Hauptarten des Heilverfahrens, nämlich: das negative und positive, oder was dasselbe sagen will, nur zwey allgemeine Heilmethoden, nämlich die depotenzierende oder asthenisirende, und die potenzirende oder sthenisirende allein anwendbar seyen, und eben darum auch alle noch so verschieden modifizierte Behandlungsarten, wenn sie vor der Vernunft bestehen, und ihren beabsichtigten Zweck vollkommen erreichen wollen, auf eine oder die andere eben dieser beyden allein gültigen Hauptmethoden sich zurückbringen lassen müssen.

§. 147.

Eben darum aber auch, weil beyde Hauptmethoden allen Behandlungsarten der besondern und einzelner Krankheiten zu Grunde liegen, und die ganze spezielle Behandlung selbst weiter nichts ist, als die nur nach der Individualität des vorliegenden Krankheitsfalles modifizierte Anwendung, kann man nicht nur dieselben



selben mit Rechte die eigentlichen Fundamentalmethoden der Therapeutik nennen, sondern es muß auch vielmehr als oberster Grundsatz der gesammten Heilungslehre aufgestellt werden, daß die gesammte Therapie nur allein auf diesen beyden Fundamentalmethoden beruhe, und außer denselben keine von ihnen wesentlich verschiedene Heilmethode statuirt werden dürfe.

§. 148.

Uebrigens verstehen wir unter dem negativen Heilverfahren, oder unter der depotenzirenden oder asthenisirenden Methode im Allgemeinen, jede Verminderung sowohl der Summe als überhaupt der Gewalt der positiven Lebensreize, es geschehe entweder durch mittelbare oder unmittelbare Entziehung derselben, oder durch Anwendung solcher Reize, welche sich zur Irritabilität negativ verhalten, d. h. welche die Energie der Irritabilität zu vermindern vermögen, folglich mit einem Worte ausgesprochen, negativer Reize.

Eben aus der so eben angegebenen und bestimmten Wirkungsart negativer Reize auf den Organismus wird es zugleich auch erklärbar, daß das negative Heilverfahren einzig und allein bey denjenigen Krankheiten anwendbar sey, bey welchen die Irritabilität innormal erhöht ist, d. h. also bey sthenischen Krankheiten, aber auch nur bey diesen allein.

§. 149.

Unter dem positiven Heilverfahren, oder unter der potenzirenden oder sthenisirenden Methode begreifen wir dagegen jede Vermehrung
sowohl



sowohl der Summe, als überhaupt der Gewalt der positiven Lebensreize, er geschehe entweder durch unmittelbare Verminderung der negativen im Organismus vorhandenen Reize, oder durch Verhinderung der fernern Entziehung positiver Lebensreize, oder worauf es gewöhnlich hierbey am Meisten angesehen ist, durch directe Anwendung solcher Potenzen, welche sich zur Irritabilität positiv verhalten, d. h. die Energie der Irritabilität zu vermehren vermögen, folglich gleichfalls mit einem Worte ausgedrückt, durch Anwendung positiver Reize.

Eben darum aber auch, weil positive Reize, wann und wo sie auf den Organismus einwirken, immer mehr oder weniger die Irritabilität erhöhen, ist es begreiflich, daß das positive Heilverfahren einzig und allein bey denjenigen Krankheiten vernünftiger Weise angewendet werden könne und dürfe, bey welchen die Irritabilität unter ihren Normalgrad herabgesunken ist, d. h. also bey asthenischen Krankheiten, aber auch nur bey diesen allein.

§. 150.

Die bestimmte Behandlung irgend eines individuellen Krankheitsfalles indessen anlangend, können und dürfen wir dieselbe in keinem Falle eher unternehmen, bevor wir erst genau bestimmt haben, a) welches der bestimmte Zweck der vorseyenden Behandlung sey, oder welche Veränderung durch dieselbe erzielt werden soll, b) bevor wir genau wissen, welches die Bestimmungsgründe der Wahl einer Methode vor der andern seyen, und c) welches die zur Erreichung des Zweckes derselben bestimmten individuellen Heilmittel seyen.

Die

Die Bestimmung des Zweckes irgend eines Heilverfahrens bezeichnen wir darum mit der Benennung Anzeige (Indicatio); die Gründe, auf welchen diese Bestimmung ruht, hieß denn das Anzeigende (Indicans) so wie endlich die bestimmten Mittel zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes, das Anzeigte (Indicatum).

§. 151.

Was nun die Heilanzeigen selbst und zunächst anlangt; so bemerken wir hier vorerst, a) daß die allgemeinste und oberste von allen darin besteht, vorerst die vielleicht noch vorhandene sogenannte äußere Krankheitsursache zu entfernen, b) daß sich dieselbe ganz und allein nach dem eigenthümlichen Charakter der Krankheit selbst richten müsse, und durch die wahre Erkenntnis desselben allein bestimmbar sey. Oder mit andern Worten: der allgemeine Zweck jedes Heilverfahrens besteht zunächst darin, diejenige Disproporzion der organischen Funkzionen, welche die begleitenden Erscheinungen einer Krankheit unmittelbar hervorbringt oder, unterhält, durch eine derselben entsprechende Heilmethode zu beseitigen.

§. 152.

Die Bestimmungsgründe der Anzeige dagegen, d. h. die anzeigenden Kriterien, können und müssen hergenommen werden einzig und allein von der Beschaffenheit der Krankheit, d. h. bestimmter ausgedrückt:

- 1) Von der Klasse, zu welcher die vorhandene Krankheit gehört;
- 2) Von der Gattung, welcher sie angehört;
- 3) Von der Art der Affekzion, welche ihr zu kömmt, und von welchem sie zunächst ihren individuellen Charakter entlehnt;
- 4)



- 4) Von dem Grade der Heftigkeit, auf welchem die Krankheit sich befindet; und endlich
- 5) Von dem Umfange der Krankheit, inwiefern nämlich alle Theile des Organismus entweder überhaupt an dem allgemeinen Grade der Krankheit verhältnißmäßig gleichen, oder aber andere einen größern Antheil nehmen.

§. 153.

Da nun gedachte anzeigende Kriterien selbst wieder von einander verschieden sind; so versteht es sich von selbst, daß sich bey individuellen Krankheitsfällen die Anzeige nach eben diesen besondern Punkten verschiedentlich modifiziren müsse, wenn der individuelle Zweck der Heilung vollkommen erreicht werden soll.

Eben so verhält es sich auch mit dem Angezeigten, oder vielmehr mit der Auswahl der zur Heilung einer bestimmten Krankheit erforderlichen Mittel, insofern dieselbe gleichfalls nach der verschiedenen Beschaffenheit der vorerwähnten anzeigenden Kriterien sich richten muß, d. h. bey der Auswahl der individuellen Heilmittel genau die einzelnen Bestimmungsgründe der Anzeige erwogen und beachtet werden müssen.

§. 154.

Die Sache indessen im Allgemeinen genommen, so giebt es für die Wahl der negativen Methode überhaupt nur ein anzeigendes Kriterium, nämlich die wahre Ueberzeugung, daß der vorhandene Fall wirklich sthenischer Beschaffenheit sey. Sobald es daher entschieden ist, daß der Grund gegenwärtiger krankhafter Veränderungen und Erscheinungen innormale

Er-



Erhöhung der Irritabilität sey verbunden mit gleichmä-
ßiger innormaler Herabstimmung der Sensibilität; so
kann und darf keine andere Anzeige vernünftiger
Weise gefällt, angenommen, und zugegeben werden,
als daß die Irritabilität zu ihren Normalgrad wieder her-
abgestimmt werde. Da nun dieses das negative Heil-
verfahren, oder die depotenzirende Methode allein nur
vermag §. 150; so wäre diese Methode in diesem Falle
das allgemein Angezeigte.

§. 155.

Erwägen wir nun noch hierbey, daß die orga-
nische Thätigkeit, welches ins Besondere die Irritabilität
ist, nur im Konflikte und durch das Uebergewicht der
eigentlichen negativen Thätigkeit der Natur, deren Sub-
strat der sogenannte Sauerstoff ist, depotenzirt wer-
den kann; so begreift es sich sehr leicht, daß und wa-
rum gerade und vorzüglich jene Körper, an deren Kon-
struktion dieselbe negative Thätigkeit den größten An-
theil hat; gemeinhin und Vorzugsweise sauerstoff-
haltige Körper genannt, zur Heilung sthenischer
Krankheiten angezeigt sind, aus Gründen, die ich in
meinem Entwurfe Th. I. weitläufiger angegeben
habe, so wie auch die hierher gehörigen vorzüglich an-
wendbaren Arzneykörper, auf die ich mich hier der
Kürze wegen nur gelegentlich berufen will, indem ich
ihrer ohnehin bey der Auseinandersetzung der einzelnen
Krankheiten besonders noch gedenken werde.

§. 156.

Indessen bemerken wir hier noch überhaupt, daß
außer den gedachten sauerstoffhaltigen Mitteln wegen in
mittelbarer Beziehung für die Heilung sthenischer Krank-



heiten auch noch angezeigt seyen, z. B. das Aderlassen, Schröpfen, Blutigel ansetzen; Laxiren, Brechen, wässerige, vegetabilische und eingeschränkte Diät, Ruhe des Körpers, Entfernung alles Geräusches und Lichtes, Einschränkung aller Beschäftigung des Geistes, des Gemüthes, des Körpers sowohl überhaupt, als in allen seinen besondern Verrichtungen u. s. w. (S. Erstes Kapitel.)

§. 157.

Eben so giebt es im Allgemeinen für die Wahl der positiven Methode gleichfalls auch nur Ein anzeigendes Kriterium, nämlich auch nur die wahre Ueberzeugung, daß die vorhandene Krankheit eine asthenische sey. Sobald es daher bestimmt ausgemacht ist, daß der Grund der vorhandenen krankhaften Erscheinungen eine innormale Herabstimmung der Irritabilität ist, verbunden mit einer gleichmässigen Erhöhung der Sensibilität; so darf durchaus keine andere Anzeige gefällt werden, als die Irritabilität zu ihrem Normalgrade wieder zu potenziren. Da wir nun dieses am besten und allein durch die Anwendung des positiven Heilverfahrens vermögen, so wird auch diese allein das allgemein Angezeigte seyn.

§. 158.

Nehmen wir nun an, was ich gleichfalls in meinem Entwurfe Th. I. ausführlich bewiesen habe, daß überhaupt genommen, der negative Zustand, in welchem der Organismus in der Asthenie sich befindet, nicht nur am zweckmässigsten, sondern vielmehr einzig und allein gehoben werden könne, dadurch, daß derselbe mit den eigentlichen positiven Thätigkeiten der Natur,



Natur, deren Substrate der sogenannte Kohlen-Stick- und Wasserstoff ist, gehörig stark in Konflikt gesetzt, oder in Berührung gebracht werde; so ist es erklärbar, daß und warum, vorerst die Sache im Durchschnitte betrachtet, zunächst und ins Besondere jene Körper, bey deren Individualität die eine oder die andere der drey gedachten positiven Thätigkeiten vor den übrigen das Uebergewicht hat, nach denselben zur Unterscheidung entweder kohlen- oder stickstoff- oder wasserstoffhaltige Arzneykörper genannt, (deren wir in der Folge gleichfalls noch besonders gedenken werden,) bey asthenischen Krankheiten allein angezeigt, und anwendbar seyen.

§. 159.

Uebrigens gehört zu den besonders bestimmten Heilmitteln, wodurch gedachter Zweck, nämlich Beseitigung der vorhandenen Asthenie erreicht werden kann und soll, alles, wodurch die Säftemasse sowohl an Quantität, als an positiver Wirksamkeit gewinnt, nämlich nahrhafte, mit Gewürzen bereitete, gehörig verdauliche, ins Besondere animalische Nahrungsmittel; ferner geistige Getränke, warme Atmosphäre, lauwarne Bäder, angemessene Quantität oder Stärke des Tageslichtes, anpassende und erhebende Eindrücke auf die sämtlichen Sinnesorgane, Erhöhung der Stärke aller Lebensverrichtungen, angenehm belebende Uebungen des Körpers, des Gemüthes, und des Geistes, so wie der zweckmäßige Genuß alles desjenigen, was hierzu beytragen kann, u. s. w. (S. Erstes Kapitel.)



§. 160.


Bey alle dem aber reicht die Kenntniss der allgemeinen Anzeige so wenig, als die Kenntniss der überhaupt angezeigten Heilmittel zur Heilung irgend eines bestimmten Krankheitsfalles zu; sondern wir müssen, was nunmehr wohl keines besondern Beweises bedarf, zugleich auch wissen, wie wir in beyderley Rücksicht, besonders mit der Anwendung der beyden Fundamentalmethoden bey vorkommenden individuellen Fällen, d. h. den §. 154. angegebenen anzeigenden Kriterien gemäß, zu verfahren haben, daß unser Heilgeschäft sicher, mit erwünschtem Erfolge und gründlich durchgeführt werde.

§. 161.

Indem wir aber die bestimmten individuellen Regeln unseres therapeutisch klinischen Verfahrens hier aufstellen, setzen wir bey unsern Lesern als schon bekannt voraus, daß es weder möglich, noch vielweniger unsere Absicht sey, mit der Bestimmung und Erörterung der nachstehenden therapeutischen Regeln so tief in das Detail einzugehen, daß man auch für den individuellsten Fall die gleichfalls demselben ganz genau und individuell anpassende Regel finde. Es ist vielmehr alles gethan, wenn man nach den vorerwähnten verschiedenen Hauptrücksichten die denselben angehörigen allgemeinen Regeln aufstellt; das weitere Individualisiren derselben bleibt ein für allemal dem technischen Arzte zunächst und ganz allein anheimgestellt und überlassen.

Die besondern Regeln unserer therapeutischen Verfahrensart bey bestimmten Krankheiten sind indessen folgende:

§. 162.



§. 162.


I. In Betreff der *Klasse* der Krankheit.

1. Da bey jeder Krankheit, somit auch bey Sthenie und Asthenie, jeder Theil des gesammten Organismus verhältnißmässig mehr oder weniger an derselben Antheil nimmt; so folgt, das auch bey jeder dieser beyden Krankheiten die Totalsumme der Lebensreize durch alle Theile des Körpers eben so verhältnißmässig entweder vermehrt oder vermindert werden müsse.

2. Aus demselben Grunde muß bey der Anwendung der einen oder der andern Fundamentalmethode auf alle erregende Potenzen nach dem Sinne der anzuwendenden besondern Methode Rücksicht genommen, d. h. dieselben sämmtlich verstärkt oder vermindert werden, so das zwischen der gemeinfamen Wirksamkeit aller angewendeter Heilmittel Uebereinstimmung herrsche; und dadurch die Gewalt des Inzitamentes durch den ganzen Organismus gleichmässig vermindert oder vermehrt werde; folglich nicht erst zur Ader gelassen, und gleich darauf Naphtha und Opium u. s. w. gegeben.

3. Zuweilen bringt ein Heilmittel eine gewisse Zeitlang angewendet entweder nicht mehr die erwünschte Wirkung selbst, oder auch nicht in dem erforderlichen Grade, oder auch gar keine mehr hervor, sehr oft einzig und allein aus der Ursache, weil, um mich nur eines ganz allgemeinen Ausdruckes zu bedienen, der kranke Körper an dasselbe sich gewöhnt hat. Ist aber dieses wirklich der Fall, wovon man sich jedoch vorerst genau unterrichten muß, dann wechsle man mit einem andern Mittel derselben Klasse ab. u. s. w.

4. Das-



4. Dasselbe kann sich auch ereignen, wenn man vielleicht eine lange Zeit einem Organ des Körpers das Heilungsgeschäft entweder allein oder doch vorzüglich übertragen hat. Liegt der Grund davon nicht in der schnellen oder allzugroßen Verminderung der Rezeptivität des gesäminnten Organismus, sondern blos in der durch die zu lange Dauer der unmittelbaren Anwendung der Heilmethode bewirkten Verminderung der Affizirbarkeit desselben Organs, während dem die übrigen Organe noch Rezeptivität genug besitzen; dann vertheile man die anzuwendende Methode an die übrigen Organe nach Befinden der Umstände.

§. 163. *Methoden der Heilung.*

II. In Betreff der *Gattung* der Krankheit.

Die Hauptregel in dieser Hinsicht ist diese: Die Grösse der Vermehrung oder Verminderung der Totalsumme erregender Potenzen, d. h. die Stärke der potenzirenden oder depotenzirenden Methode, muß so bestimmt werden, daß sie vorerst überhaupt anpassend sey derjenigen Gattung von Krankheiten, welcher die gegenwärtige eigentlich angehört. Nämlich,

1. Ist die Krankheit *sthenischer* Beschaffenheit, so muß bey übrigen gleichen Umständen die Depotenzirung desto stärker seyn, je größer der Grad der Sthenie ist, folglich, da die Hypersthenie die über der reinen Sthenie liegenden höhern Grade in sich begreift, muß die negative Methode nothwendig stärker noch angewendet werden, als bey der reinen Sthenie. Je geringer dagegen der Grad der Sthenie ist, desto schwächer darf und muß auch die Stärke der anzuwenden-

den-

denden asthenisirenden Methode seyn, folglich auch bey der reinen Sthenie schwächer, als bey der Hypersthenie.

2. Ist aber die Krankheit asthenischer Natur, dann unterscheide man folgende Fälle.

a) Wenn die Krankheit rein asthenisch ist, dann wende man die indizirten positiven Reize in desto geringerer Stärke an, je größer der Grad der reinen Asthenie ist, desto stärker dagegen, je kleiner der Grad derselben ist.

b) Sobald aber die Krankheit hyperasthenischer Beschaffenheit ist, dann verstärke man die indizirte Methode überhaupt nicht nur mehr, als bey der reinen Asthenie erlaubt ist, sondern man steige mit der Stärke derselben, so wie die Hyperasthenie größer wird.

Das Weitere hiervon späterhin bey der eigentlichen Gradebestimmung des Heilverfahrens selbst.

§. 164.

III. In Betreff der *Art* der Krankheit.

1. Ist die Krankheit eine sthenische, dann respektire man folgendes:

a) Richte man sein Heilverfahren zunächst auf jenes Organ hin, welchem die Krankheit selbst ursprünglich angehört, und sey bey übrigens gleichem Grade der Sthenie durch den gesammten Organismus um die übrigen affizirten Organe, und deren krankhaften Aeufserungen wenig oder gar nicht bekümmert.

b) Erwäge man genau die Individualität des ursprünglich affizirten Systems, d. h. indem aus Ursache derselben die Stärke der Methode entweder



weder zu groß oder zu gering seyn, in beyden Fällen also ein solches Versehen oft unheilbaren Schaden bringen kann. Im Allgemeinen gilt daher die Regel: Ein sensible Subjekt oder Organ verträgt nicht nur weniger, sondern erfordert auch zur Heilung seiner asthenischen Affektionen weniger eine beträchtliche Depo-tenzierung als ein irritables, so wie dagegen letztere hinwiederum weniger, im Vergleiche mit einem reproduktiven Subjekte oder Organe.

2. Ist die Krankheit eine asthenische, dann nehme man auf folgende Regeln Rücksicht, deren ausführliche Darstellung und Beweisführung in meinem Entwurfe Th. I. nachzulesen ist. Nämlich

- a) Wenn die Asthenie sensibler Art ist, dann wende man kohlenstoffhaltige Mittel an.
- b) Wenn sie aber irritabler Art ist, stickstoffhaltige.
- c) Ist sie endlich reproduktiver Art, dann greife man nach den indifferenten positiven Reizen, und zwar hinwiederum selbst von dieser Klasse diejenigen, welche der vorzüglich angegriffenen Funkzion in der Reproduktion, d. h. entweder der Sensibilität oder Irritabilität nach a. und b. entspricht, wovon gleich ein Mehreres.
- d) Bemerke man im Durchschnitte, daß reproduktive Subjekte und Organe nicht nur überhaupt mehr, sondern gleichfalls auch eine größere Stärke der Methode, als irritable Individuen, den-

dennoch aber diese wenigstens mehr, als sensible Körper theils vertragen, theils erfordern.

e) Sobald eine Krankheit ihren individuellen Charakter mit dem einer andern Funkzion vertauscht, dann wähle man solche Heilmittel, welche der Qualität der nunmehr vorherrschenden Funkzion entspricht, wie a. und b. zeigt.

f) Nehme man bey der Auswahl der Heilmittel zugleich auch mit auf die Qualität der Krankheitsursache selbst mit Rücksicht; worüber ich, weil dieser Gegenstand einer ausführlichen und hier mir nicht erlaubten Exposition bedarf, wieder auf meinen Entwurf Th. I. verweisen muß.

§. 165.

IV. In Betreff des *Grades* einer Krankheit.

1. Wende man die Heilmittel überhaupt in derjenigen Stärke an, welche überhaupt der Konstitution des Kranken angemessen ist; d. h. man muß nämlich die Grösse der Gewalt, welche die gewöhnlichen Lebensgenüsse eines organischen Individuums besitzen, ausfindig machen, und nach derselben, als der normalen Dosis die Stärke der indizirten sowohl sthenisirenden als asthenisirenden Methode ausmitteln. So z. B. sind 8 Gran Nitrum für ein zärtliches Individuum oft eben soviel, als eine Unze Sal mirabile Glauberi für eine robuste Konstitution.

2. Noch sicherer wird man zur Erkenntniß der Normalgabe irgend eines Heilmittels gelangen, wenn man die individuelle Konstitution seines Kranken genau vergleicht mit dem im vorigen Kapitel angegebenen Grademesser der Konstitutionen oder Temperamente.



3. Ist die Krankheit sthenischer Natur, dann gebe man

a) Bey der reinen Sthenie, je geringer der Grad, desto kleinere Dosen, und den Sauerstoff in einer gleichfalls mehr indifferenten Form; dagegen je größer der Grad derselben ist, desto größer muß nicht nur die Dosis, sondern desto differenter auch die Form seyn, in welcher man den Sauerstoff anwendet.

b) Bey der Hypersthenie muß nicht nur die Dosis noch stärker, und die Form der Anwendung des Sauerstoffes noch differenter seyn, als selbst bey dem höchsten Grade der reinen Sthenie; sondern beyde Momente müssen im gleichen Grade vermehrt werden, in welchem die Hypersthenie zunimmt. Am besten daher Sauerstoffgas.

4. Ist die Krankheit asthenischer Natur, dann bemerke man folgende Regeln.

a) Bey der reinen Asthenie fange man immer mit derjenigen Dosis an, welche dem Konstitutionsgrade, den die Krankheit gegenwärtig präsentirt, angemessen ist, und steige in gleichen Zwischenräumen zu größeren Dosen.

b) Je größer der Grad der reinen Asthenie, desto kleiner muß nicht nur die Dosis, sondern desto differenter die Form des anzuwendenden Heilmittels, so wie auch desto kleiner der Zwischenraum seyn, zwischen welchem das Heilmittel angewendet wird; umgekehrt dagegen in allen drey Rücksichten, je kleiner der Grad der Asthenie seyn wird.

c)



- c) Bey der Hyperasthenie fange man mit der indizirt größten Dosis an, wiederhole sie aber nicht in den Zwischenräumen wie beym dritten Grade der Asthenie, und steige zu kleinern Dosen herunter.
- d) Je größer der Grad der Hyperasthenie, desto stärkere Gabe des Heilmittels, desto differenter die Form desselben, desto größer der Zwischenraum bis zur wiederholten Anwendung desselben.
- e) Als Regel kann man im Durchschnitte bey der Behandlung der Hyperasthenie annehmen. Nämlich die Dosis, in welcher man das indizierte Mittel auf dem ersten Grade der Hyperasthenie giebt, sey gleich der bey dem ersten Grade der reinen Asthenie, die Form wenigstens gleich der bey dem dritten Grade der reinen Asthenie, der Zwischenraum der Wiedieranwendung desselben etwa wie beym zweyten Grad der reinen Asthenie.
- f) Bey der Hyperasthenie, welche entweder ein sensibiles Subjekt befallen hat, oder vielleicht ursprünglich selbst sensibler Art ist, erfordert der Kranke bey Weitem stärkere Dosen, und eine differentere Form, als wenn dieselbe irritabler Art ist, obgleich auch im letzten Falle derselbe Kranke mehr verträgt und erfordert, als wenn das kranke Individuum ursprünglich reproduktiver Konstitution ist.

5. Bey der Rekonstruktion jeder asthenischen Krankheit bemerke man genau



a) den vorhandenen Grad derselben Krankheit, ob sie etwa hyperasthenischer Natur ist; dann gebe man ja genau auf den Zeitpunkt Acht, in welchem die Hyperasthenie wieder in reine Asthenie übergeht, indem unsere Behandlungsart dieser gemäß eingerichtet werden muß.

b) Der Umtausch der Kausalität der Funktionen, wenn z. B. eine ursprünglich irritable Asthenie nunmehr den sensiblen Charakter angenommen hat. Ist dieses der Fall, denn wird man, sobald die Krankheit ihren ursprünglichen Charakter wieder angenommen hat, statt der bisher angewendeten kohlenstoffhaltigen Heilmittel, nunmehr zu stikstoffhaltigen übergehen, und letztere in der dem Grade der Asthenie angemessenen Dosis und Form geben müssen.

6) Bringe man Jeden wieder nach seiner Art auf seinen Standpunkt zurück. Nicht immer aber sind die bekannten und indifferentesten Mittel zugleich auch diejenigen, mit welchen man jeden Rekonvalescenten behandeln zu müssen glauben darf. Ich erinnere nur, daß manche Individuen mit keinem indifferentern Arzneykörper behandelt werden dürfen, als höchstens mit der *Serpentaria*, während andere nicht eher ganz genesen können, bis man ihnen Stahl verschlucken läßt u. f. w. Diesen Umstand übersehe man ja nicht in der Praxis.

§. 166.

Die positiven Reize selbst aber anlangend, so bemerken wir vorerst, daß der Wasserstoff, als die eigentliche differenzirende der positiven Thätigkeit der
Natur



Natur bey keiner Krankheit, aus Ursache ihrer Qualität, eine direkte Indikazion habe auſſer bey dem dritten Grade der Hyperaſthenie überhaupt, wo der Organismus von ſeiner abſoluten Indifferenz am nächſten nur dadurch allein, daß er mit dieſer Thätigkeit in gehörigen Konflikt geſetzt werde, wieder bis zu demjenigen Grad von Differenz zurückgebracht werden kann, auf welchem es den beyden urſprünglichen Thätigkeiten der organiſchen Natur wieder möglich iſt, ſich beyderſeitig ſelbſt wieder gehörig in beſtimmte Differenz, zu ſetzen, und wieder einen beſtimmten differenten und individuellen Karakter des Lebens anzunehmen.

Auſſerdem beſteht die Funkzion des Waſſerſtoffs zunächſt darin, den übrigen Kräften, welche von Außen an den Organismus gebracht werden, gleichfalls einen höhern Grad von Differenz oder Subjektivität mitzutheilen, oder die vielleicht zu objektive Form irgend einer Potenz in eine mehr ſubjektive umzuändern, das Mittel ſelbſt folglich mehr zu differenziren.

§. 167.

Die beyden übrigen Thätigkeiten, deren Substrate der Kohlenſtoff und Stikſtoff ſind, und jede derſelben eine beſtimmte Polarität zum Organismus beſitzt, oder mit andern Worten, die kohlen- und ſtikſtoffhaltigen Potenzen haben nicht nur ihre beyderſeitige beſtimmte Indikazion, ſondern da die der einen oder der andern dieſer beyden Klaffen angehörigen Potenzen nicht nur mancherley Gradeverſchiedenheiten unter ſich zu laſſen, ſondern in Rückſicht in ihrer Anwendung eben dadurch ſelbſt wieder eben ſo viele beſondere Indikazionen haben, ſo iſt es abſolut nothwendig, das beſtimmte Grade-



de- und Potenzverhältniß der besondern Arzneykörper zunächst, nach denselben beyden Klassen, überhaupt wenigstens zu kennen und anzugeben.

Sie folgen sich nämlich von dem höchsten Grade der Differenz oder Subjektivität an gerechnet bis herunter zu dem höchsten Grade ihrer Indifferenz oder Objektivität, beyde in absteigender Ordnung z. B. auf folgende Art.

A. Kohlenstoffhaltige
Arzneykörper.

Aetherische Oele, gehörig
solvirt.

Camphor Liquor anod. m.

H. Spirit. nitri dulcis, et

Salis dulcis.

Tinctura thebaica, Ekardti,

Laudanum Liquid. Syd.

Belladonna, Datura Stramo-

nium, Aconitum, Digitalis

purpurea, Cicuta, Lauro

cerasus, Nicotiana etc.

Opium purum.

Essentiae amarae, v. g. cort.

aurantiorum etc.

Arnica, Flores et Radix.

Rad. Valerianae minoris.

Rad. Serpentar. virg.

Herbae amarae v. g. Mille-

folii.

Centaurei minoris, Cardui

benedicti, trifolii fibrini etc.

B. Stikstoffhaltige
Arzneykörper.

Moschus, Phosphor.

Liquor. C.C. succinatus, Sal

volatile C.C. Spirit. sal. am-

moniaci, Spt. formicarum.

Olea empyreumatica. v. g.

Oleum Cajeput, Asphalti,

animale Dippelii, succini etc

Tinctura cantharidum, pul-

vis cantharidum.

Essent. castorei, castoreum.

Alle scharfen Pflanzen, Rad.

Squillae, Fl. chamomillae

Roman. Piper, Hb. Cochle-

ariae, chelidonii majoris etc.

Assa foedita, Gummi galba-

num, ammoniacum.

Arsenicum, Antimonium,

Kerm. minerale.

Sacharum et Extractum fa-

turni, Calx Bismuth, Flores-

zinci, Calomel. etc.

Rad.

Rad. Gentianae rubrae, polygal. amar, fenegae.

Die Hölzer, v. g. lignum.

Quassiae etc.

Die Rinden, v. g. Cort. aurant. Quercus, hypocastani, ulmi, peruvianus, terra Catechu.

Alle balsamisch harzige Arzneykörper, v. g. therebinthina Veneta, balsamus copaivae, peruvianus, Gummi Myrrhae etc.

Eisen und eisenhaltige Körper.

§. 168.

IV. In Betreff des *Umfanges* der Krankheit.

1. Ist die Krankheit dem Grade nach durch den ganzen Körper sich gleich, dann agire man blos auf das ursprünglich affizirte System, wenn die Krankheit sthenischer Natur ist.

2. Ist dieselbe aber in irgend einem Theile besonders noch verstärkt: dann beobachte man folgende Regeln.

a) Bey der Sthenie überhaupt verstärke man die depotenzirende Methode gerade auf den besonders noch affizirten Theil in ebendemselben Grade, als gröfser ist die lokale Asthenie desselben.

b) Bey der Asthenie aber bemerke man folgendes.

α) Ist die Krankheit rein asthenisch, dann kann man, wiewohl man auch hier noch vorsichtig



sichtig seyn muß, die allgemeine Methode lokal noch verstärken, wenn die Asthenie noch im ersten Grade ist; sobald sie dagegen vom zweyten, noch mehr aber, wenn sie vom dritten Grade ist, dann schon man das besonders angegriffene Organ soviel wie möglich, und entferne nicht nur alle lokale Behandlung, sondern selbst die nothwendig anzuwendenden Mittel wende man so ferne wie möglich von dem noch besonders angegriffenen Organe an.

β) Ist sie aber asthenisch, dann verbinde man nicht nur überhaupt mit der allgemeinen die lokale Anwendung der indizirten Heilmittel, sondern letztere muß um eben soviel stärker seyn, als der Grad der lokal verstärkten Affektion gewesen ist.

3. Ist dagegen die Krankheit unbedeutend, nur an einem oder dem andern Theile bloß, und auch da nur wenig bemerkbar, dann verfähre man bloß lokal.

Die weitem Auseinandersetzungen aller dieser Punkte u. s. w. findet man in meinem Entwurfe Th. I.

Soviel von der Theorie der allgemeinen Heilkunde.

Zwey-

Zweyter Theil.

Theorie der besondern
Heilkunde,

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM 1630 TO 1800
BY
JOHN H. COLEMAN

Vorerrinnerung.

Bey der Angabe der Erkenntniß und Heilarten nachstehender Krankheits - Formen, bitte ich überhaupt folgendes zu bemerken:


Erstens. Werde ich dieselben unter zwey Abschnitte vortragen, wovon

a) der erste die sthenischen,

b) der zweyte die asthenischen Krankheiten enthalten soll.

Mit dieser Rubrizirung soll indessen keineswegs so viel gesagt seyn, als wären oder könnten nachstehende Krankheits - Formen einzig und allein entweder bloß durch Sthenie, oder bloß durch Asthenie erzeugt werden. Wir wollen vielmehr, und zwar insbesondere durch diese Abtheilung nachstehender Krankheiten im Durchschnitte nur soviel andeuten, daß die im ersten Abschnitte vorkommenden Krankheits - Formen meistens sthenischen, die des zweyten Abschnittes aber, gewöhnlich asthenischen Ursprunges sind.

Uebrigens werden wir aber dennoch auch bey nachstehenden Krankheiten soviel möglich immer den Moment, in welchem die Krankheit ihre Form und



Wesenheit zuweilen verändert, nicht nur bestimmt auffassen und bezeichnen, sondern überhaupt wenigstens die zugleich indizierte Methode nach allen ihren besondern Beziehungen dabey mit angeben.

Eben so werden wir soviel, wie thunlich bey der Bestimmung der Rekonstrukzionsarten derselben Krankheiten zugleich auch im Allgemeinen die wichtigsten Punkte der jedesmaligen bestimmten Behandlungsart der Rekonvaleszens zu berühren uns angelegen seyn lassen.

Zweytens. Die Krankheiten, welche wir in dem zweyten Abschnitte aufstellen werden, sollen noch besonders abgetheilt werden, in

a) rein allgemeine, und in

b) mehr örtliche Krankheiten.

Indessen während dem wir mit größtem Nachdrucke die Wirklichkeit örtlicher Krankheiten durchaus läugnen, wählen wir beyde Ueberschriften einestheils bloß der Kürze wegen; anderntheils machen wir gedachte Abtheilung darum vorzüglich, damit wir Gelegenheit haben, die bestimmten und verschiedenen Modifikationen der Behandlungsart solcher asthenischer Krankheiten, zu welchen sich noch eine besondere Lokalaffektion gesellt, indem, wie §. 168. gezeigt worden ist, letzterer Umstand das individuelle Heilverfahren mannichfaltig abändert.


Drittens. Die Beschreibung der besondern Krankheits-Formen haben wir von der gewöhnlichern Art
ihrer

ihrer Darstellung hergenommen, und sehen dieselben als den Urtypus der Verlaufsgeschichte derselben an, ohne damit die Möglichkeit mancherley formellen Verschiedenheiten bey obgleich demselben Karakter einer und derselben Krankheit nicht zu zugeben, noch vielweniger, daß wir damit soviel andeuten oder angenommen haben wollten, als wenn dieselbe Krankheit, damit sie gerade für diese und keine andere anerkannt werden dürfte, in ihrer Formalität nicht einige, wenn nur nicht wesentliche, Veränderungen erleiden könnte.

Ferner benutzen wir die bestimmte Verlaufsgeschichte nachfolgender Krankheiten bloß nur als Mittel, um an derselben zu zeigen, wie die Theorie der allgemeinen Heilkunde in besondern Fällen angewendet werden müsse; ob wir gleich die ganz individuelle Modifizierung des anzuwendenden Heilverfahrens der eignen Beurtheilungskraft des Klinischen Arztes selbst überlassen müssen.

Viertens. Auf eben dieselbe Weise sehen wir auch die hier beygefügtten Arzneiformeln an. Ihr Zweck ist zunächst bloß dieser:

- a) um das individuel indizierte Mittel selbst bestimmt zu bezeichnen und auszusprechen,
- b) und gelegentlich die Form seiner Anwendung zugleich mit zu bezeichnen,
- c) um nebenbey zunächst angehende Aerzte mit gewissen Formeln, die sich häufig am Krankenbette



bette bey gewissen Krankheiten, vorzüglich wirksam und heilsam sich bewiesen haben, bekannt zu machen, oder denselben im Nothfalle mit einer bestimmten Arzneyformel zu Hülfe zu stehen.

Uebrigens aber lassen dieselben nicht nur überhaupt mancherley Abänderungen zu, sondern erwarten dieselben vielmehr, so wie es die Individualität des vorliegenden Krankheits-Falles selbst erfordert.

Fünftens. Auf dieselbe Weise verhält es sich auch mit der angegebenen Dosis der indizirten Heilmittel. Ich bemerke hier nur im Allgemeinen, daß dieselben überhaupt nach dem 20ten Jahre des Alters bestimmt sind.

Sechstens. Die Namen der Krankheiten anlangend, haben wir die bisher gewöhnlichen beybehalten, um den Weg zum Nachlesen und Vergleichen in den Schriften der ältern Heilkunde unsern Lesern offen zu erhalten.

Siebentens. Die Ordnung, welche wir im Verlaufe unserer Untersuchungen der besondern Krankheiten verfolgen, ist folgende. Wir geben vorzüglich an:

- a) die Definizion der Krankheit,
- b) eine Darstellung und Beschreibung der gewöhnlichsten und meistens gegenwärtigen, bald mehr bald weniger wahrnehmbaren Veränderungen der einzelnen Lebensverrichtungen, oder krankhaften Erscheinungen nebst ihre Prognose.

c)



- c) Die gewöhnlichsten Schädlichkeiten, welche die gedachte Krankheit herbeyzuführen pflegen.
- d) Die Bestimmung des Karakters des den vorhandenen Erscheinungen zu Grunde liegenden Zustandes des Organismus, oder vielmehr die Konstruktion der Krankheit, wobey ich jedoch immer auf die darauf sich beziehende Stelle meines Entwurfes mich beziehen werde, um mir die außerdem nöthige Beweisführung zu ersparen, und mehr Raum für anderweitige Expositionen zu gewinnen.
- e) Angabe der bestimmten Heilanzeigen, so wie
- f) der individuellen Heilart, in wiefern dieselbe bewirkt werden kann durch

α) Diät,

β) solche Mittel, welche sich beynahe in jedem Hauswesen vorfinden, und darum Hausmittel heißen können.

γ) Arzneimitteln.

Bey α) und β) werde ich mich indessen auf die Angabe solcher Dinge beschränken, welche keine entschieden bestimmte und vorzügliche Polarität zu einem oder dem andern Systeme des Organismus besitzen, sondern vielmehr zu dem gesammten Organismus gleichsam indifferent sich verhalten; bey den Arzneimitteln dagegen



gegen werde ich nicht nur derjenigen gedenken, welche der Individualität des Heilungskarakters derselben Krankheit genau entsprechen, sondern die Modifikationen und Individualisirungen der eigentlichen medizinischen Verfahrungsart nach den besondern Momenten der Verlaufszeit derselben Krankheit jedesmal bestimmt angeben.



Erster Abschnitt.

Sthenische Krankheiten.

I.

Einfaches Entzündungsfieber, *Synocha simplex.*

Unter Entzündung verstehen wir gewöhnlich jenen Zustand der Erregung der Blutgefäße, welcher sich beständig jedesmal durch Röthe, Geschwulst, Hitze und Schmerzen in einem oder dem andern Theile unseres Körpers äußert. In soferne aber diese Zufälle sehr oft, sowohl bey sthenischer als asthenischer Beschaffenheit der Blutgefäße existiren, in soferne müssen wir auch einen Unterschied zwischen sthenischer und asthenischer Entzündung in der Wirklichkeit annehmen. S. m. Entwurf. Th. II. §. 990. etc.

Eben so nennt man auch alle jene Krankheiten, sowohl sthenischer als asthenischer Natur, welche mit Frost, Hitze, größerer Häufigkeit des Pulses, und Mattigkeit in allen Gliedern sich ankündigen, meist durchgehends Fieber. (Ebendas. Th. II. 926 — 944. etc.)

Allein da sthenische und asthenische Beschaffenheit der Krankheit einander gerade entgegengesetzt sind, und jeder dieser beyden Zustände eine besondere, der andern geradezu entgegengesetzte Methode erfordert; so ist es nicht allein billig, sondern auch nothwendig, daß wir
jeden



jeden dieser beyden Krankheitszustände durch eine besonders auszeichnende Benennung von einander unterscheiden. Daher wollen wir auch künftighin jene asthenische Krankheit, welche mit den gedachten Erscheinungen begleitet ist, ausschliessend Fieber; die sthenische hingegen Pyrexie nennen.

Eine sthenische Krankheit mit Pyrexie und Entzündung eines Theiles, oder doch mit grosser Neigung dazu, heisst Phlegmasie.

Dieses vorausgesetzt entstehet nun die Frage, was eigentlich ein einfaches Entzündungsfieber sey?

D e f i n i z i o n.

Ein einfaches Entzündungsfieber ist eine Pyrexie, wobey gewisse Theile unseres Körpers in einem nahen, oder höchstens nur sehr leichten entzündungsartigen Zustande sich befinden.


Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche sind: Müdigkeit und Schwere im Kopfe. Jedoch sind sehr oft diese Erscheinungen so unbedeutend, und die Zeit ihrer Dauer so gering, dass das Entzündungsfieber oft ganz plötzlich und ohne lang vorhergegangener Unpässlichkeit eingetreten zu seyn scheint.
- 2) Während dem Ausbruche erscheinen folgende Zufälle: Schauer, Frost. Kälte, Hitze über den ganzen Körper, die sich aber beym Berühren desselben unserer gewöhnlichen Wärme sehr leicht assimiliret, ohne eine stechende Empfindung



pfundung in unsern Fingern zurückzulassen. Eingeschwinder, starker, und zuweilen auch voller Puls. Vermehrte Stärke in allen übrigen Lebensverrichtungen. Daher Kopfweg, Schmerzen im Rückgrade, Schlunde und in andern Gliedern, grössere Lebhaftigkeit, glänzende Augen, vorzüglich rothes, brennendes und etwas aufgedunsenes Gesicht, trockne mit silberfarber Haut bedeckte Zunge, grosser Durst, so dass die Zunge am Gaumen klebet, mit Verlangen nach Wasser und säuerlichen Getränken, heisser Athem, pergamentartige trockne Haut, dunkelbrauner und heisser Urin, trockner und feltner Stuhl.

- 3) Bey der Zunahme bis zur grössten Höhe. Metallisch tönende Stimme, völliger Mangel an Durst bey der grössten Hitze und bey ganz trockenem Munde; Bluthusten, beständiges Wachen, Irreseyn, blasser Urin, aussen Kälte, innen Brennen, Geschwulst der Halsdrüsen, welche sich aber bald wieder verliert, kurzer und schneller Athem.
4. Bey der Abnahme. Feuchte, schwitzende Haut, flüssige, gelbe, übelriechende Stühle; Blutflüsse mancherley Art, besonders Nasenbluten; weniger dunkeler und blasserer Urin, mit einem Wölkchen; feuchte Zunge, weniger brennender Durst, freyer Athem.
- 5) Beym Wechsel. Kleiner, geschwinder und ungleicher Puls; blasses, zusammengefallenes Gesicht; ganz kalte Hände und Füße; noch mehr beklemmter und noch kürzerer Athem; wäsf.



wässerige Diarrhœe mit Bauchgrimmen; kalter, klebriger, kolliquativer Schweiß; unwillkührlicher Abgang des Stuhles und Urins; Schluchzen, Sehnenhüpfen, weißer Friesel, Schlaffucht, Verlust alles willkührlichen Gebrauches seiner Kräfte.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte Brustentzündung, Lungenschwindfucht, Darmentzündung, entzündungsartiger Hodengeschwulst, Bräune, Nervenfieber, Abscesse mancherley Art.
- b) Tödliche. Brand der Lungen und Eingeweide des Unterleibes, zu heftiger Blutandrang nach dem Kopfe, Schlaffucht, Schlagfluß, Stickfluß.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Die wichtigsten und gewöhnlichsten sind: zu starke Anstrengung des Körpers, heftige Gemüthsbewegungen, z. B. Zorn, große Exzesse in sehr nahrhaften Speisen und geistigen Getränken, ungewöhnlich starke Sonnenhitze, heiße Bäder, schneller Uebergang von Kälte in die Wärme; daher auch scharfe Nordluft, strenge Kälte, mittelbar wenigstens gewöhnliche Entzündungsfieber hervorzubringen pflegen.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Eigentliche Krankheit, von welcher alle diese krankhaften Erscheinungen ausgehen, besteht in einer zu beträchtlichen Erhöhung der Irritabilität des gesammten Organismus, vorzüglich aber des Blutgefäßsystems. (S. Entwurf Th. II. §. 929. 946.)

Heil.



H e i l a n z e i g e.

Man suche die innormale Erhöhung der Irritabilität, besonders von Seiten des Blutgefäßsystems, herabzustimmen, und zwar bis zu den individuellen Normalgrad des kranken Subjektes zu reduzieren.

H e i l v e r f a h r e n.

Depotenzirende Methode. Hierher rechne ich:

I. Diät. In dieser Rücksicht wird erfordert:

- a) Ruhe des Körpers und Gemüthes.
- b) Dunkelheit des Krankenzimmers.
- c) Horizontale Lage des Körpers, doch so, daß Brust und Kopf etwas höher liegen. Auch ist es sehr rathsam, daß der Kranke zuweilen aufrecht sitzt, und mitunter sich ausser dem Bette aufhält.
- d) Entfernung warmer Federbetten. Besser ist eine Matratze und eine abgenähete Decke.
- e) Man entferne alle Gelegenheiten zu Erkältungen.
- f) Reine und kühle Luft, aber ja nicht ganz kalte Luft. Man erhält diese, wenn man bey völlig geschlossener Thüre, niedergelassenen Gardinen und heiterem Wetter den Tag über einen Fensterflügel öffnet, das Zimmer mit Eßig besprengt, und irgendwo in denselben ein Gefäß mit einer grossen Oberfläche mit kaltem, reinem und öfters erneuertem Wasser gefüllt, anbringt.
- g) Enthaltbarkeit von Speisen, vorzüglich von nahrhaften Speisen und von geistigen Getränken aller Art. Angemessener ist vieles dünnes, kühlendes und säuerliches Getränke, und Pflanzenkost;



kost; am besten aber in flüssiger Gestalt. Außerdem können folgende

II. Hausmittel mit vorzüglichem Nutzen angewendet werden: Nämlich Kofent, Selter - Fachinger und Schwallheimer Wasser, Buttermilch und Weinsteinmolken; Gerstentränk mit Honig und Eßig; Eßig mit Wasser bey heftigem Kopfweh und Blutandränge nach dem Kopf, zu Umschlägen, und mit Honig vermischt, als Getränke; Citronensaft unter das Getränke, oder Limonade, oder Citronenscheibchen mit Zucker bestreuet, abwechselnd zu genießen; frisches, gekochtes und einge-
machtes Obst.

Oft reichen diese Mittel allein schon zu, die Synocha in einem oder einigen Tagen ganz zu heben. Sollten aber diese ja nicht hinlänglich seyn, so nehme man seine Zuflucht zu ärztlicher Hülfe.

III. Arzneymittel.

a) Ist die Krankheit noch im Entstehen oder im Anfange, und minder heftig, und wollen vorgedachte Mittel nicht zureichen, dieselbe gänzlich zu beseitigen, dann nehme man außerdem noch Nro. I. zu Hülfe.

Ist dagegen das kranke Individuum ein schwächliches, oder zunächst sensibles Subjekt; dann verordne man ihm von Nro. II. Kindern dagegen von Nro. III.

Sollte aber die Ursache in einem nicht lange vorhergegangenen übermäßigen Genuße kräftiger, nahrhafter und sehr potenzirender Nahrungsmittel liegen, dann unterscheide man folgende Fälle



- α) wenn es wahrscheinlich ist, daß die genossenen Nahrungsmittel noch innerhalb des Magens sich aufhalten, dann suche man Erbrechen durch Nro. IV. V. oder VI. oder in hartnäckigen Fällen durch Nro. VII. zu bewirken.
- β) Ist es aber zu vermuthen, daß dieselben Nahrungsmittel schon in den zwölffingerdarm übergegangen sind, dann schadet nicht nur das Erbrechen eher und mehr als es nutzen kann, sondern was nunmehr zunächst indiziert ist, wäre die Anwendung eines Laxirmittels von Nro. VIII. oder IX.
- b) Ist aber die Krankheit schon heftig, oder nimmt sie immer mehr an Stärke zu; ist dabey der Kopf oder die Lunge stark angegriffen, oder sonst ein Theil sehr entzündet, dann versuche man es vorerst, besonders bey schwächlichen Subjekten, entweder mit Nro. X. oder XI., bey robusten Konstitutionen dagegen mit Nro. XII. Macht aber die Krankheit ihren Verlauf sehr schnell, oder ist der vorhandene Grad von Krankheit der dritte der reinen Sthenie, oder reichen eben gedachte Heilmittel nicht zu; dann erst aber auch dann sogleich verordne man eine Aderlaß nach Verschiedenheit der Stärke der Konstitutionen von 6 bis 12 Unzen. Bey kleinen Kindern und auch nach vorhergegangener Aderlaß, wenn nachher noch Entzündungen gewisser Theile zurückbleiben, bediene man sich dreyer bis vier Blutigel oder Schröpfköpfe; welche man dem

vor-



vorzüglich leidenden Theile so nahe wie möglich appliziret.

Nach geschehener Aderlaß kehre man zu X - XI oder XII. zurück, laß den Tag über den Kranken davon gebrauchen, und vielleicht am Abende von Nro. II. oder III. nehmen.

- c) Sollte indessen auch letzters gedachtes Verfahren b) nicht gehörig wirken wollen, was übrigens, so lange die Krankheit rein sthenischer Natur ist, eben so unwahrscheinlich als selten seyn wird, oder sollte was dann gewöhnlich der Fall ist, das vorhandene Entzündungsfieber schon in Hypersthenie übergegangen seyn; dann schreite man zur Anwendung des Sauerstoffes in Gasform. — Man bereitet nämlich oder läßt bereiten vermittels Salpeters oder Braunsteins in dem Zimmer des Kranken Sauerstoffgas, und läßt dasselbe frey in dem Zimmer sich entwickeln nach dem niedern oder höhern Grade der Hypersthenie in einer weitem oder nähern Entfernung von dem Bette des Kranken, vorerst mit der atmosphärischen Luft des Zimmers vermischt, auf den Kranken einwirken, endlich aber, besonders im dritten Grade der Hypersthenie demselben unmittelbar einathmen.
- d) Nimmt bey diesem Verfahren die Heftigkeit der Krankheit ab, geht z. B. das Entzündungsfieber aus der Hypersthenie wieder in die reine Sthenie über; so versteht es sich von selbst, daß, weil, wenn auch der höhere Grad der Heftigkeit einer Krankheit gehoben ist, damit und darum die
- Krank-



Krankheit selbst noch nicht ganz gehoben seyn werde, daß demzufolge das nunmehr vorhandene Entzündungsfieber zwar nicht mehr als Hypersthenie, dennoch aber als reine Sthenie angesehen und behandelt werden, somit unser Heilverfahren nunmehr wieder gleich b) seyn, und während der Rekonstruktion von der Behandlung b) zu der a) übergehen müsse.

Vermindert sich hierbey das Uebelfeyn, wird die Haut feucht u. s. w. (S. Zufälle 4.); dann schränke man die kühlende Methode nach und nach immer mehr ein, gestatte dem Patienten eine etwas wärmere Temperatur, verhüte alle mögliche Erkältung, setze ihn nach und nach auf eine mehr nahrhafte Diät, reiche ihm kräftige, aber nicht fette Fleischbrühe mit Eygelbe, etwas zartes und saftiges Fleisch, zwischendurch auch ein Glas reines und leichtes bitteres Bier, endlich Wasser und Wein, und Abends ein paar Tassen Thee von Pfeffermünzen, wozu man immer etwas Wein gießen kann.

- e) Sollte aber das Entzündungsfieber die ihm, als solchen, eigenthümliche Form wechseln (S. Zufälle 5.) in welchem Falle angenommen werden muß, daß das Entzündungsfieber, welches vorher hypersthenischer Natur war, nunmehr in Hyperasthenie übergegangen sey, dann müssen wir die Behandlungsart gleich der Hyperasthenie (S. §. 165. 4.), wovon insbesondere im zweyten Abschnitte die Rede noch seyn wird, anwenden. Nur wollen wir hier im Allgemeinen bemerken, daß wir bey der Behandlung des letzten Falles im Durchschnitte vorerst wasserstoffhaltige Arzney-
- L körper



körper, besonders Naphta Vitrioli in so viel möglich starker Gabe anwenden. Vermindert sich die Heftigkeit und der Umfang der vorhandenen krankhaften Erscheinungen, dann verbinde man mit der Naphta, welche freilich nunmehr in kleinerer Dosis gegeben werden muß, z. B. Tinctura thebaica Eckardti etc. wende nach und nach, so wie die Zufälle abnehmen, letztere allein, und nach dieser, wenn die Krankheit z. B. auf den zweyten Grad der Hyperaesthenie herabgesunken ist, Moschus, nach demselben so wie die Krankheit selbst sich vermindert die stikstoffhaltige Mittel in absteigender Ordnung ihrer Differenz (§. 167.) an, und schliesse endlich die ganze Behandlung damit, daß man theils wie bey d) verfährt, theils auch die Regulirung des eigentlichen Verdauungsgeschäftes gehörig in Ansprüche nimmt, d. h. durch zweckmäßige und der Konstitution des Kranken anpassende kohlenstoffhaltige Mittel von der indifferentern Form das Verdauungsgeschäft gehörig zu unterstützen sucht.

II.

Brustentzündung. *Peripneumonia.*

D e f i n i z i o n.

Brustentzündung ist ein fieberhafter Zustand, verbunden mit einem stumpfen, drückenden, zusammenschnürenden oder stechenden Schmerz in der Brust, schwerem und kurzem Athem, und Husten, welcher an-

fangs

fangs trocken, nachher aber mit Auswurf und blutigen Streifen begleitet ist, und beym tiefen Einathmen leicht zurückkehrt.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Schwere Beklemmung, und herumziehende Schmerzen.
- 2) Bey dem Ausbruche. Vorerst stellt sich Schauder und Frost ein, welcher oft Stundenlang andauert; hierauf folgt allgemeine grofse Hitze, ein stumpfer, drückender oder zusammenschnürender Brustschmerz, welcher oft verschiedene Gegenden einnimmt. Der Athem dabey ist kurz, geschwind, mühsam, und besonders beym tiefen Athemholen oder sonstiger Erschütterung des Körpers sehr schmerzend und heifs, verbunden mit einer grossen Unruhe und Angst. Hierzu gesellt sich ein anfangs trockener, nachher aber mit schleimigem und blutiggefärbtem Auswurfe begleiteter Husten. Der Kranke spricht kurz und abgebrochen. Der Puls ist mehrentheils im Anfange der Krankheit hart, voll, schnell und stark, zuweilen aber auch weich und wellenförmig. Uebrigens finden sich auch hier noch die übrigen Zufälle des Entzündungsfiebers.
- 3) Bey der Zunahme bis zur grössten Höhe. Der Athemzug geht höchst beschwerlich vor sich, der Brustschmerz wird heftiger flehend oder gleichsam schneidend. Die Zunge ist ganz trocken, der Durst kaum zu stillen, und das Niederschlucken höchst erschwert. Der Puls wird härter und stärker. Bey manchen wird



der Schlund entzündet. Steigt die Entzündung noch höher, so wird der Athem tief, pfeifend, röchelnd; der Puls klein, geschwind, ungleich, aussetzend. Ermattung und Entkräftung fühlt der Kranke durch den ganzen Körper. Alle Organe des Willens sind in der größten Unthätigkeit.

4) Bey der Abnahme. Der Schmerz ist weniger scharf, etwas stumpfer und erträglicher, der Puls zwar noch kräftig, aber nicht so stark, wie im Anfange; der Athemzug leichter und freyer; der Auswurf weniger beschwerlich, zäher, häufiger, gefärbter; die Haut und die Zunge feucht u. s. w.

5) Beym Wechsel. Der Auswurf vermindert sich, und bestehet blos in einer dünnen und wässerigen Feuchtigkeit; der Athem wird immer kürzer und beklemmter, der Kranke will immer ersticken, muß meist aufrecht sitzen; die Augen verdunkeln sich immer mehr; das Gesicht wird blaß und fällt zusammen; die Stimme verlöscht ganz; der Verstand ist verstöret; Hände und Füße sind kalt, es entstehen klebrige kalte Schweisse am Kopfe, auf der Brust und um den Hals, und der Patient wird ganz frey von Schmerzen.

A u s g ä n g e.

a) Krankhafte. Brustwasserfucht, vorzüglich nach zu starker und anhaltender Schwächungsmethode; Verwachsungen zwischen Lunge und Brustfell, oder zwischen Brustfell und Rippenkasten; Vereiterung der Lunge, welche sich in
ein



ein offenes oder verschlossenes Geschwür endigt. Engbrüstigkeit.

b) Tödliche. Brand der Lunge; Schlagfluß; Erstickung.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Bey einem robusten, gut genährten, blutreichen Körper, bey einem sehr reizbaren Zustande der Lungen, oder wenn schon einmal Brustentzündung vorhanden war, können heftiges und lange andauerndes Laufen, besonders gegen den Strom der Luft, dauerhafter Ost- und Nordwind, mittelbar auch strenge Winterkälte, und plötzliche Erkältung des ganzen Körpers; ferner häufiger Genuß von Fleischspeisen und geistigen Getränken, einfaches Entzündungsfieber, so wie alle Inzitanten verstärkende Potenzen leicht herbeyführende ursachliche Momente der Brustentzündung werden.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Eine Phlegmasie, welche entweder durch unmittelbare Einwirkung positiv schädlicher Einflüsse, oder wegen größerer Disposition der Brust auf dem in der Höhle derselben enthaltenen Theile vorzüglich verstärkt ist.

H e i l a n z e i g e.

Ganz dieselbe, wie bey dem Entzündungsfieber; nur muß hier bey der Anwendung des Heilverfahrens besonders auf die Affektion der Brust Rücksicht genommen werden.

H e i l v e r f a h r e n.

Gleichfalls die depotenzirende Methode. Nur bemerke man, daß hier vorzüglich schnelle Hülfe

VON-



vonnöthen ist, sowohl wenn die Brustentzündung ausbricht, oder einen beträchtlichen Grad von Heftigkeit schon erstiegen hat, als auch dann, wenn dieselbe einen tödlichen Ausgang zu nehmen Miene macht. Im Allgemeinen bleibt daher die Behandlung folgende:

I. Diät. Ganz dieselbe wie bey der Synocha.

II. Hausmittel. Gleichfalls wie bey derselben.

Nur muß vor allen Dingen eine Ader an einem von beyden Armen geöffnet und das Blutabzapfen so oft wiederholt werden, bis die Zufälle an ihrer Heftigkeit abnehmen. Dann erst kann man, außer den oben schon erwähnten, noch folgende Hausmittel mit Nutzen anwenden:

- a) In der Brust reibe man recht oft auch nur gemeines Oel ein.
- b) Mische man gleiche Theile Eßsig und Oel miteinander gehörig, und lasse dem Patienten alle Stunden einen Eßlöffel voll nehmen, so lange, bis die Krankheit anfängt abzunehmen.
- c) Wasche oder bade man einigemal täglich Hände und Füße mit Eßsig und Wasser, so lange die Hitze noch in ihrer Stärke bleibt.
- d) In demselben Zeitpunkte mache man auch Umschläge von kaltem Wasser auf die Brust, und fahre damit nur so lange fort, bis der Puls anfängt, frequent zu werden. Hierzu sind selten mehr als eine oder zwey Stunden nöthig.
- e) Hiermit verbinde man lauwarme Fußbäder von Seife oder Asche und Salz.
- f) Klystire von Molken oder von Gerstenabfud, mit zwey Löffeln Oel und einem Löffel Salz, sind hier vorzüglich nöthwendig.

III.

III. Arzneymittel. Das erste und nothwendigste ist Verminderung der Blutmenge und übrigen Säfte des Körpers. Daher

- a) eine Aderlass an einem von beyden Armen. Ist der Kranke robust, vollsaftig, jung, und die Heftigkeit der Zufälle dauert noch immer fort; so kann, etwa nach zwey bis vier Stunden, eine zweyte Aderlass vorgenommen werden.
- b) Ist aber durch die Aderlass die Heftigkeit der Zufälle im Allgemeinen geschwächt, bleibt der Brustschmerz immer noch stechend und der Athem erschwert, so lege man noch drey bis vier Blutigel auf die vorzüglich leidende Stelle der Brust, oder in Ermanglung der Blutigel applizire man auf dem Arme und dem Theile des Rückens, welcher der leidenden Stelle zunächst liegt, zwey bis vier Schröpfköpfe.
- c) Sobald hierauf Erleichterung erfolgt ist, dann lasse man nach Befinden der Umstände entweder von Nro. II. gebrauchen, oder Nro. XIII. anwenden.
- d) Hiermit verbinde man den Gebrauch lauwarmer Fußbäder, und fahre überhaupt mit der bisher angegebenen Behandlungsart, mit allmählich zu vermindern der Stärke derselben so lange fort, bis die Zufälle entweder ihre sthenische Beschaffenheit verloren haben, oder ganz und gar verschwunden sind; in welchem Falle man den Kranken allmählich wieder zu seiner vorigen Lebensart zurückzubringen suchen muß, und sobald er dieselbe zur Hälfte wieder vertragen kann,



kann, ihm täglich ein lauwarmes Bad anfänglich von Seife, nachher von Zusätzen aromatischer Kräuter gebrauchen läßt.

c) Zuweilen wird es mit der Anwendung der depotenzirenden Methode versehen, d. h. dieselbe zu stark angewendet, oder es wirken unversehens während der Wiedergenesung des Kranken mancherley im Allgemeinen schwächende Potenzen auf das kranke Individuum ein. Der Erfolg davon ist gewöhnlich dieser: es stellt sich nämlich ein unangenehmer und stechender Schmerz oder sonst eine drückende Empfindung auf der Brust, mitunter auch noch verbunden entweder mit einem beschwerlichen, kurzen, prellenden und trockenen Husten, oder mit einem erschwerten und beklommenen Athem ein. In beyden Fällen verfähre man auf folgende Weise:

α) reibe man in die Brust entweder von Nro. XIV. oder XV. öfters ein.

β) Lasse man von Nro. XVI. vor Schlafengehen ein ganzes, und Morgens eine Stunde nach dem Erwachen ein halbes Pulver nehmen.

γ) Den Tag über lasse man den Kranken Stundenweise Baldrian - Thee, und mitunter ein halbes Weinglas voll Bischof trinken.

δ) Die Diät muß leicht verdaulich, gewürzhalt und animalischer Art seyn; am besten Bouillon mit Eygelb.

ε) Vor Schlafengehen muß der Kranke jedesmal ein lauwarmes Senf - Fußbad gebrauchen.

ζ) Da.



- 3) Dabey bleibt aber gehörige und angemessene Bewegung des Körpers eines der nothwendigsten Hülfsmittel.
- f) Steigt aber die Brustentzündung bis zu ihrer größten Höhe, oder bekommen wir sie gleich anfänglich auf diesem Grade der Heftigkeit zu behandeln, (S. Zufälle 3.) dann ist dieselbe Behandlung indizirt wie bey dem Entzündungsfieber. (S. Arzneymittel c.)
- g) Reicht letztere Behandlung nicht zu, so stirbt entweder der Kranke apoplektisch oder suffokatorisch, oder wenn es seiner Konstitution möglich ist, gehet die Krankheit in Hyperasthenie über, womit sie zugleich auch ihre ganze Form ändert (S. Zufälle 5.) In diesem Falle muß unsere Behandlungsart, die besondern Modifikationen abgerechnet, welche die Krankheit aus mancherley Ursachen, insbesondere aus Ursachen der Individualität der Konstitution des Kranken, erleiden kann, im Durchschnitte ganz dieselbe seyn, deren wir bey dem Entzündungsfieber (S. Arzneymittel e.) gedacht haben.

A n m e r k u n g.

Sehr oft leidet jemand an allen Zufällen der Brustentzündung, und dieselbe ist dennoch nicht sthenisch. Wer aber, was leider noch so häufig von vielen Aerzten geschieht, in diesem Falle die depotenzirende Methode anwendet, führet sicher seinen Kranken in das Siechthum oder Grab. Solche Fälle ereignen sich bey nahe meistens bey Nervenfiebern. Daher müssen wir,
ehe



ehe wir die Kuranzeige der Brustentzündung bestimmen, die vorhergegangenen und wirklich herbeyführenden Schädlichkeiten u. s. w. untersuchen. Eben darum aber auch müssen wir zu dem positiven Heilverfahren greifen, dessen wir überhaupt schon im ersten Theile 3ten Kapitel gedacht haben, und noch im zweyten Abschnitte mit einigen Worten ausführlicher gedenken werden.

III.

Hirnwuth. *Phrenitis*.

D e f i n i z i o n.

Die Hirnwuth in diesem Betrachte genommen, ist Raserey mit Pyrexie.

Z u f ä l l e.


- 1) Vor dem Ausbruche. Patient ist bey übrigen gutem Befinden furchtsam, misstrauisch; schläft unruhig, erwacht öfters mit Zusammenfahren des Körpers, klagt über Visionen, sonderbare Bilder, ängstliche Träume, Zittern und Angst durch den ganzen Körper; wird heftig in allen feinen Bewegungen und überspannt lustig. Seine Augen stehen zuweilen verdreht, schief, starr, wild, zornig vor sich hin, werden zuweilen verdunkelt. Der Kranke klagt über Schwindel, über ein brennendes Gefühl in der Herzgrube u. s. w. So dauert es längere oder kürzere Zeit.
- 2) Beym Ausbruche. Gemeiniglich gehet ein schnell vorübergehender Schauer vorher, worauf

auf ungewöhnliche Hitze, entzündungsartiger Schmerz in den Gelenken, dem Rückgrate, Schlunde, und um der Brust sich einstellen. Hier-
auf nimmt der Kopfschmerz immer mehr und
mehr zu, der Kranke verliert alle Besinnung, und
bricht mit einer heftigen Raserey los, wobey
er oft unerhörte Muskelkraft zeigt. Seine Au-
gen sind glänzend, wild, starr, oder herumrol-
lend, blutig und hervorgetrieben; sein Gesicht
roth, und im Magen ist Ekel vor Speisen, wel-
cher zuweilen mit einem schleimigen oder grün-
galligen Erbrechen vergesellschaftet ist.

3) Bey der Zunahme bis zur grössten
Höhe. Die Raserey wird immer heftiger,
stärker, dauert ununterbrochen fort, das Gehör
wird schwer, die Zunge, die Glieder und Pulsa-
dern zittern. Der Kranke spucket beständig,
knirschet mit den Zähnen, zupfet an der Bett-
decke, haschet nach Fliegen. Sein Urin ist waf-
ferhell; seine Stühle weiß, und endlich gefellet
sich noch Sehnenhüpfen dazu.

4. Bey der Abnahme. Die Raserey verliert
an ihrer Heftigkeit und Andauer, das Bewußtseyn
stellt sich immer mehr und mehr wieder ein,
die Haut wird feucht, der Urin dunkler und
nach und nach besser gefärbt; es stellet sich wie-
der Appetit ein. Zuweilen kommet Nasenblü-
ten oder Diarrhöe zum Vorschein.

5) Beym Wechsel. Man bemerkt schlagflüß-
fige Zufälle, Ohnmachten, kleinen Puls, Bang-
igkeit, Erbrechen von grünspanartiger Materie,
flrau-



straubige Augen, erweiterte und ganz unempfindliche Pupillen, totale Schwäche im ganzen Körper, beständiges Liegen auf dem Rücken, tiefer Schlummer, einzelne Lähmungen, anhaltender Wahnsinn oder Stupidität. Beständig kauet der Kranke, und immer stehet Schaum vor seinem Munde.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Narrheit, Wahnsinn, Melancholie, Stupidität, Blödsinn, lymphatische Geschwülste oder Eiteransammlungen an verschiedenen Theilen des Körpers.
- b) Tödliche. Apoplexie, Starr- oder Todtenkrampf.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Große Sonnenhitze, besonders bey entblößtem Kopfe; heftige Gemüthsbewegungen, vorzüglich heftiger Zorn; Mißbrauch geistiger Getränke, öftere Berausung; äußere Gewaltthätigkeit; schneller Uebergang von der Kälte in die Wärme; anhaltendes Wachen; beträchtliches Entzündungsfieber. Alle diese Schädlichkeiten können aber jenen Leuten, die sich sehr im Denken oder Studiren anstrengen, noch jung, blutreich, vollsaftig sind, oder durch Onanie sich sehr geschwächt haben, desto leichter die Hirnwuth zuziehen.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Allzugroße Depotenzirung der Sensibilität zunächst in dem Gehirne aus Ursache einer zu beträchtlichen Erhöhung der Irritabilität vorzüglich in dem Blutgefäßsystem



stem und dadurch bewirkten Kongestion des Blutes nach den Kopf u. s. w.

H e i l a n z e i g e.

Depotenzirende Methode, mit vorzüglicher Rücksicht auf das noch besondere Leiden des Kopfes.

H e i l v e r f a h r e n.

Der wichtigste Zeitpunkt für unsere Behandlung ist derjenige, wo die Krankheit noch sthenisch ist; in welchem Falle wir uns am zweckmäßigsten folgender Mittel bedienen.

I. Diät. Ist dieselbe wie bey der Synocha. Nur ist hier noch vorzüglich anzuempfehlen, den Kranken mehr aufrecht sitzen zu lassen, und alles Geräusch um und neben ihm zu entfernen.


II. Hausmittel. Wie bey der Synocha. Außerdem noch

a) wenn man dem Kranken vorerst gehörig zur Ader gelassen hat, dann schneide man ihm die Haare vom Kopfe weg, mache beständig Umschläge von Eßig und kaltem Wasser, oder lege ihm frisch gegrabene Erde, in der Form eines Huthes, oder auch Eis um den Kopf. Das Eis darf aber nicht länger, als eine Viertel- oder im höchsten Nothfalle eine halbe Stunde auf diese Art angewendet werden.

b) Fußbäder und Klystire wie bey der Synocha.


III. Arzneymittel.

a) Vor allen Dingen lasse man so oft und so viel zur Ader, bis sich die Zufälle etwas mindern. Nur warne ich, besonders bey schwächlichen
und



und reizbaren Subjekten, vor übermäßiges Aderlassen, weil dadurch schon mancher erst methodisch zum Narren oder Blödsinnigen geworden ist.

- b) Hierauf wende man nach Befinden der Umstände, nämlich der Konstitution, dem Geschlechte, dem Alter, so wie dem Grade der Heftigkeit gemäß, entweder von Nro. II. oder IX. oder XI. oder XII. an, und forge dabey für strenge Diät in Verbindung gedachter Hausmittel.
- c) Im Falle man gehörig schon zur Ader gelassen hat, aber dennoch die Zufälle des Kopfes oder des Rückgrates nicht gänzlich weichen wollen, so kann man noch einige Blutigel an die Schläfe und hinter den Ohren, oder Schröpfköpfe zwischen den Schultern applizieren.
- d) Ist die Hirnwuth schon bis zu ihrer größten Höhe gestiegen, (S. Zufälle 3.) dann verfare man wie bey dem Entzündungsfieber. (S. Arzneymittel c.)
- e) Ist die Krankheit im Abnehmen, dann gehe man auf dieselbe Weise zu Werke, wie gleichfalls bey dem Entzündungsfieber (S. Arzneymittel d) angegeben worden ist.
- f) Die Behandlung der Hirnwuth beym Wechsel (S. Zufälle 5.) ist gleichfalls dieselbe, wie bey dem Entzündungsfieber. (S. Arzneymittel e.) Nur bemerke man hier, daß die anzuwendenden positiven Reize erstens aus der Klasse der kohlenstoffhaltigen Mitteln genommen, und zweytens nicht nur innerlich, sondern zugleich auch in gleich starken Dosen zunächst an den Kopf,



Kopf, Rückgrat und an die Fußsohlen applizirt werden, zu welchem Behufe man sich mit der größten Zuverlässigkeit bedienen kann Nro. XIV. oder XV.

Uebrigens gilt auch von der Hirnwuth dieselbe Bemerkung, welche wir der Brustentzündung als Anmerkung beygefügt haben.

IV.

Pocken. *Variolae.*

D e f i n i z i o n.

Pocken sind eine Ausschlagskrankheit, wo nach vorhergegangener Pyrexie am dritten oder vierten Tage meistens erst im Gesichte, und hernach anderwärts in der Haut kleine rothe Flecken ausbrechen, welche etwa sechs Stunden nach ihrer Erscheinung in ihrer Mitte ein härthliches Knötchen bekommen, bald in Eiterung übergehen, und den neunten Tag mit einer Schlorfe abfallen.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche gehen Müdigkeit, Zerschlagenheit in allen Gliedern, üble Laune, Schläfrigkeit, und bey Kindern Auffahren im Schläfe vorher.
- 2) Beym Ausbruche und völligen Verlaufe derselben. Diese Krankheit hat ihre eignen Zeiträume, wo sie jedesmal ihre Form und Zufälle ändert. Nämlich:
 - a) Im ersten Zeitraume bemerket man vorerst Schauder, Frost; hierauf Hitze, besonders im



im Gesichte, welche mit Blässe wechselt; die Zunge ist weiß belegt, schmutzig; der Athem hat einen besondern Geruch, und der Körper eine eigne Ausdünstung, die nur Pockenkranken eigen ist. Es stellt sich Ekel, Erbrechen, Beschwerden in der Herzgrube, Kopfweh, besonders am Vorderhaupte, Schmerzen im Rücken, Hüften, Nacken, Schlunde, unter den Achselgruben und in den Gelenken ein. Gegen den Abend nimmt die Hitze, Unruhe und Aengstlichkeit zu. Bey Kindern vermehrt sich die Schlaffucht und das Erschrecken im Schlafe; man bemerkt Zähneknirschen, wozu sich zuweilen Konvulsionen gesellen. Bey Erwachsenen ist mehr Unruhe, ungewöhnliche Freudigkeit und Wachen, manchmal viel Schweiß, Durst, Trockenheit und Irreseyn; der Puls wird geschwind und hart.

- b) Im zweyten Zeitraume erscheinen rothe Flecken wie Flohstiche auf der Haut, die bald in der Mitte einen etwas hellern Punkt mit einer kleinen Vertiefung erhalten. Diese heben sich nach ein paar Stunden, und man fühlt sechs Stunden nach ihrer Erscheinung in der Mitte derselben einen Berg, welcher sich wie ein hartes Knötchen anfühlt. Zuerst wird man sie im Gesichte, dann an beyden Armen, am Leibe, und endlich an den Füßen gewahr. Jedoch ist diese Ordnung des Ausbruches nicht beständig. Mit der Endigung des Ausbruches nimmt auch die Pyrexie und die Heftigkeit der vorhergegangenen Zufälle ab.

c)



c) Im dritten Zeitraume. Dieser fängt gewöhnlich mit dem siebenten Tage der Krankheit, oder mit dem vierten nach der ersten Erscheinung der Pocken an. Die Blattern werden immer entzündeter und röther, verlieren ihre Grübchen, werden höher und spitziger, breiter und weißer, und füllen sich allmählich mit Eiter. Ist die Eiterung erst zu Stande gekommen, so nehmen die Zufälle wieder ab und die Haut wird feucht. Manchmal fließen sie in große, breite Flecken zusammen. In den Zwischenräumen zwischen den Flecken ist die Haut roth und gespannt; daher auch Geschwulst des Gesichtes und der übrigen Theile. Vorzüglich schwellen die Augenlieder oft so an, daß sie die Augen völlig verschließen und den Patienten blind machen. So wie die Eiterung zunimmt, nimmt die Röthe ab. Der Eiter ist anfangs dünn, und wird allmählich dicker. Die Kranken haben nun mehrentheils Frost und Hitze, Unruhe und Schmerzen im Halse und Heiserkeit. Zuweilen findet sich auch ein Speichelfluß ein, der oft die innern Theile des Mundes wund und schmerzhaft, und den Athem stinkend macht. Bey andern kommt ein Durchfall zum Vorschein.

d) Im vierten Zeitraume. Dieser fängt gewöhnlich mit dem zehnten oder elften Tage an; die Blattern trocknen in derselben Ordnung ab, in welcher sie hervorkamen. Die Pusteln platzen an den mittleren Grübchen auf; die Materie läuft aus, welche allmählich verhärtet,

M

Kru-



Krusten bildet und abfällt. Nach dem Abfallen bleiben rothe und bläuliche Flecken mit und ohne Narben zurück, die sich allmählich verlieren. Dieser Zeitraum dauert oft vier bis fünf Tage, so daß also die ganze Krankheit in ihrer gutartigen Gestalt innerhalb vierzehn Tagen vollendet ist.

- 3) Bey der Zunahme bis zur größten Höhe. Im ersten Zeitraume schon gesellen sich örtliche Entzündungen, z. B. der Brust, des Kopfes, Halses u. s. w. hinzu. Es zeigt sich blos eine hochrothe Entzündung der Blattern, die sich nicht heben, füllen und eitern wollen, und beständig von Pyrexie begleitet sind. Der Puls ist voller, härter, geschwinder, der Athemzug mühsamer und schneller, das Gesicht roth und aufgetrieben, die Augen angeschwollen und roth, das Kopfweh heftig, die Hitze brennend.
- 4) Bey dem Wechsel. Es stellet sich wirkliches eigentliches Fieber mit Kraftlosigkeit des ganzen Körpers ein. Der Kranke klagt Frost, Fieberanwandlungen; die Pocken fallen ein, werden blafs, fliefsen zusammen, bilden eine gemeinschaftliche Borke, vorzüglich im Gesichte, worunter sich eine jauchartige Materie bildet, tief unter sich frist, und grofse, oft auch blütige Narben zurückläßt. Der Husten und Auswurf stocket, drohet Erstickung. Es gesellen sich Konvulsionen und Ohnmachten hinzu, welche mit dem Tode endigen.



A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Abzehrendes Fieber, Magenbeschwerden aller Art, asthenische Augenentzündung, Flecken der Hornhaut auf den Augen, Eiterauge, Blindheit, Thränenfistel, Knochenfraß, eiternde Lungenfucht, Hautauschläge mancherley Art, Drüsen geschwülste, Stupidität, Fallfucht.
- b) Tödliche. Schlagflüsse, Schlaффucht, Konvulsionen.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Die herbeyführende Ursache dieser Krankheit ist die eigentliche Blattermaterie, welche auf irgend eine Weise in unsern Körper, und vorzüglich unter das Oberhäutchen desselben gebracht, die eigenthümliche Form des Uebelseyns bestimmt. Indessen dependirt die grössere oder geringere Heftigkeit dieser Phlegmasie einzig und allein von der Disposition und Konstitution des affizirten Körpers.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Phlegmasie welche vorzüglich die lymphatischen Gefäße und kleinere Drüsen der Oberfläche unseres Körpers befällt. (S. meinen Entwurf Th. II. 1769.)

H e i l a n z e i g e.

Depotenzirende Methode in ihrem ganzen Umfange.

H e i l v e r f a h r e n.

Die wichtigsten Zeitpunkte für das Wohlfeyn der Kranken und für unsere Absicht, die Gefährlichkeit zu



heben, und die üblen Nachlässe zu verhüten, sind die Zeit des Ausbruches der Blattern selbst und ihrer Eiterung. Minder wichtig, doch sehr respektabel ist die Zeit der Abtrocknung. Indessen werde ich jeden einzelnen Theil der Heilart nach dem erwähnten Zeitraume vortragen.

I. Diät. In diesem Anbetrachte merke man folgende Regeln:

1) Beym Ausbruche der Blattern. Sind dieselben gelind, ist die Erregung nicht sehr verstärkt, so ist ein mäßig kühles Verhalten, Entziehung aller Fleischspeisen und geistigen Getränke, häufigerer Genuß von Pflanzekost, besonders von Obste, und kühlende Getränke schon hinreichend. Bey allem dem aber warne ich sehr vor allzustarkes Schwächen, weil dadurch die Gewalt der zum Auschlage nöthigen Erregung zu sehr vermindert, folglich leicht krankhafte Ausgänge herbeygeführt werden, und die Krankheit leicht ihre Natur verändern kann. Nur dann, wenn die sthenische Beschaffenheit während dem Ausbruche allzuheftig wird, verstärke man die schwächende und kühlende Diät, worunter kühle Luft, leichte Bedeckung, aufrechtes Sitzen, und der völlige Aufenthalt außer dem Bette die wirksamsten Mittel sind. Hiermit verbinde man auch Reinlichkeit des Körpers, der Wäsche und Betten.

2) Bey der Eiterung der Blattern muß die Temperatur nach Befinden der sthenischen Beschaffenheit etwas wärmer seyn, der Patient
viel



viel Gerstentrank mit Honig, und zuweilen eine Tasse Chamillenthee trinken.

II, Hausmittel bleiben dieselben wie bey der Synocha. Noch besonders aber sind hier anzu-merken:

- 1) Um die Kongestion des Blutes nach dem Kopf, somit auch die Menge der allda ausbrechenden Blattern zu vermindern, und dadurch leichter Konvulsionen zu verhüten, wasche man vor dem Ausbruche der eigentlichen Blattern das Gesicht fleissig mit kaltem Wasser und Efsig, setze einigemal täglich dem Kranken Klystire (wie bey der Brustentzündung Hausmittel f), lasse ihm Fufsbäder nehmen, umwickle die Füße mit einem in warmer Milch getauchten Flanelle, besonders bey Kindern. In derselben Absicht lasse ich auch gewöhnlich vor dem Ausbruche der Blattern Sauerteig mit Efsig, oder statt dessen einige Scheibchen weisser Zaunrüben um die Waden legen, und die Stelle, worauf dieselben gelegt sind, nur roth ziehen.
- 2) Um bey Kindern das Aufritzen der Blattern zu verhüten, reibe man dieselben fleissig mit dem Barte einer Feder.
- 3) Um die Augen vor Blattern zu sichern, verdunkle man mit dem Ausbruche der Blatterpyrexie das Zimmer, und wasche die Augen fleissig mit kaltem Wasser. Sind aber im dritten Zeitraume die Augen vielleicht gar durch Blattern auf denselben zugepappt, so feuchte man dieselben fleissig mit Muttermilch, lauer Milch, oder mit einem



einem Umschlage vom Marke süßer gebratener Aepfel und Milch, oder mit einem Absud vom Pappelkraut wieder auf, und spritze oder tröpfe wo möglich davon in dieselben.

- 4) Man kann die Heftigkeit der Blatterkrankheit mäßigen, und dem Kranken erträglicher machen, wenn man die vollsten Blattern an den Extremitäten mit einer Nadel aufritzet, mit einem in Milch getauchten Schwamme auswäscht, und dieses Verfahren aller drey Stunden wiederholt. Nur muß die Eiterung der dazu bestimmten Blattern vollständig seyn.
- 5) Kommt heftiger Kopfschmerz oder Raserey zum Vorschein, so verfare man, wie bey der Hirnwuth angegeben wurde.
- 6) Bey heftigem Halsweh lege man Blutigel um den Hals, nehme öfters kaltgewordenen Gerstentrank, mit Honig und Eßig vermischt, in den Mund, und spucke ihn wieder aus, wenn er warm geworden ist. Auch kann man fleißig Rosenhonig nehmen und warme Umschläge um den Hals machen, wenn Geschwürchen im Halse sich angesetzt haben.
- 7) Der Husten, welcher sich im Anfange zu den Pocken gesellt, ist meist katarrhalischer Natur, davon weiter unten. Rühret er aber späterhin von Schwärchen im Munde und an der Luftröhre her, so lasse man fleißig Gerstentrank oder Milch mit Wasser nehmen, und den Dampf von warmem Wasser an die leidenden Theile gehen.



- 8) Erbrechen ist auch ein nicht seltener Zufall bey Blattern. Auch davon weiterhin ein Mehreres.
- 9) Harnblasenbeschwerden werden geheilt durch gelinde Bewegungen auſſer dem Bette im Zimmer, durch Klyſtire, ſäuerliche Getränke, warme Fußbäder, Bähungen oder warme Servietten auf den Unterleib, und wenn der Urin ſcharf iſt, durch Gerſtentrank, womit man Pappelkraut abkochen kann.
- 10) Nafenbluten und Diarrhöe kommen auch bey Blattern öfters vor; allein ihre Behandlung werde ich erſt weiter unten angeben.
- 11) Speichelfluſs, Unterdrückung deſſelben, Verblutungen, unmäßige Schweiſſe, Konvulſionen gehören zu den aſtheniſchen Blattern, wovon ich weiterhin noch beſonders handeln werde.
- 12) Beym Abtrocknen der Blattern gebe man aller drey Tage ein gelindes Abführungsmittel, waſche täglich den Kranken am ganzen Leibe mit Eigelb in Waſſer aufgelöſt, zuweilen auch mit lauem Waſſer und Wein, bade den Kranken einen Tag um den andern in Milch und Waſſer, oder in einer Abkochung von Waizenkleien und Chamillen, und lenke nach und nach wieder auf die gewöhnte Diät ein.

III. Arzneymittel. Gelinde Pocken bedürfen meiſtens keine andere Hülfe als die eben angegebene. Sobald aber die Sthenie heftig wird, dann verfare man auf folgende Weiſe:

1) Im erſten Zeitraume:

a) Iſt



- a) Ist die Pyrexie sehr heftig, so verordne man für Erwachsene eine Aderlaß von fünf bis sechs Unzen.
 - b) Gefellen sich örtliche Entzündungen dazu, so handle man dieselbe gehörig.
 - c) Nur bitte ich, Kinder mit Aderlassen zu verschonen, indem daraus, für die Folge wenigstens, leicht fatale Nachlässe entstehen. Außerdem kann man ja bey Kindern dadurch, daß man sie kühler Luft aussetzet, meist aufrecht sitzen, und wo möglich ganz außer dem Bette seyn läßt, ihnen kühlende und säuerliche Getränke giebt, Klystire beybringen und Fußbäder nehmen läßt, bey heftiger Entzündung der Blattern das nämliche schon ausrichten.
 - d) Ist der dritte Anfall der Pyrexie vorüber, so lasse man von Nro. IV. V. oder VI. so lange nehmen, bis dreymaliges Erbrechen erfolgt ist,
 - e) Dauert demohngeachtet die Sthenie noch mit einer beträchtlichen Heftigkeit fort, so lasse man entweder Nro. I. X. oder XI. gebrauchen, und setze dabey die kühlende Diät fort.
- 2) Im zweyten Zeitraume.
- Sollte nach dem Ausbruche der Blattern die Pyrexie noch sehr heftig anhalten, lasse man fleißig von Nro. II. gebrauchen so lange bis die Heftigkeit der Zufälle nachläßt. Dabey unterstütze man den Kranken mit vielem noch immer säuerlichem Getränke.
- Sollte aber die Krankheit in Hypersthenie übergegangen seyn oder übergehen, (S. Zufälle 3.)
dann

dann verfare man wie bey dem Entzündungs-
fieber, (S. Arzneymittel c.) Eben fo auch

- 3) Im dritten Zeitraume. Wenn letzters
gedachter Fall etwa in demselben sich einstellen
sollte.

Außerdem aber erwäge man genau, daß, so wie
die Eiterung anfängt, der Zustand des Organis-
mus im Allgemeinen nunmehr eine rein astheni-
sche Beschaffenheit angenommen habe. (S. mei-
nen Entwurf Th. II. §. 1768.) Aus eben
demselben Grunde aber verhöte man vor allem
Erkältung, gestatte dem Kranken eine etwas
wärmere Atmosphäre, lasse ihm etwa aller zwey
Stunden eine Tasse Chamillenthee mit 15 bis 20
Tropfen vinum antimonii Huxhami trinken, oder
einen Eßlöffel voll von Nro. XVII. nehmen,
wo möglich nebenbey Fußbäder und im er-
forderlichen Falle, wenn nämlich die Eiterung
nicht gehörig oder zu langsam vor sich gehen
sollte, ganze lauwarme Bäder oder theils statt
derselben, theils mit denselben Klystire von ei-
nem Chamillen- und Baldrian- Abfud mit einigen
Tropfen Tinctura thebaica gebrauchen. Mit
dieser Behandlung fahre man fort, auch

- 4) Im vierten Zeitraume.

Sollte aber vielleicht die Abtrocknung aus Ursache
einer allgemeinen Schwäche zu langsam von stat-
ten gehen, oder andere Unregelmäßigkeiten sich
einstellen, dann greife man zu Nro. XVIII. ver-
binde damit Bäder, Klystire u. s. w.

Außer-



Außerdem aber, wenn die Abblatterung wie gewöhnlich von statten gehet, empfehle ich ganz besonders den Gebrauch von Nro. XIX.

Vorzüglich sey man indeffen auf nahrhafte Speisen bedacht, besonders gewürzhafte Fleischbrühe mit Eigelb, Sago, Salep oder isländisches Moos mit Fleischbrühe abgekocht, u. s. w.

Nach vollendeter Abtrocknung aber Sorge man für fleißige Anwendung lauwarmer Bäder, anfänglich von Seife, nachher von aromatischen Kräutern, ferner bey schicklicher Witterung für Bewegung in freyer Luft, lasse dem Kranken mitunter mäßig etwas Wein so wie auch zwischendurch leicht verdauliches etwas bitteres Bier trinken.

Die Behandlungsart der Blattern bey dem Wechsel derselben werden wir im zweyten Abschnitte bey den böartigen Blattern angeben.

V.

M a s e r n. *M o r b i l l i.*

D e f i n i z i o n.

Masern sind eine Ausschlagskrankheit, welche mit Niesen, rothen und thränenden Augen, trockenem rauhen Husten oder Heiserkeit anfängt, mit Pyrexie verbunden ist, am Ende des dritten Tages oder etwas später mit einer Menge kleiner rothen Flecken ausbricht, die sich kaum oder wenig über die Haut erheben, nicht eitern, und nach drey Tagen in ganz kleyenartigen Schulfen sich abschuppen.

Z u-

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Thränen der Augen, Brustbeklemmung, Hals- und Lendenweh nebst Müdigkeit in allen Gliedern.
- 2) Beym Ausbruche. Diese katarrhischen Zufälle dauern gewöhnlich einige Tage, alsdann bricht Frost mit abwechselnder Hitze, Fließen der Nase, Röthe, Empfindlichkeit, scharfe und heisse Thränen der Augen mit trockenem Reizhusten, aufgedunsenem Gesichte, noch gröfserer Heiserkeit, und zuweilen auch mit Irreseyn aus. Am vierten Tage nachher kommen zuerst im Gesichte, bald darauf auf der Brust, nachher am Leibe u. s. f. rothe, wenig erhabene, dicht bey-sammenstehende, sich allmählich ausbreitende Flecken, die die Pyrexie selten mindern. Dieses Ausbrechen dauert bis zum fünften, sechsten Tage fort.
- 3) Bey der Zunahme bis zur gröfsten Höhe. Die Heftigkeit des Fiebers nimmt beträchtlich zu, der Ausbruch der Maserflecken giebt keine Linderung, geschieht meistens zu schnell, zu heftig, oft auf einmal; die Flecken sind hochroth gefärbt, der Husten wird heftig mit grossen Brustschmerzen begleitet. Es gesellen sich örtliche Entzündungen, z. B. Brustentzündung, Bräune, bey Erwachsenen Irreseyn, bey Kindern Konvulsionen hinzu. Allenthalben wird die Haut gespannt und aufgetrieben. Vorzüglich schwillt das Gesicht, es schwellen die Augen-



Augenlieder. Beym Abtrocknen entsteht eine zweyte Pyrexie mit einem neuen Anfalle von Brustentzündung.

4. Bey der Abnahme. Am siebenten Tage werden die Maern zuerst wieder im Gesichte blafs, die Geschwulst des Gesichtes sinket zuerst, das Oberhäutchen wird rauh, und schuppet sich oft in kleyenartigen Schulfern unter vielem Jucken ab. Zuweilen verschwinden sie auch ohne deutliche Abschuppung. Hiermit verbinden sich auch zuweilen Blutflüsse, Schweisse, dicker Urin und Durchfall.
- 5) Bey dem Wechsel. Unmäfsige Schweisse, Mangel am Urin, Konvulsionen, plötzliches Verschwinden der Maern ohne baldige Rückkehr, u. s. w. wie bey den Blattern.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Brustentzündung, chronischer, d. i. asthenischer Husten, Lungenschwindsucht, einzelne Abscesse, Augenentzündung u. s. w. (S. die Blattern.)
- b) Tödliche. Wie bey den Blattern.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Eine eigne Ansteckungs Materie, welche nur die Form des Uebelseyns hergiebt, während die Disposition des Körpers, auf welchen dieselbe einwirkt, die eigentliche Beschaffenheit und den Grad der sie begleitenden Erregung bestimmt.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Innormale Erhöhung der Irritabilität zunächst des Lymphsystems, besonders seines Antheils an der Konstruktion der Brust, der Mandeln, der Schleimhäute, der Nasenhöle, der Augen, so wie auch der Oberfläche des Körpers.

H e i l a n z e i g e.

Man suche die Innormalität der Erhöhung der Irritabilität des lymphatischen Systems in gedachten Theilen zu beseitigen.

H e i l v e r f a h r e n.

Gelinde Masern bedürfen außer kühlendem Verhalten und leichter Nahrung selten ärztliche Unterstützung. Ist aber die Heftigkeit derselben beträchtlich, so verfähre man ganz damit, wie bey den Blattern angegeben worden ist. Nur erinnere ich noch dieser zweyen Umstände.

- a) Wenn in der frühern Periode sowohl, als bey dem Abzuge der Krankheit Zeichen einer Brustkrankheit vorhanden sind, verfähre man wie bey der Brustentzündung.
- b) Sehr häufig erscheint nach dem Abtrocknen der Masern Husten, besonders wenn die Pyrexie vorher sehr heftig war, (S. Zufälle 3.) oder wenn der Kranke gleich nach den Masern ins Freye sich begiebt, ohne vorher gegen die in seiner nunmehrigen Lage ihm so leicht nachtheilige Einwirkung der gewöhnlichen Temperatur, der atmosphärischen Luft durch anderweitige Vorkehrungen sich gesichert zu haben.

In



In beyden Fällen ist der Husten asthenischen Ursprungs, und erfordert dieselbe Behandlung, wie bey der Brustentzündung (S. Arzneymittel e.) angegeben worden. Sollte indessen Nro. XVI. noch zu indifferent seyn für das kranke Subjekt, wenn z. B. dasselbe ein Kind ist u. s. w. dann kann man sich in gleicher Absicht Nro. XX. bedienen. Uebrigens bleibt der Gebrauch lauwärmer Bäder nach geschehener Abtrocknung die *Conditio sine qua non* von der völligen und gründlichen Wiedergenesung.

- c) Bey Schwächern, wo der Ausbruch wegen Mangel an Kräften, langsam vor sich gehet, oder wo die Flecken matt und blaß erscheinen, werden warme Getränke, wärmeres Verhalten, warme Bäder oder Bähungen und einige Tassen Thee mit 15 bis 20 Tropfen von *Vinum antimonii Huxhami* von vorzüglichem Nutzen seyn.

Von den böartigen Masern weiter unten ein Mehreres.

VI.

Scharlach. *Scarlatina*.

Definition.

Scharlach ist eine Auschlagskrankheit mit Pyrexie, welche mit Halsweh anfängt, und wobey etwa den vierten Tag das Gesicht aufschwillt, und auf der Haut anfangs kleine, bald darauf aber größer werdende, unförmlich breite, scharlachrothe, nicht erhabene und meistens zusammenfließende Flecken zum Vorschein kommen.

Zu-

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Alle Vorbothen einer Pyrexie, wozu sich besonders mehr oder weniger schmerzhaftes Halsweh und Drücken im Kopfe gefellet.
- 2) Beym Ausbruche. Schauder, Frost und Hitze wechseln drey Tage lang mit einander ab, vermehren sich gegen Abend. Hierbey kommen auch Niesen, Schnupfen und thränende Augen, zuweilen auch schon heftiges Halsweh zum Vorschein. Gegen den vierten Tag schwillt das Gesicht ein wenig auf, der Schmerz oder das Brennen im Halse nimmt zu, der Athem wird erschwert, der Kopf eingenommen, schwindlich, betäubt und manchmal sehr schmerzhaft. Es erscheinet der gedachte Ausschlag selbst, dessen Ausbruch drey oder vier Tage andauert, und die Heftigkeit der Zufälle mindert.
- 3) Bey der Zunahme bis zur größten Höhe. Der Puls ist stark, die Geschwulst und Entzündung im Halse nimmt zu, der Athem wird beschwerlich, es erscheinen Brustschmerzen, rothes, aufgetriebenes Gesicht, heftiges Kopfweh oder Irreseyn.
- 4) Bey der Abnahme. Gegen den siebenten Tag schuppt sich die ganze Haut meist in großen Stücken ab, es zeigt sich Schweiss, Diarrhöe, dicker Urin, zuweilen auch Nasenbluten.
- 5) Beym Wechsel. Allgemeine wasserfüchtige Geschwulst des Zellgewebes. Mund und Nase werden wund, bey der Abschuppung stellt sich
kein



kein Schweiß ein, der Athem wird zum Ersticken schwer, der Kranke kann nichts niederschlucken; die Scharlachflecken sind bey ihrem Ausbruche schon bläulich, oder mit weißem Friesel besäet u. s. w.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Haut - Brust - Bauch - und Gehirnwassersucht, Engbrüstigkeit, Bräune, Knochenfraß an den schwammigen Nasenknochen, Abscesse mancher Art, Auszehrung, Drüsengeschwülste am Halse und hinter den Ohren.
- b) Tödliche. Erstickung und brandige Bräune.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Eine eigne Ansteckungsmaterie, welche in unsern Körper gebracht wird, und nach der Disposition desselben mit größerer oder geringerer Heftigkeit unter der ihr ausschliessend eigenthümlichen Form von Uebelfeyn sich äußert.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Eine Phlegmasie, welche besonders den Hals und das schleimige Gewebe unter dem Oberhäutchen befällt.

H e i l a n z e i g e.

Beseitigung der Phlegmasie, vorzüglich der dieselbe begleitenden Halsentzündung.

H e i l v e r f a h r e n.

Die gewöhnliche Methode, die Scharlachpatienten recht warm zu halten, ist unstreitig eine der wichtigsten Ursachen, warum diese Krankheit an manchen Orten

ten bey alt hergebrachter Behandlungsart sehr schlimm und so oft tödlich ausfällt.

Ist die Scharlachkrankheit gelind sthenischer Beschaffenheit, so ist, außer der bey der Synocha, Blattern und Masern empfohlenen Diät und Hausmitteln weiter nichts nöthig, als daß der Kranke, besonders bey dem Abschuppen sich vor Erkältung hütet, weil sonst in diesem Falle leicht wasserfüchtige Geschwülste entstehen. Aus diesem Grunde rathe ich auch gerade in diesem Zeitpunkte täglich einige Tassen Fliederthee; oder wenn die Haut oder irgend ein Theil unsers Körpers zu schwellen anfängt, so lasse man diese leidende Theile fleißig mit Flanell frottiren, zuweilen auch des Tags mit lauwar-
mem Wasser und Wein oder Seife waschen, und Abends vor Schlafengehen ein paar Tassen Thee mit ein paar Löffel voll Wein, oder wenn die Geschwulst beträchtlich ist, den Tag über etwa drey Tassen Thee von Wachholderbeeren trinken. Letzteren Thee empfehle ich aus häufiger und glücklicher Erfahrung in diesem Falle vorzüglich.

Arzneymittel sind nur dann nöthig, wenn die Krankheit allzuheftig wird. In diesem Falle sind kühles Verhalten; vorzüglich kühle Luft, Purgiren, und im Nothfalle bey Erwachsenen nach Befinden der Leibes-Konstitution des Kranken, auch Aderlassen nöthig.

Bey heftigem Halsweh kann man Blutigel um den Hals legen, Gerstentrank mit Honig und Essig verordnen, und ein Abführungsmittel von Nro. VIII, oder IX. nehmen lassen.



Die Behandlung der übrigen bey dieser Krankheit zuweilen auch vorkommenden Zufälle geschieht ganz nach der bey den Blattern angegebenen Methode.

Was endlich die Bräune selbst und die sogenannte bösertige Scharlachkrankheit anlangt, so verweise ich deswegen auf die weiter unten vorkommende Abhandlung von der Bräune.

VII.

Hitzige Flußkrankheit, *Rheumatismus*,
und
sthenische Gicht, *Arthritis sthenica*.

D e f i n i z i o n.

Rheumatismus oder sthenische Gicht ist eine Pfliegmasie mit reissendem, stechendem oder schneidendem Schmerzen, welcher zwar vorzüglich die Gelenke befällt, übrigens aber alle erregbaren Organe unseres Körpers z. B. Muskeln, Häute, Nerven, Bänder, Gelenke u. s. w. heimsuchen kann, und mit der Grösse der sthenischen Erregung in dem ganzen Körper und seinen Organen im genauen Verhältnisse stehet.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Schwere und Mattigkeit in den Gliedern.
 - 2) Bey dem Ausbruche. Abwechselnd Frost und Hitze, Durst, Unruhe, heftiger, reissender und stechender Schmerz in einem oder dem andern Gliede, welcher bald festsetzend, bald
- wan-

wandernd seyn kann, und auf Bewegung vermehrt wird. Der Puls ist stark, voll, nicht selten hart und häufig; das Athemholen voll, oft schwer. Zuweilen erstreckt sich der Rheumatismus über den ganzen Körper, wo sodann der Kranke im heftigsten Schmerzen, wie ein steifes Holz, im Bette von einer Seite zur andern muß gewälzt werden, wenn er seine Lage verändern will. Die übrigen Verrichtungen des Körpers sind eben so, wie bey dem einfachen Entzündungsfieber affizirt.

- 3) Bey der Zunahme bis zur größten Höhe. Nimmt die Krankheit zu, so entsteht heftige Entzündung, Geschwulst und Röthe auf dem vorzüglich leidenden Theile; es gesellen sich Halsweh, Brustentzündung, Hirnwuth u. f. w. hinzu.
- 4) Bey der Abnahme. Gewöhnlich dauert die Krankheit 8 — 14 Tage, auch oft länger. Endlich wird die Haut feucht, schwitzend, die Heftigkeit des Schmerzes und der übrigen Zufälle läßt nach. Zuweilen stellt sich Diarrhöe, Speichelfluß, Katarrh, schleimiger Ausfluß aus der Nase, Nasenbluten ein, und die Krankheit cessirt.
- 5) Beym Wechsel. Weißer Friesel, hartnäckiger Ausschlag, Bläschen, Gliederreißen, u. f. w.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Außer den bey der Brustentzündung und Hirnwuth erwähnten, erfolgen gewöhnlich Verhärtungen, Knoten, hartnäckige



Geschwülste, Steifigkeit der Gelenke, Vereiterungen, Knochenfraß, hartnäckiges Zahnweh u. s. f.
b) Tödl i c h e. Der gewöhnlichste ist Brand.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Jeder schnelle Uebergang von Kälte in die Wärme, Ost- und Nordwinde, Mißbrauch geistiger Getränke, starker Genuß wohlnährender, gewürzhafter Speisen, heftige Leidenschaften, vorzüglich heftiger und schneller Zorn; zugroße Anstrengung des Körpers, Laufen und Reiten, besonders gegen die Nord- und Ostluft bey erhitztem Körper u. s. w. Alle diese Schädlichkeiten können aber bey jungen, starken, wohlgenährten, so wie bey schwachen Personen, schon bey einer eben nicht sehr beträchtlichen Einwirkung diese Krankheit sehr leicht hervorbringen.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Sthenische Affekzion der Ausdünstungsgefäße, so wie auch der Muskeln der Oberfläche des Körpers. (S. meinen Entwurf §. §. 1765. 1766.

H e i l a n z e i g e.

Entfernung des sthenischen Krampfes gedachter Theile der Haut.

H e i l v e r f a h r e n.

Ist durchaus ganz dasselbe, wie beym einfachen Entzündungsfieber. Gesellen sich Entzündungen besonderer Theile unsers Körpers dazu, dann verfare man nach der ihnen angemessenen Weise. Ist auf diese Art die Heftigkeit bereits gemindert, oder ist sie an sich schon



schon nicht sehr beträchtlich, so Sorge man besonders dafür, daß die Ausdünstung recht in Gang komme. Zu diesem Behufe lasse man den Kranken recht viel trinken, lasse ihn fleißig Nro. II. gebrauchen, halte ihn mäßig warm, lasse ihm einige Tassen Fliederthee trinken, oder sonst gewohnte, schweißtreibende Mittel nehmen, z. B. rohe Heringe oder Sardellen genießen, Flanell auf den bloßen Leib anziehen, und den Schweiß abwarten. Besonders frottire man dann ganz gelinde diejenigen Theile, welche viel gelitten haben.

VIII.

Halsentzündung. Bräune. *Angina.*

D e f i n i z i o n.

Bräune ist eine Pflagmaße, bey welcher der Hals und seine benachbarten Theile entzündet sind, das Schlucken schwer und schmerzhaft, oder das Athemholen sehr erschwert ist.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Alle Zufälle des einfachen Entzündungsfiebers.
- 2) Beym Ausbruche. Frost, Hitze, Durst u. s. w. Hierauf erfolgen Geschwulst, Röthe, Schmerz an dem besonders affizirten Theile des Rachens. Der Kranke kann nur mit Mühe und Schmerzen sprechen, schlucken und Athem holen; seine Sprache ist tiefer, hohler und dumpfer; beständig fließt ihm Speichel aus dem Munde. Zuweilen gesellen sich hiezu Ohrenweh.



weh, Ekel, Röthe der Augen, aufgesperrter Mund, Rauheit des Schlundes, große Menge Schleim im Munde, oder gar keiner, aufgetriebener Kopf, Schläfrigkeit, Irreseyn und Stupidität.

- 3) Bey der Zunahme bis zur größten Höhe. Das Niederschlucken ist beynahe ganz unmöglich; es entstehet allgemeine Schwäche, Brustentzündung, der Kranke besorgt immer zu ersticken, raselt auf der Brust; seine Gesichtsfarbe wird blau, der Puls mangelt beynahe gänzlich.
- 4) Bey der Abnahme. Es stellen sich Schweiß, vermehrter Speichel- und Urinabfönderung, Husten mit Auswurfe ein, und die Heftigkeit der Zufälle mäßiget sich.
- 5) Beym Wechsel. Wie bey der Brustentzündung. Außerdem läßt Geschwulst, Röthe und Brustentzündung plötzlich nach, es stellen sich schlaffüchtige Zufälle und alle die einer herannahenden Erstickung ein: der Athem wird röchelnd und pfeifend u. s. w.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Verhärtung, Knoten, Eiterung, Rothlauf.
- b) Tödliche. Brand der affizirten Theile, Erstickung.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Brustentzündung, Masern, Scharlach, Erkältungen, Synocha, Rheumatismus u. s. w.

An-

A n m e r k u n g.

Oft ist die Bräune eine bloße örtliche Krankheit, ohne einen allgemeinen entzündungsartigen Zustand. Dieses erkennen wir außer der Erforschung der Wirkungsart der einwirkenden Ursache, auch noch daran, daß bey einer bloß örtlichen Bräune der Schmerz, die Geschwulst und Röthe der affizirten Theile, ohne vorhergegangenen Frost und Hitze, eintreten, welche bey der Bräune, als allgemeine Krankheit, immer vorhergehen.

- 1) Bey der Zungenentzündung ist dieselbe stark angeschwollen, das Athemholen und Schlucken beschwerlich, der Speichel häufig.
- 2) Die Entzündung des Zäpchens kann man bey niedergedruckter Zunge leicht sehen. Uebrigens kann Patient leidentlich schlucken und schnaufen.
- 3) Bey der Mandelentzündung sieht man die Geschwulst im Munde, und nimmt sie äußerlich wahr, das Schlucken ist erschwert, das Schnaufen ist es weniger.
- 4) Bey der Luft- und Speiseröhreentzündung ist die Stimme durchdringend, hellklingend, pfeifend, das Athemholen kurz und schmerzhaft mit Bangigkeit, der Mund ist roth und geschwollen, das Niederschlucken höchst schmerzhaft, keine äußere Geschwulst, der Trieb des Blutes gehet gegen den Kopf, das Schnaufen ist nicht sehr schwer. Diese Entzündung ist die gefährlichste, befällt meistens Kinder bis ins zwölfte Jahr, und tödet in zweymal



mal vier und zwanzig Stunden, wenn nicht schnell Hülfe gebraucht wird.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Ein allgemeiner Entzündungszustand, welcher sich auf den im Munde und Schlunde vorhandenen Theilen stärker äußert als anderswo. (S. meinen Entwurf Th. II. §. §. 1119. 1120.

H e i l a n z e i g e.

Depotenzirung mit besonderer Rücksicht auf die einzelnen hervorstechenden Entzündungen.

H e i l v e r f a h r e n.

Hier ist die antisthenische Methode in ihrer ganzen Wirksamkeit angezeigt, vorzüglich bey der Luft- und Speiseröhreentzündung. Ist die Bräune leicht, vielleicht bloßer Erfolg einer Erkältung, welche allein den Hals, gerade da, wo er stark schwitzte, befallen hat, dann sind mässige, äußerliche und innerliche Wärme, Umwickeln des Halses mit Flanell oder Seide, warmes Wasser oder ein Absud von Feigen oft im Munde gehalten und wieder ausgespuckt, Abends vor Schlafengehen ein paar Tassen Fliederthee, oder auch gewöhnlichen Thee, mit einem Löffel Wein zu jeder, und ein lauwarmes Fußbad die besten Mittel.

Ist aber die Halsentzündung sthenischer Natur, und sehr heftig, dann ist ebengedachtes Verfahren, so wie das Einspritzen und Gurgeln nicht allein nicht angezeigt, sondern wenn es, wie es leider oft, ja beynahe meistens geschieht, höchst nachtheilig, und meistens die
ein.

einzig und alleinige Ursache von den Vereiterungen, die nicht selten nach Halsentzündungen zum Vorschein kommen, und manchen unschuldigen Kranken auf eine schändliche Art verstümmeln.

Im Gegentheile schreite man daher bey heftiger Hals - besonders aber Luft - und Speiseröhreentzündung, ohne Verzug zu einem Aderlasse, welches nach Befinden der Umstände und der körperlichen Konstitution des Kranken wiederholt werden kann.

In demjenigen Falle aber, wo wir besorgen müßten, daß eine allgemeine Aderlass den Kranken zu sehr entkräften, und einen fatalen Ausgang der Bräune verursachen würde, oder wenn schnelle örtliche Erleichterung dieses Zufalles erfordert wird, thun wir besser daran, wenn wir, nach Befinden des Alters, der Konstitution u. s. w. des Kranken, 4 bis 12 Blutigel um den Hals legen.

Außerdem, forge man für kühle Temperatur in jeder Hinsicht, lasse den Kranken meist aufrecht sitzen, oder wo möglich, ausser dem Bette herumgehen, oder herumtragen; gebe kühlende Getränke, Feigensaft, lasse fleissig kaltes Wasser in den Mund nehmen, und wieder ausspucken, und verfähre überhaupt ganz, wie bey dem einfachen Entzündungsfieber.

Hat endlich die Entzündung der besonders affizirten Theile mehrere Tage angehalten, fühlt Patient vorzüglich Pulsiren, vermehrte Geschwulst und Unruhe in demselben, so können wir daraus schliessen, daß diese Theile in Eiterung übergehen werden. In diesem Falle lasse man äusserlich warme Umschläge von Malven, Flieder, Chamillen und Seife machen, warme Dämpfe
von




von Milch, oder einen Abfud von Feigen oder Weizenkleien, oder Malven und Fliederblüthen dahin leiten, einige von diesen Getränken trinken, zwischendurch nur in den Mund nehmen, und damit so lange fortfahren, bis sich der Abscess öffnet oder geöffnet werden kann, welches die Sache eines Chirurgen ist.

Betrifft die Entzündung die Luftröhre, so säume man ja nicht lange, sogleich Blutigel um den Hals zu legen, und wenn dadurch einige örtliche Erleichterung bewirkt worden ist, dann lege man sogleich einen zwey Finger breiten Riemen eines Vesikators, oder eben so breite Scheibchen weißer Zaunrüben um den ganzen Hals herum, lasse sie Blasen ziehen, schneide dieselben sodann auf, unterhalte die vesizierte Stelle mit Kraut- oder Kohlblättern einige Tage in Eiterung, und heile sodann langsam durch Auflegen frischer und ungesalzener Butter die Stellen wieder.

Arzneymittel. Wenn durch nöthige Verminderung der Blutmenge, d. i. sowohl durch allgemeine als örtliche Aderlässe, die Heftigkeit der Bräune gehoben oder die Entzündung gemäfsiget worden ist, und Patient etwas niederschlucken kann, dann rathe ich vor allen Dingen, vorzüglich aber im Anfange der Luftröhrenentzündung, dem Kranken ein Brechmittel von Nro. IV. oder V. VI. oder VII., und wenn man hierauf nach zwey Stunden noch keinen merklichen oder erwünschten und nöthigen Nachlaß der Heftigkeit der Zufälle bemerkt, dann noch entweder Nro. XIII. oder Nro. II. brauchen zu lassen, oder dem Kranken nöthigenfalls ein Purgirmittel von Nro. VIII. zu verordnen.

Hält



Hält auch dann noch einigermaßen die Heftigkeit der Zufälle an, so mache man mäßig kühlende Umschläge von Aqua. vegeto mineralis Goulardi, womit man Tücher befeuchtet, um den Hals, und suche endlich wie bey Rheumatismus den Kranken zu reichlichem Schweiß zu bringen.

Ist aber die Halsentzündung vorzüglich örtlich, nicht sthenischer Art, und gelinde, so lasse man öfters von Nro. XXI. ein bis zwey Theelöffel voll in den Hals einreiben.

Sollte aber vielleicht durch Vernachlässigung oder verkehrte Behandlung z. B. durch warme Umschläge, hitzige Behandlung, fleissiges Einspritzen und Gurgeln, die Bräune, welche sehr heftig sthenisch war, in eine brandige oder bösertige umgeschaffen worden seyn, dann verfare man nach jener Methode, die ich weiter unten bey der bösertigen Bräune noch besonders angeben werde.

Nach gehobener Bräune verfare man übrigens, wie bey der Synocha.

IX.

Rothlauf, *Erysipelas*.

Definition.

Rothlauf ist eine Entzündungsröthe der Haut, welche alle Theile der Oberfläche des Körpers einnehmen kann, die Haut ein wenig erhebet, keine regelmässigen Gränzen hat, in Form einer Landkarte fortkriechet, mehr Lucken und Brennen als heftige Schmerzen verursacht, deren Farbe zuweilen vom Rothen ins Weisse, oft ins Gelbe, und manchmal ins Schwarze fällt, und deren



deren Röthe beym Eindrücken eines Fingers verschwindet, eine weisse Spur zurückläßt, die aber bey nachgelassenem Drucke wieder ihre vorige Röthe und ihren ersten Glanz erhält.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Es läuft dem Kranken eine Gänsehaut auf, der Kopf ist sehr eingenommen u. s. w. wie beym Entzündungsfieber.
- 2) Beym Ausbruche erscheinen abwechselnde Frost und Hitze, besonders im Gesichte. Hiermit verbinden sich Kopfschmerz, Schwere in allen Gliedern, völlige Zerschlagenheit, Bangigkeit, Unruhe, Uebelkeit, Erbrechen, Irreseyn. Bey Kindern stellen sich Schlaßsucht und Konvulsionen ein. Den dritten oder vierten Tag darauf erscheint eine flache, weiche, breite, blasse, ins Gelbe spielende, glänzende Röthe mit etwas Geschwulst, die beym Drucke mit dem Finger ihre Röthe verliert, und nach aufgehobenem Drucke gleich wieder zum Vorschein kommt. Sie ist verbunden mit einem Spannen, Brennen, Jucken, und manchmal auch heftigen Schmerzen. Der Ausschlag selbst ist sehr flüchtig, und verändert leicht seine Stelle. Sobald der Ausschlag ausgebrochen ist, lassen vorgedachte Zufälle nach.
- 3) Bey der Zunahme bis zur grössten Höhe. Der Puls wird härter, voller, stärker und häufiger; die Entzündung wird hochroth, mit umschriebenen harten Geschwulsten und heftigen

tigen klopfenden Schmerzen. Die vorausgegangenen Zufälle wollen sich auch nach dem Ausbruche der Rose nicht im geringsten mindern. Bey manchen entstehen Knoten und einiger Schmerz in den Drüsen. Zuweilen kommen Bläschen, zuweilen Geschwürchen, oder die sogenannte Blatterrose hinzu. Greifet die Heftigkeit des Rothlaufes weiter um sich, und nimmt sie vielleicht gar noch den Kopf ein, dann entstehet Raserey, Schlaflosigkeit u. s. w.

- 4) Bey der Abnahme. Der Ausschlag dauert gewöhnlich vier, oft aber auch zwölf Tage, sodann endiget er sich durch Abschuppung der Haut. Zuweilen bleibt auch nachher eine blasse Geschwulst zurück; allein sie verschwindet, sobald Schweiß, vermehrte Urin- und Darmabsonderung zum Vorschein kommen. Und damit nehmen die erwähnten Zufälle ab.
- 5) Beym Wechsel. Die Farbe des Ausschlages wird schwarz und brandfärbig; der Brand kriecht schnell weiter, es entstehen Brandblasen, deren eine auf die andere folgt, mit ausfließender häufiger Jauche. Patient athmet schwerer, spricht irre u. s. w.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Vereiterung einzelner Stellen der Haut; Verhärtung einzelner Theile derselben sowohl, als ganzer Glieder; Fußgeschwülste, Hautwasserfucht, Brustwasserfucht, Wahnsinn.
- b) Tödliche. Gallopirende Schwindfucht, brandige Rose, Schlagflüsse, Erstickung.

Schäd.



S c h ä d l i c h k e i t e n .

Reiz der Wärme nach vorhergegangener Kälte, heftige Gemüthsbewegungen, z. B. heftiger Zorn, Bräune, Rheumatismus, und mehrere andere inzitirende Potenzen, vorzüglich mancherley krankhafte Erregungen des Nervensystems.

H e i l u n g s k a r a k t e r .

Ein allgemeiner Entzündungszustand des Körpers mit Pyrexie, welcher aber vorzüglich in den lymphatischen und aushauchenden Gefäßen, und dem Zellgewebe unter der Haut vorzüglich wüthet, und gedachte Form von Uebelfeyn bewirkt.

H e i l a n z e i g e .

Beseitigung der Pyrexie mit besonderer Rücksicht auf die Art der lokal verstärkten Affektion der Haut, besonders auf die Verlaufsgeschichte dieser Krankheitsform.

H e i l v e r f ä h r e n .

Bleibt dasselbe, wie bey dem Entzündungsfieber und bey den schon erwähnten Hautauschlägen, sobald wir aus der Untersuchung der Schädlichkeiten, welche sie bewirkt haben, überzeugt sind, daß die Rose wirklich sthenischer Natur ist.

Ist die Rose leicht, die Pyrexie nicht beträchtlich, und fängt der Kranke selbst schon an, Schweißse zu bekommen, oder ist die Rose asthenisch, z. B. nach lange dauerndem Kummer, oder aus Ursache einer feuchten Wohnung, oder aus Erkältung einzelner Theile ohne gleich darauf folgende Wärme entstanden, dann ist äußerliche Wärme, und innerlich einige Tassen Thee, so wie

wie auch gelind schweißtreibende Mittel, z. B. rohe Heringe, Sardellen genossen, ein - oder zweymal des Tags eine Messerspitze voll Ingwerthee mit einer Tasse siedenden Wasser übergebrühet, eine Zeitlang ziehen lassen, und lauwarm das Wasser davon abgetrunken, vorzüglich wirksam.

Sobald aber das Rothlauf sehr heftig ist, dann meide man äußerlich alles, was nur potenziren kann, wasche den Körper abwechselnd mit kaltem Wasser oder Schnee, streue zwischendurch auch kaltes weißes Mehl auf die affizirte Stelle, so lange, bis die Zufälle minder heftig werden und Schweiß sich meldet. Nur hüte man sich bey dem Gebrauch des kalten Wassers, den Patienten wieder aufs neue einer Hitze auszusetzen.

Sollte etwa die Rose das Gesicht oder überhaupt den Kopf befallen haben, Patient stark über heftigen Kopfschmerz klagen, irre seyn u. s. w. so lege man einige Blutigel an beyde Schläfe, ein Vesikator zwischen beyden Schulterblättern, welches man einige Tage eitern läßt, halte den Kranken kühl, reiche ihm kühlende Getränke u. s. w. wie bey dem Entzündungsfieber, und sorge für Beförderung des Schweißes.

Wird die Rose wasserschwülstig, so kann man äußerlich 3 Loth Hanfsamen, 2 Loth Roggenmehl, 1 Loth Chamillen und eben so viel Fliederblüthen, gepülvert in Säckchen genähet und erwärmt auf den wasserschwülstigen Theil legen. Auch reicht Bohnenmehl allein schon hierzu.

Arzneymittel. Meistens weicht die Rose schon erstgedachter Methode. Allein manchmal ist sie mit heftigen Zufällen, und einer starken Entzündung eines oder



oder des andern Theiles verbunden. In diesem Falle ist es rathsam, etwa sechs bis acht Unzen Blut wegzunehmen, oder in der Nähe des vorzüglich leidenden Theiles einige Blutigel anzulegen.

Uebrigens aber leistet mehrentheils der fleissige Gebrauch von Nro. II. widrigenfalls aber ein Brechmittel von Nro. IV. V. oder VI. oder nach Befinden der Umstände noch besser die Anwendung von Nro. IX. oder VIII. nicht nur eben soviel als ein Aderlaß, sondern oft noch mehr.

Indessen kann es geschehen, daß die Krankheit im Allgemeinen zwar gehoben ist, dennoch aber hin und wieder Spuren dieses Auschlages sich wieder vorfinden, verbunden mit einer Disposition zu demselben, so daß bey der ersten besten Gelegenheit derselbe wieder zum Vorschein kommt, bald wieder verschwindet u. s. f. und mancherley fatale Wirkungen in Bezug auf die Hautfunktion (S. meinen Entwurf Th. II.) zurückläßt, Abmagerung u. s. w. bewirkt.

In diesem Falle und eben darum muß man für gehörige Kultur der Haut mittelst lauwarmer aromatischer oder alkalischer oder Schwefelbäder, fleissige Bewegung des Körpers besonders im Freyen, wenn es die Witterung erlaubt, leicht verdauliche, aromatische und besonders animalische Nahrungsmittel, leicht verdauliche bittere Biere, Weine etc. sorgen, zwischendurch besonders in der Rekonvaleszenz des Kranken täglich vier bis sechs Tassen Wachholderbeerenthee, jede mit 20 Tropfen Vinum antimonii Huxhami trinken, und Abends beym Schlafengehen einige Tage nacheinander ein ganzes Pulver von Nro. XXII. nehmen, am besten in Chamillenthee.

Uebrigens wie bey der Rekonvaleszenz des Entzündungsfiebers.

X.

Katarrh. *Catarrhus*.

D e f i n i z i o n.

Katarrh ist ein Fieber mit Husten, Heiserkeit, und anfangs unterdrücktem, nach und nach aber immer stärker vermehrtem Schleimausflusse aus der Nase, dem Schlunde und der Luftröhre.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Heiserkeit, trockener Mund, Drücken in der Stirne, abwechselnd gelinder Schauer über den ganzen Körper. Jucken in der Nase, Kitzeln im Halse, Geruch und Geschmack sind vermindert, zuweilen etwas Hüfteln.
- 2) Bey dem Ausbruche. Abwechselnder Frost und Hitze, welche letztere endlich beständig anhält, Durst, vermehrtes Kopfweh, Müdigkeit, beklommener Athem, Lenden- und Gliederschmerz, Verschlimmerung aller dieser Zufälle gegen Abend mit etwas geschwindem und oft starkem Pulse und unruhigem Schläfe. Hierzu gesellen sich thränende Augen, brennende Stirn, trockene oder fließende Nase mit Niesen, vermehrter Speichel im Munde, Trockenheit mit Heiserkeit, Husten und einigem Schmerzen auf der Brust.
- 3) Bey der Zunahme bis zur größten Höhe. Ganz wie bey der Brustentzündung und Hirnwuth.



4. Bey der Abnahme. Der anfänglich trockene Husten wird feucht, mit dickem, gelbem und erleichterndem Auswurfe; hiezu kommt Schweiß und vermehrte Urinabsonderung.

4) Beym Wechsel. S. Brustentzündung und Hirnwuth.

A u s g ä n g e.

a) Krankhafte. Brustentzündung, Bluthusten, Hirnwuth, asthenischer oder langwieriger Katarh, Lungenfucht.

b) Tödliche. S. Brustentzündung u. Hirnwuth.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Alle Inzitant verstärkende Potenzen, z. B. Wärme, hitzige Getränke, heftige Anstrengung des Körpers, z. B. Laufen, Singen, lautes Schreyen, Predigen; meistens aber der Reiz der Hitze, welche nach vorhergegangener Kälte schnell unsern Körper traf, wie z. B. im Sommer bey schneller Abwechslung der Kälte und Hitze dieses sehr oft der Fall ist.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Krampfhaft konvulsivische Bewegung der Lunge, in diesem Falle aus sthenischer Affektion entstanden, (S. meinen Entwurf Th. II. S. 1090.)

H e i l a n z e i g e.

Depotenzirung der Irritabilität zunächst ihres Antheils an der Konstruktion der Lungen mit vorzüglicher Berücksichtigung der konvulsivischen Affektion derselben.

Heil-



Heilverfahren.

Ganz dasselbe, wie bey der Synocha und Brustentzündung. Vorzüglich meide man sogleich alles Erhizende, genieße keine Fleischnahrung noch Wein, halte sich kühl, begnüge sich mit kühlenden Getränken, und wasche sich einigemal des Tages die Brust mit kaltem Wasser, jedoch mit der Vorsicht, daß wir uns nachher vor Wärme bewahren.

Nur dann, wenn die Heftigkeit der Krankheit so zunehmen sollte, daß Brustentzündung zu besorgen wäre, lasse man zur Ader, und verfare, wie dorten angegeben worden ist.

Sobald die Heftigkeit der Krankheit gebrochen ist, und häufiger, dicker und etwa noch etwas zäher Schleimaustritt zum Vorschein kommt, oder Schweiß sich einstellen, werden Dämpfe von warmer Milch oder Wasser, warme Getränke, und Waschen des ganzen Körpers mit lauwarmem Wasser, und endlich wieder Fleisch und Wein mit Nutzen, so wie die bey der Brustentzündung (S. Arzneymittel e.) angegebene Behandlungsart, angewendet. Um den Schnupfen zu erleichtern, ziehe man einigemal des Tages den ausgepressten Saft von weißen Rüben in die Nase.

Arzneymittel. Ist der Katarrh sthenischer Beschaffenheit, und heftig, dann empfehle ich vorzüglich den Gebrauch von Nro. XI. in einer halben Tasse eines Gerstenabfuds, oder von Nro. XIII.

Ist er aber von geringerer Heftigkeit; greife man nach Nro. II. bey Kindern nach Nro. III. Ist die Sthenie vorüber, aber die Brust noch nicht ganz frey, dann Sorge man für Bäder, und lasse vor Schlafengehen dem Kranken




ein Pulver von Nro. XXII. mit Fliederthee nehmen, und es werden keine Nachwehen, wie gewöhnlich, zurückbleiben.

Zuweilen aber bleibt einige Zeit nach gehobener Sthenie, theils weil man vielleicht zuviel geschwächt hat, theils aus ähnlichen Ursachen, noch ein Reizhusten übrig; man achte denselben ja nicht gering, sondern reibe nach Befinden der Umstände d. h. wenn das kranke Individuum irritabler Konstitution, oder die Krankheit selbst dieser Art ist, von Nro. XXI. fleissig in die Brust, besonders zwischen den Schulterblättern ein, und lasse den Tag über von Nro. XXIII. brauchen, vor Schlaffengehen aber ein Pulver von Nro. XXII. mit Chamillenthee nehmen. Ist aber das kranke Individuum ein sensibler, oder hat der Husten eine gewisse Hartnäckigkeit erlangt, u. s. w. dann reibe man fleissig von Nro. XIV. oder XV. in die Brust ein, lasse den Tag über Baldrianthee trinken, am Abende nebst einem Senf-Fussbade von Nro. XVI. ein ganzes, Morgens aber ein halbes Pulver nehmen, und am besten den Gebrauch von ganzen Bädern damit verbinden.

A n m e r k u n g.

Endlich muß ich noch die Erinnerung beyfügen, daß die gewöhnliche Methode, bey jedem Katarrh sogleich und geradezu erhitzen Mittel anzuwenden, um Schweiß dadurch zu befördern, meistens die einzige Ursache so vieler langwieriger, oft Jahre und lebenslanglich dauernden Husten und Schwindfuchten sey. Aus diesem Grunde warne ich daher, ja genau vorerst die erregenden Ursachen jedes Katarrhs aufzusuchen, und darnach erst die Beschaffenheit des Katarrhs genau zu bestimmen, bevor wir zu irgend einer Methode schreiten.



XI.

Trunkenheit. *Ebrietas.*

D e f i n i z i o n.

Trunkenheit ist eine vorübergehende Pyrexie, die meistens nur einige Stunden, oder höchstens einen Tag oder eine Nacht andauert, und wo unter den angenehmen und immer mehr und mehr zunehmenden Empfindungen von Vergnügen nach und nach die Ausübung des Willens immer mehr und mehr gelähmt wird, während die vom Willen unabhängigen Leidenschaften lebhafter gefühlt werden, und mit weniger Zurückhaltung sich äußern.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Angenehme Empfindungen durch den ganzen Körper, verbunden mit Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Heiterkeit, Frohsinn und Freude.
- 2) Beym Ausbruche. Die Haut und vorzüglich das Gesicht glühet, die Augen funkeln, bewegen sich schwer um ihre Axe, sehen alles um sich her bewegen, oder doppelt, oder undeutlich; alle Akzionen des Lebens gehen mit vermehrter Stärke vor sich, die Einbildungskraft wird feurig, der Muth ausnehmend groß, die Muskelkraft sehr verstärkt u. s. w.
- 3) Bey der Zunahme bis zur größten Höhe. Der Körper verliert das Gleichgewicht, es stellet sich Kopfdücken, Schwindel ein; alles Verlangen hört auf, die Ausübung des Willens
ist



ist größtentheils gelähmt, es erfolgt unwillkührlicher Urinabgang, Straucheln, Stottern, Schläfrigkeit; die vom Willen unabhängigen Leidenschaften werden lebhafter gefühlt und mit weniger Zurückhaltung geäußert; daher bemerkt man bey manchem Betrunknen in diesem Zustande schmachtende Liebe, abergläubische Furcht, dumme Thränen bey dem Andenken des unbedeutendsten Unglückes vergossen. Oft gesellen sich noch Entzündungen einzelner Organe unseres Körpers hinzu. Endlich folgt völlige Vergessenheit und Bewusstlosigkeit, Stumpfsinn, andauernder Schwindel, der auch im Bette und im Finstern sich lange nicht verlieret, und ein bey nahe unerwecklicher Schlaf u. s. w.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Brust - Darm - und Leberentzündung, Gelbfucht, Gallensteine, rheumatische Gicht, Lähmungen, Wassersucht, Epilepsie, Magenbeschwerden, u. s. w.
- b) Tödliche. Schlagfluß und alle tödliche Ausgänge der gedachten krankhaften Ausgänge der Trunkenheit.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Alle erhitzende und geistige Getränke, vorzüglich bey solchen Subjekten, welche an dieselben noch nicht gewöhnt sind.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Innormale Erhöhung der Irritabilität, besonders des Blutgefäß-Systems bey gleichmäßiger Herabstimmung der Sensibilität.

Heil.



H e i l a n z e i g e .

Depotenzirung der Irritabilität vorzüglich des Blutgefäß-Systems.

H e i l v e r f a h r e n .

Meistens ist die Trunkenheit eine schnell vorübergehende Pyrexie, die sich nach gehöriger Ruhe des Körpers, und Abkühlung desselben von selbst verliert.

Zuweilen aber ist sie heftig in ihren Anfällen und verlangt schnelle Hülfsleistung, wenn sie nicht nachtheilige, oft schwer heilbare Folgen zurücklassen, oder vielleicht auch manchmal die Reputation manches honetten Mannes fährden soll. In dergleichen Fällen hilft man am schnellsten und besten auf folgende Art:

- a) Man löse schnell die Kleider des Betrunkenen, halte ihn außer dem Bette auf einem Stuhle oder Kanapee, lege ihn aber so, daß der Kopf hoch liegt und die Beine niederhängen, und kühl stehen.
- b) Sorge man für kühle Luft um ihn her.
- c) Gebe man ihm Weinessig, mit etwas kaltem Wasser vermischt, fleißig zu trinken.
- d) Eben damit wasche man ihm den Kopf und die Arme, und halte ihm fleißig Weinessig unter die Nase.
- e) Lege man ihm Servietten in kaltes Wasser getaucht auf den Kopf.
- f) Zwischen die Schenkel an den Leib lege man leinene Tücher in kaltes Wasser und Essig getaucht.
- g) Man gebe ihm Klystire von Molken, und im heftigern Falle von kaltem Wasser.

h)



h) Bey vorkommenden Entzündungen eines oder des andern Organs unseres Körpers verfähre man auf die angemessene Art.

i) Sind aber keine derselben vorhanden, und die Betrunkenheit bis zur völligen Bewusstlosigkeit und Betäubung gestiegen, dann wirkt ein Brechmittel am schnellsten.

Zuweilen aber macht diese Sthenie schnell ihren Verlauf. Es erfolgt nämlich auf die Munterkeit schnelle und starke Abspannung aller Funkzion verbunden mit einer Anwandlung von Hypochondrie oder Melancholie — Hypersthenie, welche endlich sich in fürchterlichen Konvulsionen, totaler Raserey u. s. w. auflöst — Hyperasthenie. Dieses letztere geschieht feltner bey einer Betrunkenheit durch Wein bewirkt, wenn nicht dasselbe Subjekt dessen nicht gewöhnt ist, oder zuviel getrunken hat u. s. w. als bey übermäßigem Genuße von mehr flüchtig geistigen Getränken, z. B. starken Punsch, Liqueurs etc.

Hier kommt es vorzüglich darauf an, den Karakter des Kranken zu kennen. Gewöhnlich nämlich ist die Hyperasthenie dieser Art irritabler Beschaffenheit; daher dann etwa 6 Gran Sal. volatile C. C. Sal. alcali volatile öfters wiederholt, zwischendurch Chamillenthee trinken zu lassen, die Nüchternheit wieder herstellen. Ist aber das kranke Subjekt sensibler Art, so nimmt auch die Hyperasthenie diesen Karakter an, daher dann 3 bis 4 Gran Camphor, gleichfalls mit Chamillenthee, die Trunkenheit bald heben u. s. w.



Zwey-


Zweyter Abschnitt.

Asthenische Krankheiten.

Was wir überhaupt unter Asthenie zu verstehen haben, welches die Gattungen und Arten derselben seyen, so wie auch endlich welches die den letzten angemessenen individuellen Behandlungsarten seyen, haben wir schon im ersten Theile auseinander zu setzen gesucht; und bemerken daher in Betreff des individuellen Heilverfahrens bey vorkommenden asthenischen Krankheitsfällen überhaupt nur noch folgendes.

- 1) Die nachstehenden Krankheitsformen zunächst äußern sich nicht selten in einem oder dem andern Systeme, welchen sie dennoch selbst ursprünglich nicht angehören, sondern nur selbst Folgewirkungen der krankhaften Affektion einer andern organischen Funkzion oder deren Systemes sind. Darum wird es überhaupt genommen hoffentlich begreiflich seyn, wenn und warum wir behaupten, daß in dergleichen Fällen unser Heilverfahren im Allgemeinen der Qualität der ursprünglich affizirten urfachlichen Funkzion gemäß eingerichtet werden müsse, wenn die vorhandene Krankheit selbst gründlich gehoben und die ihr entsprechende Form vollkommen beseitigt werden soll.

In-



Indessen wird es unsere Einsicht in den qualitativen Charakter jeder Krankheit, so wie die Auffindung der ihr entsprechenden individuellen Behandlungsart sehr erleichtern, wenn wir nach Anleitung meines Entwurfes Th. II. erwägen, daß das Leben, als solches in seiner wirklichen Regsamkeit betrachtet, sich überhaupt nur um die Differenz der beyden ursprünglichen organischen Funkzionen, nämlich der Sensibilität und Irritabilität sich drehe, und obgleich der Organismus seine Objektivität erst in - und vermittelt der Reproduktion erhält, letztere selbst demohugeachtet weiter nichts anderes als der unmittelbare Ausdruck der Indifferenz der organischen Differenz sey, folglich in dem reproduktiven Systeme nur die Synthesis der Sensibilität und Irritabilität liege, obgleich beyde Funkzionen in diesem Systeme nur mit dem Charakter der Indifferenz erscheinen. Was demnach in der höhern Konstrukzion des Organismus als sensibles System sich darstellt, erscheint in dem reproduktiven Systeme unter der Form der Verdauungs - und Assimilations - Organe, während dem das irritable System in dem reproduktiven unter der Form der eigentlichen Sekretions - Organe erscheinen.

Das Verdauungs - und Assimilations - System ist also gleich dem sensiblen, nur dem Grade der Differenz nach, von einander verschieden; das Sekretions - System dagegen gleich dem irritablen nur von einander verschieden wie Subjektivität und Objektivität.

Eben




Eben darum aber auch wird man nunmehr begreifen können, warum wir behaupten, daß, überhaupt genommen, alle asthenische Krankheiten des Verdauungs- und Assimilations-Systems nach der Qualität der Affektion des sensiblen d. h. mit kohlenstoffhaltigen, nur mit den indifferentesten dieser Klasse von Mitteln, die asthenischen Krankheiten der Sekretion nur nach der Qualität der Irritabilität, d. h. mit stickstoffhaltigen Mitteln, wiewohl nur mit den indifferentesten derselben, S. erster Theil §. 167. behandelt werden müssen.

2) Bey alledem aber muß dennoch bemerkt werden:

a) Alle asthenische Krankheiten der Reproduktion legen überhaupt den Karakter ihrer Indifferenz ab, sobald sie in den zweyten Grad der reinen Asthenie übergehen.

b) Die asthenischen Affektionen des sensiblen und irritablen Systems behalten ihren individuellen qualitativen Karakter bis zum Ausgange des zweyten Grades der Hyperasthenie bey, und erfordern darum gerade bis dahin ihre gegenseitig qualitativ verschiedene positive Reize; nur

c) wenn das kranke Subjekt, obgleich ursprünglich von einer irritablen Asthenie befallen, sensibler Konstitution ist, vertauscht die ursprünglich irritabile Asthenie ihren Karakter mit den sensiblen, sobald sie in den zweyten Grad der Hyperasthenie übergeht, in welchem Falle dann dieselbe Krankheit nunmehr nicht nur gleich dem zweyten Grade der Hyperasthenie, sondern zunächst auch nach der Qualität der Sensibilität, d.



d. h. mit kohlenstoffhaltigen Mitteln behandelt werden muß.

Dieses vorausgeschickt, werden wir nun eine der wichtigsten und schnell tödlichen, oder in ihren nachherigen Folgen schwer heilbaren asthenischen Krankheiten ganz nach dem bey den sthenischen befolgten Plane abhandeln, die Zeitpunkte, welche schnelle Hülffleistung erfordern, und die dann angezeigte Heilart nach den bewußten drey Rücksichten bestimmen. Nur wird es nicht immer bey jeder der nachstehenden Krankheiten möglich seyn, den Verlauf derselben nach der bey den sthenischen gehabten Ordnung zu detailliren, indem viele davon schon auf dem Wege begriffen sind, ihren Verlauf gänzlich zu endigen, andere hingegen nicht lange nach ihrer Erscheinung Todesgefahr drohen. Indessen werde ich bey denen Krankheiten, welche erst gewisse Zeiträume durchlaufen, ehe sie zum Tode führen, ihren gänzlichen Verlauf, so wie bey den sthenischen, angeben.

Erste Abtheilung.

Allgemeine asthenische Krankheiten.

XII.

Bösartige Blattern. Variolae malignae.

Definition.

Unter bösartige Blattern begreifen wir diejenigen Arten von Pocken, welche zusammenfließen, eine allgemeine Borke bilden, von schwarzer Farbe und blutig, blos mit einer wässerigen Feuchtigkeit angefüllt sind,
nicht



nicht eitern, sondern mit Brandblasen endigen, warzenförmige Gestalt und blaue Flecken mit unter sich zerstreuet haben.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Eintritte der Bösartigkeit. Der Ausbruch der Blattern erscheint zu Fröh und macht seinen Verlauf sehr schnell oder unordentlich; oder die Blattern erscheinen meistens sehr klein, fließen zusammen, und zwischen ihnen kommen blaue Flecken hervor; oder sie behalten eine Vertiefung in ihrer Mitte, steigen nicht in die Höhe, die Geschwulst ist äußerst beträchtlich.
- 2) Im Zeitraume der größten Bösartigkeit selbst. Häufiger, kolliquativer oder blutiger Stuhlgang; blutiger Urin; schwerer Athem, trockener Husten, beständiges Irreseyn, Epilepsie, starker Speichelfluß, welcher oft schnell aufhört; plötzliches Einfallen des Geschwulstes, des Gesichtes, heftiges Halsweh, schmerzhaftes Niederschlucken, völlige Zerschlagenheit in allen Gliedern, schwacher und langsamer, oder äußerst schneller Puls, Zittern, schnelle Abmagerung des Körpers.

A u s g ä n g e.

Brand einzelner Stellen der Haut, welcher schnell um sich greifet, Steckfluß, Schlagfluß,

Schäd.



S c h ä d l i c h k e i t e n .

Positive Behandlung der Blattern in jedem ihrer Zeiträume, z. B. sehr warmes Verhalten, Genuß von Wein oder sogenannten treibenden Mitteln bey sthenischen Blattern. Ferner: Vernachlässigung der Blattern, welche sich selbst überlassen blieben, und in ihrer Heftigkeit nicht durch wirkfame Schwächungsmittel gemäßigt wurden. Böartige, d. h. die Sensibilität schnell und stark innerlich potenzirende Eigenschaft des Pockengiftes. Sthenische Anlage, welche der Blatteransteckung vorhergieng. Daher dann schneller Verlauf der Sthenie durch Hypersthenie, und dadurch schnell bewirkter Uebergang derselben in Hyperasthenie.

H e i l u n g s k a r a k t e r .

Allzugroße absolute Potenzirung der Sensibilität bey gleichmäßiger relativen Depotenzirung derselben.

H e i l a n z e i g e .

Verminderung der absoluten Potenzirung der Sensibilität durch Anwendung positiver Reize.

H e i l v e r f a h r e n .

Diesen Zweck vollkommen zu erreichen, vermag keine kühlende und schwächende Behandlung; sondern wir müssen im Gegentheile solche durchdringende Erregungsmittel, und diese selbst in einer solchen Quantität und auf einmal anwenden, als bey dem gegenwärtigen Grade der Hyperasthenie erfordert wird, um das demselben gemäß verstärkte Wirkungsvermögen in gehörig starke Erregung zu setzen.

In-

Indessen wenn nach angewendeter Methode einige oder alle gedachten Zufälle von ihrer Heftigkeit auch nur einigermaßen nachlassen, so können wir doch daraus den Schluss ziehen, daß die Stärke der angewendeten Mittel dem daseyenden Grade der indirekten Schwäche gehörig anpassend sey. Gesetzt aber, wir hätten das gehörige Maass der nöthigen Heilmittel getroffen, so dürfen wir ja nicht mit der Menge und Stärke derselben in dem nämlichen Grade fernerhin fortfahren, sondern wir müssen vielmehr allmählig, so wie die Heftigkeit der Zufälle sich verringert, in demselben Verhältnisse die Menge und Stärke der Mittel immer mehr und mehr einschränken und vermindern, bis wir den mittelmäßigen Grad der Erregung, d. h. Gesundheit, wieder hergestellt haben.

Die angezeigten Mittel für die gedachten böartigen Blattern sind folgende:

I. Diät. Warmes Verhalten, Entfernung aller unangenehmen Eindrücke, helles Zimmer, Fleischnahrung und geistige Getränke, vorzüglich aber erstere nur in flüssiger Gestalt, und unter dieser ist kräftige Fleischbrühe mit Eigelb und Kalbfleisch Gelée, mit Zucker, Zimmt und Wein bereitet, das Beste.

II. Hausmittel. Ihre Anwendung richte sich nach folgenden Umständen:

1) wenn sich die Blattern nicht heben, füllen und eiten wollen, so thue man folgendes:

a) Reiche man aller Stunden zwey Theelöffel bis zwey Eßlöffel voll Wein dem Blatterkranken.

b)



- b) Setze man ihn in ein lauwarmes Fußbad, womit zwey Eßlöffel voll gestossene Senfkörner abgekocht waren.
 - c) Wasche man den ganzen Leib mit dem Kopfe, besonders aber das Rückgrat, mit lauwarmem Weine oder Brantweine, womit man auch öfters Einreibungen in die Herzgrube machen muß.
 - d) Beständig halte man warme Umschläge von Habergrütze, Chamillen, Lavendel und Pfeffermünze um die Fußsohlen; am besten aber ist es, wenn man erst vorher durch geriebenen Meerrettig, oder einige Stückgen weißer Zauberrüben, oder durch Sauerteig und Essig die Fußsohlen hat roth, aber nicht bis zu Blasen ziehen lassen.
 - e) Ganze Milch - noch besser aber Bäder von Chamillen, Lavendel, Graue - oder Pfeffermünze mit etwas Wein sind hier vorzüglich wirksam.
- 2) Wenn der Speichelfluß gar zu heftig, der Speichel selbst scharf und der Rachen wund ist, so lege man ein Vesikator in den Nacken, lasse die vesizierte Stelle einige Zeit eiten, trinke Salbeythee, und spüle fleißig damit den Mund aus.
- 3) Hört aber der Speichelfluß plötzlich auf, ist der Athem und das Schlucken gehindert, so täume man nicht lange, eines von den bekannten Blasenziehenden Mitteln um den Hals zu legen, und so lange liegen zu lassen, bis dadurch die Haut dieser Stellen roth geworden ist. Nachher lege



man warme Umschläge von Chamillen, Malven- und Fliederthee mit Milch und Semmelkrumen abgekocht darüber, und gurgelte sich gleichfalls mit einem Abfud von diesen Kräutern, mit Meerzwiebeln vermischt, fleißig, oder mache außerdem Einspritzungen davon.

4) Setzet sich der Geschwulst im Gesichte oder Arme u. s. w. plötzlich, wobey man die Zufälle sich alle noch verstärken sieht, so lege man gleichfalls ein vesizirendes Mittel in den Nacken oder auf die Oberarme, halte das Gesicht warm, mache warme Umschläge von Leinsaamen, weißen Rüben und etwas Senfpulver in Milch abgekocht um die Arme, und fahre dabey mit den unter Nro. I. anempfohlenen Mitteln anhaltend fort.

5) Brandige, blaue, schwarze und andere bösertige Blattern besprenge man mitunter mit Branntwein.

III. Arzneymittel.

Außer den Erwähnten können wir uns noch folgender Arzneykörper mit vorzüglichem Nutzen bedienen.

1) In dem ersten Falle (S. Hausmittel I.) reibe man überhaupt genommen von Nro. XXI. öfters in die Herzgrube und Rückgrad ein, und lasse von Nro. XVIII. einnehmen, in der Zwischenzeit fleißig Chamillen- oder Pfeffermünzthee trinken, und zwischendurch Klystire von Chamillen und Baldrian mit einigen Tropfen Oleum Cajeput in Naphtha aufgelöst, beybringen.



Ist dagegen das kranke Subjekt ein sensibles, dann empfehle ich besonders Einreibung von Nro. XIV. in die Schläfe, von Nro. XV. in die Herzgrube und in das Rückgrad, und innerlich den Gebrauch von Nro. XXIV.

2) Im zweyten Falle. Bey erstangegebenem Verfahren ist dieser Fall nicht möglich; allein sollten wir einen Kranken gerade in diesem Stadium erst zu behandeln bekommen, so wende man nur die so eben angegebene Behandlung an, nur in kleinern Dosen, aber auch in kleinern Zwischenräumen, weil, wenn nicht der Fall hyperasthenischer Art und zwar von drittem Grade ist, die Zufälle als vom dritten Grade der reinen Asthenie erzeugt angesehen und darnach behandelt werden müssen.

3) Im dritten Falle, welcher beweist, daß die Krankheit aus der reinen Asthenie in den ersten Grad der Hyperasthenie übergegangen sey, verfare man auf folgende Art:

a) Der ursprünglichen Qualität der Krankheit gemäß lasse ersten von Nro. XXI. fleissig in den Hals einreiben, Senffussbäder brauchen u. s. w. und von Nro. XXV. aller halben Stunden nach Befinden des Alters, der Konstitution etwa 2 Tassen voll nehmen.

b) Ist das kranke Subjekt aber sensibler Art, dann rathe ich zu den Einreibungen an gedachte Stellen von Nro. XIV. oder XV. und zu der Mischung von Nro. XXVI. einem Erwachsenen etwa zu 40, 60 bis 100 Tropfen davon nehmen zu lassen.



Am zweckmässigsten würde man hiermit noch für a) Bäder von gestossenem Senf, oder Seife, oder von einer Auflösung von Lapis causticus, für b) aber von aromatischen Kräutern, von Wein, Brantwein u. s. w. verbinden.

4) Im vierten Falle verfare man auf ähnliche Weise, oder wenn man gedachte Behandlung schon angewendet haben, und dennoch dieser Zufall sich noch ereignen sollte, dann sehe man es als Beweis an, daß die Krankheit zu einem höhern Grade von Hyperasthenie gestiegen sey, und darum die Stärke der Methode demselben nicht adäquat sey. Daher kann man zwar bey dieser Behandlung bleiben, nur muß man dann die Gabe derselben noch mehr verstärken.

5) Im fünften Falle. Dem dritten Grade der Hyperasthenie lasse außer Bädern, und den andern vorhergehenden ähnlichen Mitteln von Nro. XXVII. halbstündig einen Eßlöffel voll nehmen, und betupfe nebenbey die Blattern mit Nro. XIV., oder man löse eine bis zwey Unzen Kampfer in hinlänglichem Eigelbe auf, und bestreiche die Blattern, wenn sie zusammengefloßen sind, aller drey bis vier Stunden damit, oder bestreiche ein flannelenes Tuch mit Kampfer, und wickle den Kranken ganz entkleidet in dasselbe ein.

Bey der Abnahme letzteres Zufalles, so wie überhaupt bey der Rekonstrukzion dieser Krankheit vom letzten Grade an gehe man von der Behandlung 5. zu 4. u. s. w, bis zu 1. etc. rückwärts über.



Was endlich die dabey sich einstellenden Blutflüsse, Erbrechen, Diarrhöe etc. betrifft, verfare man nach den späterhin angegebenen Regeln.

XIII.

Brandige Bräune. *Angina gangraenosa.*

D e f i n i z i o n.

Brandige Bräune ist ein heftiges Fieber, verbunden mit Ausschlag auf der Haut und Entzündung des Schlundes, welche mit Röthe, Geschwulst und schleimigen weissen oder endlich schwarzen Schorfen, welche Geschwüre bedecken, vergesellschaftet ist.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Eintritte der grössten Bösartigkeit. Kaum waren noch die Zufälle des sthenischen Scharlachs vorhanden, als auf einmal völlige Entkräftung sich einstellt. Hierzu gesellen sich Neigungen zu Ohnmachten, blasser Urin, Ausfliessen aus der Nase, beständiges Auspucken einer zähen schleimigen Feuchtigkeit.
- 2) Im Zeitraume der höchsten Bösartigkeit. Aeusserst geschwinder, schwacher, kleiner, kaum fühlbarer Puls; dünner, wässeriger Urin; rothe und wundte Nasenlöcher und Oberlippen, blasse Gesichtsfarbe, totale Entkräftung, aschgraue Flecken auf den entzündeten Stellen, stinkender Auswurf und Athem, ausnehmende Herzensangst, Gleichgültigkeit des Kranken über seinen



feinen Zustand , Kälte der äußern Theile des Körpers , Schluchzen , Konvulsionen u. f. w.

S c h ä d l i c h k e i t e n .

Vernachlässigung der Scharlachkrankheit, wie bey den böartigen Blattern, oder böartige Ansteckungsmaterie des Scharlachs.

H e i l u n g s k a r a k t e r .

Derselbe, wie bey den böartigen Blattern, nur daß so wie bey jenen die Hyperästhenie vorzüglich die Haut bey der häutigen Bräune zunächst den Hals u. f. w. befallen hat.

H e i l a n z e i g e .

Gleich jener bey den böartigen Blattern, nur mit dem Unterschiede, daß bey den böartigen Blattern vorzüglich das Drüsen- bey der brandigen Bräune aber vielmehr das lymphatische System von der indirekten Ästhenie ergriffen ist.

H e i l v e r f a h r e n .

Im Durchschnitte muß die Behandlung ihrer Stärke nach gleich dem dritten Grade der Hyperästhenie, ihrer Qualität nach aber gleich der Qualität der Sensibilität gewählt, und die Methode nicht nur innerlich, sondern zugleich und vorzüglich auch äußerlich, d. h. so nahe wie möglich an den hier zunächst angegriffenen Organen angewendet werden. Jedoch mit folgenden Bemerkungen und Modifikationen.

I. Diät. Gleich wie bey den böartigen Blattern.

II. Haus-



II. Hausmittel.

1. Gährendes Bier, ein Absud von Malz, Salbethee mit Wein und Honig werden als Gurgelwasser oder zum Einspritzen mit grossem Nutzen angewendet werden können.
2. Umschläge von gewürzhaften Kräutern mit Wein abgekocht um den Hals sind vorzüglich heilsam.
3. Lasse man den Kranken fleissig Wein trinken, setze ihn in ein lauwarms Bad von gewürzhaften Kräutern, wozu man noch Wein oder Brantwein giesset. Ferner wasche man auch den ganzen Körper, besonders den Hals, die Herzgrube und das Rückgrad mit warmem Weine.


III. Arzneymittel.

1. Oeftere Einreibungen von Nro. XIV. oder XV. in die Herzgrube, in das Rückgrad, vorzüglich aber in den Hals; um welchen man sogleich nachher wieder vorerwähnte Umschläge beständig erneuert legen läst.
2. Innerlich gebe man von Nro. XXVIII. aller Viertelstunden einen Theelöffel voll; und zum Gurgeln, zum Einspritzen, so wie zum Betupfen der Geschwüre im Halse lasse man Nro. XXIX. anwenden.

Auch kann man vielleicht zum Abwechseln mit Nro. XXVIII. sich der Mischung von Nro. XXVI. bedienen, besonders wenn die Zufälle sich schon etwas vermindert haben.

3. Mit Nro. XXVI. fahre man fort bis die Krankheit entweder bis zu dem ersten Grade der Hyperästhenie wieder herabgesunken ist, und wende sodann

vor-



vorzüglich Nro. XXX. an, oder dasselbe kann auch schon im zweyten Grade der Hyperästhenie abwechselnd mit Nro. XXVI. geschehen.

XIV.

Langwieriges Gliederreißen.

Rheumathalgia.

Definition.

Ist eine Krankheit mit stechenden, reissenden oder schneidenden Schmerzen in den Gliedern, gewöhnlich ohne Fieber und Pyrexie.

Zufälle.

Blasse kachektische Farbe der Oberfläche unseres Körpers, Verminderung der freywilligen Bewegung, allenthalben Schwäche und Trägheit, feststehende Schmerzen in den Gliedern, die selten geschwollen, sondern meist kalt, steif und ästhenisch entzündet sind.


Ausgänge.

- a) Krankhafte. Ausser den bey der Brustentzündung und Hirnwuth erwähnten, erfolgen gewöhnlich Verhärtungen, Knoten, hartnäckige Geschwülste, Steifigkeit der Gelenke, Vereiterungen, Knochenfraß, hartnäckiges Zahnweh, u. f. f.
- b) Tödliche. Der gewöhnlichste ist Brand.

Schädlichkeiten.

Diese können zweyerley seyn, nämlich:

- 1) Positive Reize. Hierher gehören vorzüglich alle diejenigen, welche Rheumatismus hervorbringen.



gen können. Sobald dieselben zu häufig und zu lange andauernd auf den Körper einwirken, oder durch ungeschickte Behandlung, z. B. zu warmes Verhalten u. dgl. der Rheumatismus zu sehr verstärkt wird, so gehet derselbe in indirekte Asthenie über.

- a) Negative Reize. Hierunter rechne ich besonders Mangel an Blut, an nöthiger Ernährung, Kälte, besonders feuchten, kühlen Rasen oder Boden, oder Wohnung, große Blutflüsse, Mißbrauch von Säuren, Essig, Käse, fauern Wein, drückenden Kummer, Onanie, öftere Besuche der Luftseuche, u. s. w. Alle diese und dergleichen Schädlichkeiten vermindern oder entziehen unserem Körper seine nöthigen Reizmittel, und vermindern dadurch absolut die Stärke der Irritabilität.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Eine Asthenie, welche vorzüglich in der Oberfläche des Körpers und den Gelenken die Oberherrschaft hat, zunächst aber, wenigstens anfänglich das Sekretions-system befallen hat, nach und nach aber auch das Lymphsystem mehr oder weniger ergreift. Indessen muß bemerkt werden, daß diese Krankheit sowohl rein asthenischer, als hyperasthenischer Beschaffenheit seyn kann, was überhaupt aus den im ersten Theile angegebenen Kriterien erkannt werden kann.

H e i l a n z e i g e.

Man suche die allzusehr erhöhte Sensibilität dem der Krankheit koexistirenden Grade entweder der reinen
Ast-

Asthenie, oder der Hyperasthenie gemäß zu depotenziren, und solange sie dieselbe ist, unsere Behandlungsart vorzüglich und zunächst nach der Qualität der Irritabilität einzurichten.

Indessen, sobald diese Krankheit Folgewirkung der Affektion z. B. des sensibeln Systems ist, hervorgebracht z. B. aus Kummer, Schrecken u. s. w., dann erfordert die Heilanzeigen die Anwendung kohlenstoffhaltiger Mittel.


H e i l v e r f a h r e n .

Ohne mich hier auf das bestimmte Detail der totalen Rekonstruktion dieser Krankheit einzulassen, indem mich dieselbe hier zu lange aufhalten würde, begnüge ich mich hier meiner allgemeinen Absicht schon damit, anzuzeigen, wie wir zu verfahren haben, um die Heftigkeit der Zufälle, wenn sie schnell und plötzlich überhand nehmen sollten, durch zweckmäßige Behandlung zu beseitigen. Allein um dieses zu finden, müssen wir es uns vorerst angelegen seyn lassen, zu erfahren:

- a) ob die Krankheit von ihrer rein ursprünglichen Qualität sey, oder
- b) ob sie vielleicht Symptom einer anderweitigen Affektion sey;
- c) ob sie rein asthenischer, oder hyperasthenischer Natur sey.

Demnach werden wir im Durchschnitte am besten auf folgende Weise verfahren.

I. Diät. Mäßig nahrhafte Speisen, reine Luft, angenehme Wärme, fröhliche Geistesbeschäftigung, Reiben des Körpers mit Flanell, welcher mit Maffix



stix durchräuchert ist, fleissige Leibesbewegung unter freyem Himmel, Wein, Thee mit Wein oder Rum, oder Branntwein, Punsch, helles Zimmer, Reinigung der Luft, Waschen des Körpers mit warmem Wasser und Seife u. s. w.

II. Hausmittel. Ameisenbäder, Waschen des leidenden Theiles mit Branntwein, Ingwerthee, Wachholderthee, warme Bäder aus drey Theilen Wasser und dem vierten Theile Weines. Oft lindert ein Gläschen starken Liguers heftiges Gliederreissen.

III. Arzneymittel.

1. Ist das Gliederreissen reines Ursprunges, und rein asthenischer Beschaffenheit, und weicht nicht auf vorstehende Mittel, dann verfare man noch überhaupt auf folgende Art:

a) Lasse man den Tag über von Nro. XVII. etwa aller 2 Stunden einen Eßlöffel voll nehmen.

b) Seifen- oder Senfbäder brauchen.

c) Beym Schlafengehen ein Pulver von Nro. XXII. nehmen mit Fliederthee.

d) In die Gliedmassen von Nro. XXI. einreiben, und Wachstaffent darüber legen.

e) Ist aber die Krankheit vom dritten Grade der reinen Asthenie, dann entferne man jede örtliche Behandlung, und beschränke sich vielmehr auf die Anwendung von Nro. XXXI. oder XXXII.

2. Ist aber das Gliederreissen mehr ein symptomatischer Zufall einer sensiblen Asthenie, dann empfehle ich Nro. XXIV. zuweilen aber auch Nro XXXII.



XXXII. Einreibungen von XIV. oder XV. wenn nicht die Krankheit auf dem dritten Grade der Asthenie liegt u. s. w.

3) Ist die Krankheit in Hyperasthenie übergegangen, dann verfähre man, wenn der Fall 1) war, mit dem Mittel Nro. XXXII. weit stärker, oder wende Nro. XXV. halbstündig zu zwey Theelöffel an, nebst Bäder, ähnlichen Einreibungen u. dgl.

4) Ist aber der Fall, wie bey 2), dann greife man zu dem Mittel XXVI.

Bey der Rekonstrukzion respektire man besonders in der Rekonvaleszenzzeit die Kultur der Haut, und Regulirung des Reproduktions- besonders des Verdauungsgeschäftes.

XV.

Asthenischer Husten, *Tussis asthenica*, oder kalter Katarrh, *Catarrhus frigidus*.

D e f i n i z i o n.

Asthenischen Husten nenne ich denjenigen, welcher frey von aller Pyrexie zum Vorschein kommt.

Z u f ä l l e.

Trockener, krampfiger und Reizhusten mit mehr oder weniger häufigem Auswurfe, geschwächter Körperbau, kachetisches Aussehen. Gehet die Krankheit ins Arge, dann gesellet sich noch kurzer und unterbrochener Athem, geschwinder, schwacher, und kleiner Puls, klebriger Speichel, Erbrechen, Kopfwch, Schwindel;



del, abmattender Husten, Eßluft; endlich auch unerträglicher, festsitzender Schmerz auf der Brust, asthenischer Durst, scheinbare Hitze, Pfeifen auf der Brust u. f. w. hinzu.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Schleimige Schwindfucht, Lungenfucht.
- 2) Tödliche. Brand der Lungen, und seine Folgen.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Diese sind zweyfach, so wie die Asthenie, welche den gedachten Husten hervorbringen kann, nämlich:

- 1) Positive Reize, wie beym Gliederreißen. Besonders gehört hieher noch das hohe Alter, Schmausereyen, öftere Trunkenheit, unmäßige Arbeit; erzeugen leicht und endlich Hyperasthenie.
- 2) Negative Reize. Besonders Anlage zur Schwäche von Geburt aus, Dürftigkeit, schlechte Nahrung, langer Aufenthalt in der Kälte u. f. w.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Krampfhaft konvulsivische Bewegung der Lunge aus Asthenie entsprungen.

H e i l a n z e i g e.

Beseitigung der vorhandenen Asthenie, vorzüglich des irritablen Systems, und zwar zunächst des einen Theils desselben, nämlich der Lungen.

Heil.

H e i l v e r f a h r e n.


Nur die potenzirende Methode kann hier wahrhaft wirksam seyn, so wie auch nur diese hier angezeigt ist. Jedoch schränke ich mich hier blos auf die den asthenischen Husten begleitenden heftigen Anfälle ein.

Daher

I. Diät und Hausmittel dieselben, wie beym Gliederreißen. Besonders aber empfehle ich aus mehrmaliger eigener glücklichen Erfahrung, bey rein asthenischem Husten, Früh Morgens Fleischbrühe mit Eigelbe, gewürzhafte Milchspeisen, Krebs- suppe, Krebse warm gegessen. Geringe Leute können täglich auch dreymal eine Tasse Wachholder- thee trinken.

Ist aber der Husten hoher asthenischer Natur, so kenne ich bey nahe kein besseres und schneller wirk- fames Mittel, als den sogenannten H o p p e l p o p p e l.

Die Zubereitung desselben ist folgende: Man zer- reibe das Gelbe von zwey frischen Eiern mit etwas Zucker, giesse sodann eine Tasse heisses Wasser und einen oder zwey Löffel voll Kirschengeist, oder Rum oder Brantwein hinzu, und trinke es warm. Ferner sind auch Pomeranzen- und Senfmolken, mit etwas Wein vermischt, in diesem Falle von gutem Nutzen. Nämlich, man setzt eine Kanne Milch über Kohlen, läßt sie warm werden, mischet so- dann einige Theelöffel voll Senf, welcher mit Weinessig angemacht ist, dazu, und läßt beydes solange über den Kohlen stehen, bis sich die Milch geschüttet hat. Oder man scheidet die Milch mit dem Saft einer halben oder ganzen Pomeranze, und



und läßt hernach noch ein Stückchen Pomeranzenschale mit der Milch digeriren. Sodann giefset man die Molken ab, giefset noch 2 bis 4 Eßlöffel voll Wein, nach Befinden der Asthenie hinzu, und läßt es täglich trinken.

II. Arzneymittel.

Das Verfahren erfordert hier dieselben Berücksichtigungen und Modifikation, deren wir bey der Rheumathalgie schon gedacht haben, so daß man nach eben denselben Rücksichten auch hier dieselben Mittel, und in derselben Dosis brauchen kann.

Indessen mache ich bey leichtern Anfällen dieser Art vorzüglich auf den Gebrauch von Nro. XXIII. aufmerksam.

Eben so bemerke ich, daß ein gewöhnlicher Nachlaß dieser Krankheit eine drückende oft schmerzhaft empfindung auf der Brust ist, in welchem Falle ich rathen würde, zu Nro. XXXIII. zu greifen.

Das Uebrige bleibt wie bey der Behandlung der Rekonvaleszenz der Brustentzündung.

XVI.

Keichhusten. *Pertussis.*

Definition.

Keichhusten ist ein krampfiger Husten mit Minutenlang andauernden kleinen absetzenden Expirationen, auf welche nachher eine lange, tiefe Inspiration mit einem pfeifenden, dem Krähen einer Henne ähnlichen Geräusche, und in heftigen Anfällen unmittelbar hierauf Erbrechen erfolgt.

Zu-



Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Unruhe, Aengstlichkeit, katarrhischer Husten, abwechselnde Frost und Hitze.
- 2) Beym Ausbruche. Der Katarrhhusten nimmt eine andere Form an, wird krampfiger, mit ununterbrochen aufeinander folgenden kleinen erschütternden Exspirationen, worauf plötzlich eine starke und tiefe Inspirazion mit einem pfeifenden, dem Krähen einer Henne ähnlichen Laute erfolgt. Nach dieser Inspirazion kommen wieder jene Exspirationen u. s. w. und auf diese Art repetirt diese Abwechslung oft sechs bis achtmal, so daß solche Anfälle oft einige Minuten und noch länger dauern. Ist der Anfall etwas heftig, so endiget er sich mit Niesen oder Erbrechen eines äußerst zähen, vogelleimartigen Schleimes. Hiermit verbindet sich Appetitmangel, welcher oft mit Heishunger abwechselt.

Gewöhnlich bemerkt man den herannahenden Paroxysmus, wenn Patient ängstlich und unruhig ist, sich einen Ort zum Festhalten sucht, gähnet, weinet oder nieset.

- 3) Bey der Zunahme bis zur größten Höhe. Anfangs kommt der Anfall täglich nur zwey - bis dreymal, nunmehr aber kommt er öfterer zum Vorschein, und wird jedesmal stärker, besonders nach dem Essen und des Nachts. Kommt ein solcher Anfall nunmehr, so bleibt Patient ganz aufsen während des Hustens, die Lunge bleibt starrend, so daß die Respirazion einst-



einstweilen unterbrochen wird, und Patient den Mund aufsperrt. Die Augen sind hervorgetrieben. Oft stürzt Blut aus der Nase und dem Munde heraus, bis die Respiration wieder in den Gang kommt. Diese Erstarrung kann oft einige Minuten andauern und epileptische Zufälle nach sich führen. In diesem Zeitraume kann jede kleine Veranlassung den Paroxismus hervorbringen, besonders jene, die auf das Zwergefell und Lungen zunächst wirken, z. B. Lachen, Weinen, Gähnen und jede Erschütterung des Körpers.

4. Bey der Abnahme. Frost und Hitze lassen nach, der Husten kommt selten und periodisch, wird schwach, die Kräfte des Patienten nehmen wieder zu.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Asthenischer, langwieriger Husten, schleimige Schwindsucht, Lungenfucht, Brustentzündung, Epilepsie.
- b) Tödliche. Auszehrung, Erstickung, Schlagfluß.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Eine eigene Ansteckungsmaterie, welche zwar die Form des Uebelbefindens bestimmt, während die Beschaffenheit der krankhaften Erregung theils von der vor der Ansteckung vorhergehenden Anlage, theils von andern zugleich einwirkenden Schädlichkeiten abhängt.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Meistens Hyperasthenie vom ersten Grade und gewöhnlich besonders anfänglich irritabler Art, (S. m. Ent-



Entwurf Th. II. §. 1094.) kann aber auch hypersthenischer Beschaffenheit seyn.

H e i l a n z e i g e.

Potenzirung der Irritabilität sowohl nach der Qualität derselben, als auch nach dem Grade derselben krankhaften Affektion, so wie auch im andern möglichen Falle Depotenzirung derselben.

H e i l v e r f a h r e n.


Dieses richtet sich bey sthenischem Keichhusten nach jener des Katarrhs oder Brustentzündung; bey asthenischem nach jener des asthenischen Hustens; nur mit der Rücksicht, daß der Keichhusten hyperasthenischer Art ist.

Wird aber der Paroxysmus heftig, so daß Schlagfluß oder Erstickung zu besorgen sind, so kitzle man den Gaumen und die Luftröhre des Kranken mit dem Barte eines Federkiels, welcher vorher in Wein eingetaucht wird, frottire den Rücken mit Flanell, und bey asthenischem Keichhusten reibe man Branntwein allda ein, auf die Füße lege man Senfpflaster, gebe ein Klystir von Tabaksrauch, und reize die Nase gleichfalls zum Niesen, wozu man sich auch frisch aufgeschnittener Zwiebeln bedienen kann, die man dem Patienten unter die Nase hält.

Außerdem ist es sehr gut, wenn man dem Kranken einzelne Scheibchen in heißer Asche gebratener Zwiebeln auf die Fußsohlen legt, und drey- bis viermal, oder auch öfters, die Gegend der Herzgrube, die beyden Seiten über den Hüften und das ganze Rückgrat mit Knoblauch reibet. Wenigstens vermögen beyde

Q

Mit-



Mittel sehr viel, die Heftigkeit und Häufigkeit der Anfälle zu mindern.

Was die Arzneymittel anlangt, empfehle ich bey dem reinen Keichhusten besonders die Anwendung von Nro. XVIII. aller Stunden zu zwey Theelöffel voll oder von Nro. XXIII. Stundenweis einen Eßlöffel voll, nebenbey Senf-Fußbäder und fleissige Einreibungen von XXI. besonders an die Gegend des Zwerchfells.

Ist der Keichhusten aber sensibler Art, dann rathe ich entweder von Nro. XVI. aller 3 bis 4 Stunden ein halbes Pulver zu nehmen, oder bey bedeutenden Anfällen Nro. XXIV. brauchen zu lassen, oder im höchsten Nothfalle zu Nro. XXVI. zu greifen, nebst ähnlichem Einreiben von XIV oder XV. und aromatischen Bädern.

Bey der Rekonstrukzion bleibt indessen die Regulirung der Verdauung, so wie die Kultur der Haut die wichtigste Bedingung der völligen Wiederherstellung.

XVII.

Engbrüstigkeit, *Asthma*,
und

Steckkatarrh, *Catarrhus suffocativus*.

D e f i n i z i o n.

Unter Engbrüstigkeit verstehe ich hier blos jenes beschwerliche Athemholen, verbunden mit größter Beklemmung auf der Brust, welches zuweilen nachläßt, aber immer wieder, obgleich zu ungewissen und ungleichen Zeiten, zurückkehret, und wobey sich selten ein anderer, als sonst gewöhnlicher Auswurf findet. Gehet diese



diese Krankheit ins Arge, dann entstehet Steckkatarrh, dessen Zufälle ich weiterhin noch angeben werde.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Allgemeine Zeichen der Asthenie mit der Empfindung einiger Verwirrungen in den Brustorganen. Einer der wichtigsten Vorboten ist das öftere Alpd r ü c k e n, d. i. jener unvollkommene Schlaf, worinn das Verlangen nach Ortsbewegung heftig ist, die Muskeln aber dem Willen nicht gehorchen, und welcher mit großer Unbehaglichkeit, einem Gefühle von Erstickung, und sehr oft mit Furcht verbunden ist.
- 2) Beym Ausbruche. Gewöhnlich befällt bey Nachtszeit den Asthmatischen eine ängstige Beklemmung und Beschwerlichkeit im Athmen, wodurch er aus dem Schlafe geweckt wird. Meistens sind dabey der Athem, Zunge und die Extremitäten kalt, aufrechte Stellung mit offenem Munde, und Verlangen nach freyer, kalter Luft. Der Puls ist schnell, schwach, aussetzend.
- 3) Bey der Zunahme bis zur größten Höhe. Es entstehet Steckkatarrh. Nämlich: die Beklemmung wird zum Ersticken arg, der Athem pfeifend, und nöthiget den Kranken, aufrecht zu sitzen, der Athem wird mit aufgehobenen Schultern und gestrecktem Genicke geholt, das Sprechen fällt schwer, oder ist gar unmöglich, die äußern Theile des Körpers werden kalt, betäubet, das Gesicht aufgetrieben,



die Augen hervorgetrieben, schwarzblau, die Augenlieder sind offen, die Pupillen erweitert, und unempfindlich gegen den Reiz des Lichtes, es fließen unwillkührliche Thränen.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Brustwasserfucht, Knoten in den Lungen, Bluthusten.
- b) Tödliche. Erstickung, Vereiterung der Lungen, Schlagfluß.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Alle negative, so wie heftig wirkende positive Potenzen, und mehrere sthenische Krankheiten, welche entweder zu stark, zu heftig, in zugrosser Quantität, zu lange Zeit auf den Körper eingewirkt oder in demselben gewüthet haben.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Beyde Krankheitsformen, wenn sie sich einmal fixirt haben, gehören der Hyperasthenie an. Die Engbrüstigkeit nämlich, ob sie gleich Symptom einer anderweitigen Affektion seyn kann, ist rein betrachtet noch irritabler Art, und fällt auf den zweyten Grad der Hyperasthenie, der Steckkatarrh dagegen auf den dritten.

H e i l a n z e i g e.

Beseitigung der Hyperasthenie nach gedachten Graden und Arten.

H e i l v e r f a h r e n.

Bey heftigen Anfällen der Engbrüstigkeit, wo man den Kranken mit Kopf und Brust hoch legen muß, ist, außer

aufser der beym asthenischen und Keichhusten schon angegebenen Verfahrungsart, auch ein Gläschen Brantwein, so wie auch aller viertel - oder halben Stunden eine Tasse von 2 Loth frisch gebranntem und gemahlenem Kaffee bereitet und getrunken, oft sehr schnell wirksam. Uebrigens wird man die Heftigkeit und Häufigkeit der so gefährlichen Anfälle sowohl, als auch das Alpdrücken verhüten können, wenn man Abends vor Schlafengehen ein Senf - Fußbad nimmt, und Hände und Füße erst einige Minutenlang frottiren läßt. Außerdem ist angemessene stärkende Diät, Ingwer - und Wachholderthee, besonders aber Hoppelpoppel (S. asthenischer Husten das Heilverfahren) die nothwendigste Bedingung zur Verhütung und Minderung derselben.

Trifft ein solcher Anfall kleine Kinder, die ihrer noch nicht so recht mächtig sind, so ist es gut, wenn man sucht sie zum Brechen zu bringen, um durch die mechanische Wirkung desselben die Unthätigkeit und Erstarrung der Lunge zu heben. Nachher aber verfare man, wie angegeben worden.

Arzneymittel. Bey heftigen Anfällen reibe man von Nro. XIV. oder XV. in die Brust und das Rückgrat ein, lasse fleissig die Füße mit lauwarmem Brantwein oder Melissengeiste waschen, und von Nro. XXXIV. gehörig gebrauchen.

Zur Verhütung des Anfalls selbst rathe ich übrigens überhaupt zu Nro. XXII. Abends ein ganzes, Morgens ein halbes zu nehmen.



XVIII.

Bluthusten. *Haemoptysis*.

D e f i n i z i o n.

Bluthusten ist Husten mit Geräusch und Blutausswurf, welches schaumig ist.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Drücken auf der Brust, beschwerliches Athemholen, Herzklopfen, Brennen in dem Brustkasten, salziger, oder warmer süßlicher, oder bitterer Geschmack, trockener Husten, ungewöhnlich rothe Wangen, gelinder Schauer, Müdigkeit, Kälte der Füße, Rückenschmerz, Blähungen, Blässe des Gesichtes und Unruhe im Pulse.
- 2) Beym Ausbruche. Es erscheint Husten mit Kitzeln und Jucken in der Luftröhre, worauf sogleich warmes und schaumiges Blut mit Geräusch weggehustet wird.
- 3) Bey der Zunahme bis zur größten Höhe. Nimmt die Krankheit zu, so klagt Patient über Stechen und unerträgliches Brennen in der Brust, es gesellen sich blos krampfhaftes Zufälle, Zittern des ganzen Körpers, kalte Schweisse, blasser Urin, heftige Beängstigung, Steckanfälle, konvulsivischer Husten hinzu, und das Blut, welches ausgehustet wird, ist nicht mit Schleim vermischt, sondern ganz pur, hellroth oder dunkel, oder schwarz, dünne, und riechet stinckend.

Aus.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Knoten, Verhärtungen, Geschwüre in den Lungen, Brustentzündung, asthenischer Husten, hektisches Fieber.
- b) Tödliche. Brand der Lungen, Lungenfucht, Erstickung, Schlagfluß.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Alle negative, so wie auch positive Potenzen, z. B. Verdruss, Kummer, Mangel an gehöriger Nahrung, kalter Winter u. s. w. Besonders aber können diese um so eher Bluthusten in einem solchen Subjekte erregen, welches vorzügliche Anlage dazu hat. Die Kennzeichen davon sind: allgemeine schwächliche Konstitution, schmale und enge Brust, hervorragende Schultern, zärtlicher Körperbau, langer Hals, grosse Empfindlichkeit, scharfsinniger Geist, feine und schwache Stimme und erweiterte Pupillen.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Gedachte Krankheit kann sowohl sthenischer, als asthenischer Natur seyn (S. in. Entwurf. Th. II. §. 1006. 1010.) obgleich ersterer Fall sehr selten ist.

H e i l a n z e i g e.

Nach Verschiedenheit gedachter Charaktere dieser Krankheit muß man suchen, die Irritabilität bald zu depotenziren bald zu potenziren. Uebrigens ist die Potenzirung derselben öfterer nöthig, als das entgegengesetzte Verfahren, in welchen man bemerken muß:

- a) daß die Krankheit rein genommen, irritabler Art ist, folglich etc.

b)




- b) daß sie aber auch sensibler Abkunft seyn kann.
- c) Daß sie erscheinen kann auf dem dritten Grade der reinen Asthenie, als auch
- d) auf dem dritten Grade der Hyperasthenie.

H e i l v e r f a h r e n .

Dieses richtet sich nach folgenden Umständen:

- 1) Ist der Bluthusten Folge einer sthenischen Krankheit, dann verfare man wie bey der Brustentzündung, besprenge den Kranken plözlich über den ganzen Körper mit Wasser, lasse ihm einen bis zwey Löffel voll Küchensalz, in Wasser aufgelöst, verschlucken, lasse sogleich zur Ader, und gebe kühlende und abführende Getränke.
- 2) Ist aber der Bluthusten Folge einer reinen Asthenie, dann Sorge man vor allen Dingen dafür, daß der Kranke mit der Brust und dem Kopfe hoch liege; entferne allen äußern Druck, alle Bewegungen der Arme und der Brust; der Kranke spreche wenig und nicht laut, halte sein Gemüth ruhig. Ferner reibe man auf der Brust, zwischen den Schultern und in die Füße lauwarmen Branntwein ein, lasse ein Loth Leinsamen mit einem Pfunde Wasser abkochen und aller Stunden eine halbe Tasse trinken, Fußbäder mit Asche oder Seife nehmen, und aller Viertelstunden einen bis zwey Löffel Wein, nach Befinden der größern oder geringern reinen Asthenie in Rücksicht der Konstitution des Kranken trinken.

Arzneymittel. Ihre Auswahl, so wie die Stärke ihrer Dosis richtet sich nach oben angegebenen Umständen, nämlich



- 1) Ist der Bluthusten reinen Ursprungs, dann greife man, entweder zu Nro. XXIII. oder verordne Ipecacuanha zu $\frac{1}{2}$ Gran mit 3 Gran Zimmt und etwas Zucker, oder lasse von Nro. XXV. öfters einen Theelöffel voll nehmen.
 - 2) Ist er sensiblen Ursprungs, dann kann man sich der Numer XXIV., oder auch von Nro. XXII. aller Stunden einen Dritteltheil desselben Pulvers sich bedienen,
 - 3) Ist er hyperasthenischer Beschaffenheit und ersterer Art noch, dann greife man nach Nro. XXV. und forge für Einreiben von Nro. XXI. etc. Auch der Essent. Cinam zu 20 Tropfen mit 4 Tropfen Tinctur thebaic. etc.
 - 4) Ist er aber letzterer Art, dann kann man sich sowohl Nro. XXVI. und XXVII. als auch XXIV. bedienen, nebenbey aber von Nro. XIV. oder XV. einreiben.
- Uebrigens ist ein Pechpflaster zwischen den Schultern getragen, ein sehr gutes Verhütungsmittel dieses Zufalls.

XIX.

Blutbrechen. *Vomitus cruentus.*

D e f i n i z i o n.

Blutbrechen ist Erbrechen mit Blutauswurf, welches meistens geronnen und schwarz ist.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Drücken in der Herzgrube mit Beängstigung und Beklemmung,

un-



unvorgesehene mit Schwindel, oder Ohnmacht, oder Gemüthsbetäubung anwandelnde Krämpfe in der linken Seite, im Rücken, in den Lenden und Unterleibe.

- 2) Beym Ausbruche. Kaum haben vorige Zufälle einige Zeit angedauert, sogleich bricht Patient meist schwarzes und geronnenes Blut weg. Dabey fällt das Gesicht zusammen, wird mifs-färbig, der ganze Körper sehr entkräftet.
- 3) Bey der Zunahme der Gefahr. Der Puls sinket, wird geschwind, klein, schwach und aussetzend, es brechen kalte Schweisse aus, die Ohnmachten kommen häufiger wieder, die Augen werden trübe und gebrochen, der Schmerz in der Brust und der Herzgrube wird unerträglich, es gesellet sich Gelbsucht hinzu; das Blutbrechen erfolgt mit einer heftigen, oft konvulsivischen Erschütterung.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Patient behält die Anlage dazu, oder bekommt Brustwassersucht, oder Hektik.
- b) Tödliche. Erstickung, Schlagfluß, Brand der Lungen.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Die gewöhnlichsten sind die negative Reize.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Anfänglich ist diese Krankheit meistens rein asthenischer Art, gewöhnlich vom dritten Grade, kann aber sehr leicht und sehr bald in Hyperasthenie übergehen.

Ob-



Obgleich ferner ursprünglich mehr irritabler als sensibler Beschaffenheit, kann sie dennoch von der Affektion des sensibeln Systems entstehen, wo sie dann nur als Symptom erscheint.

H e i l a n z e i g e .

Beseitigung der Asthenie erstens dem Grade, zwey-
tens der Art derselben gemäß.

H e i l v e r f a h r e n .

Im Allgemeinen dasselbe wie beym Bluthusten.
Besonders aber empfehle ich noch

- 1) viel schleimige Getränke, z. B. Habertrank, Gerstenabsud mit etwas Muskatennuß abgekocht, und in dringenden Fällen Alaunmolken. Nämlich man mischet zu einer halben Kanne Milch ein Quentchen Alaun, läßt die Milch scheiden u. s. w.
- 2) Senfumschläge auf die Fußsohlen oder Waden und auf die beyden Arme, und im höchsten Nothfalle auch auf die Magengegend; aber allemal lasse man nur die Stellen roth ziehen.
- 3) Klystire von Leinsamen mit zwey bis vier Löffel Leinöl.

Arzneymittel wie beym Bluthusten.

XX.

Blutharnen. *Mictus cruentus.*

D e f i n i z i o n .

Blutharnen ist ein mit dem Urin vermischter Blut-
abgang aus der Harnröhre. Zu-



Z u f ä l l e.

- 1) Fühlt Patient vor und beym Urinlassen Schmerzen in der Nierengegend, und ist das Blut mit dem Urin innig vermischt, dann ist es Beweis, daß das Blut aus den Nieren kommt.
- 2) Fühlet aber Patient Schmerzen in der Blasengegend, und das geharte Blut schwimmt in geronnenen Stückchen auf dem Urin, dann beweiset dieses, daß der Urin aus der Urinblase kommt.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Blasen- und Nierenstein, Eiterauffammlung in diesen beyden Organen.
- b) Tödliche. Brand dieser Theile, Verblutung.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Besonders zu heftig und zu lange anhaltende wirkende, zuweilen aber auch Inzitant absolut vermindernde Potenzen, z. B. starkes Wein- und Theetinken, Ausschweifungen in Bewegung des Körpers und andern inzitirenden Dingen, Mißbrauch der Venus.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Gleich dem Bluthusten, nur daß die Affektion hier vorzüglich die Harnabsondernden Organe trifft.

H e i l a n z e i g e.

Eben dieselbe wie beym Bluthusten. Nur muß man hier zunächst und vorzüglich auf das grössere Leiden der Harnabsondernden Organe sehen.

Heil-

H e i l v e r f a h r e n.

Meist allgemein positiv wirkfame Methode, besonders bey einzelnen und Gefahr drohenden Anfällen. Hierzu empfehle ich folgendes Verfahren.

I. Diät. Diese muß sthenisirend seyn. Dabey aber halte man bey den Anfällen selbst den Körper ruhig und vermeide alle Urintreibende Mittel.

II. Hausmittel.

1) Beym Anfalle.

a) Umschläge von Salbey in Wein abgekocht, oder Lappen in Branntwein getaucht auf die Nieren- und Blasengegend gelegt.

b) Klystire von Leinsamen.

c) Senfumschläge auf die Waden oder Fußsohlen.


d) Abfud von Salbey, oder Alaun- Pomeranzen- und Stahlmolken fleissig getrunken. Letztere bereitet man so, daß man durch öfteres Eintauchen eines glühenden Eisens in Milch dieselbe scheidet.

e) Vor allem aber empfehle ich eine halbe Unze Mandel- oder Leinöl mit Eigelbe aufzulösen und alle halbe Stunden einige Theelöffel voll zu geben.

2) Nach dem Anfalle fahre man noch einige Zeit damit fort, weil dieser Zufall leicht recidiviret; am besten aber mit Selterwasser und Milch getrunken.

Arzneymittel. Wie bey dem Bluthusten, vorzüglich aber kann man sich hier im Allgemeinen nach Befinden eben gedachter Umstände entweder bey reiner Asthenie Nro. XXIII. oder bey der Hyperasthenie Nro.

XXV.



XXV. oder im höchsten Nothfalle Nro. XXXIV. sich bedienen. Einreiben auf diese Gegend darf aber besonders bey Hyperasthenie nie vergessen werden.

XXI.

Mutterblutfluß. *Menorrhoea*.

D e f i n i z i o n.

Mutterblutfluß ist eine Ergießung des Blutes aus der Gebärmutter, welche länger anhält und stärker ist, als es die Zeit und Natur erfordert und erlaubt.

Z u f ä l l e.

Außer dem Blutflusse kommen noch Schmerzen in den Lenden, Weichen und dem Unterleibe, Mattigkeit, Blässe, Ekel, schwerer Athem, Kopfschmerz, Schwindel, Dunkelheit vor den Augen, Ohnmachten, kleiner und schwacher Puls, Herzklopfen, Kälte und Schauer in den Extremitäten, Mangel an Appetit, gegen Abend angelaufene Füße u. dgl. hinzu.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Bleichsucht, wasserfüchtige Geschwülste, weißer Fluß, Mutterkrämpfe, Auszehrung.
- b) Tödliche. Verblutung.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Diese sind zweyfach:

- 1) Solche, welche direkt Asthenie verursachen, nämlich schlecht nährende Speisen,
Man-



Mangel an Speisen, häufiges wässeriges Getränk, entkräftende Ermüdungen, Kummer und andere niederdrückende Gemüthsbewegungen, methodisches, unzeitiges und periodisches Laxiren, Aderlassen, Kälte, vieles Gebären, müßiges Leben, Onanie.

- 2) Solche, welche zu heftig und zu lange anhaltend auf den Körper einwirken und indirekt Hyperasthenie hervorbringen, z. B. Mißbrauch reizender Arzneyen, heftige Anstrengungen des Körpers, Geilheit, unmäßiger Bey Schlaf, allzugroße Wärme, Erhitzung durch rasendes Tanzen, heftiger Zorn u. f. w.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Aeußerst selten ist ein Mutterblutfluß sthenischer Beschaffenheit, und wenn er es ja einmal ist, so dauert er als solcher nicht lange, ohne die hyperasthenische Natur anzunehmen. Gewöhnlicher ist der Fall, daß der Mutterblutfluß asthenischer Natur ist, indessen kömmt es auch hier wieder darauf an, ob er noch innerhalb der Grenzen der reinen Asthenie liege, oder in Hyperasthenie schon übergegangen sey.

H e i l a n z e i g e.

Dieselbe wie bey dem Bluthusten, nur mit der Berücksichtigung der Gebärmutter als vorzüglich affizirten Theile.

H e i l v e r f a h r e n.

Entsteht Mutterblutfluß während der Zeit, als zu stark und zu heftig inzitirende Potenzen auf den Körper ein-



einwirken, so kann man, wenn man demselben gleich begegnet, durch kalte Umschläge auf den Leib und Rücken, kalte Bäder, Weinessig mit Oel zu gleichen Theilen vermischt innerlich gegeben, ferner durch eine mäßige Aderlaß u. s. w. denselben sogleich zum Stillstande bringen.

Ist aber, was meistens der Fall ist, allgemeine Asthenie die Ursache davon, dann verfähre man sthenisch, und zwar so, daß man bey reiner Asthenie die sthenisirenden Mittel in kleinen Gaben, und oft in kurzen Zwischenräumen, bey Hyperasthenie hingegen anfangs gleich in großer Quantität mit allmäliger Verminderung ihrer Stärke und Menge, appliziret. Die hierzu angezeigten Mittel sind:

I. Diät. Kräftige Fleischbrühe mit Eigelbe, Kalbfleisch-Geleés, Wein, Bewegung des Körpers, besonders in freyer Luft, angenehme Gemüthsbewegungen, gute Milch, Fleischspeisen mit Gewürz, Austern, Krebse u. s. w. sind als Verhütungsmittel des Blutflusses vorzüglich anzuwenden.

II. Hausmittel. Ein Glas Wein, Wasser mit Rum oder Weingeist in größerer oder kleinerer Quantität, nach Verschiedenheit der Asthenie; ferner: ein Senfumschlag auf den Leib, Einreibungen von warmem Weine in den Leib und Rücken u. s. w. helfen meistens bald.

Arzneymittel.

1) Im Anfange und bey leichten Anfällen dieser Art rathe ich vor allem zu Nro. XXII., davon nämlich ein halbes Pulver gegeben.



- 2) Ist der Fall ganz rein irritabler Art, dann empfehle ich von Nro. XXV. nach Befinden der Umstände theilweis zu nehmen.
- 3) Ist der Blutfluß sensibler Art, dann greife man zu Nro. XXIV.
- 4) Ist er schon in Hyperasthenie übergegangen, dann rathe ich zu Nro. XXVI. und Einreiben von Nro. XV. Umschlägen von aromatischen Kräutern u.s.w. Ferner Klystire von aromatischen Kräutern mit Liquor anod. Tinctur. thebaic.

XXII.

Nasenbluten. *Epistaxis.*

Die Ursache jedes Anfalles von Nasenbluten, welche nicht Folge eines sonstigen örtlichen oder organischen Fehlers der Nase ist, z. B. durch Stöße auf dieselbe oder auf den Rücken verursacht, ist meistens asthenischer Beschaffenheit, nur bald rein asthenischer, bald hyperasthenischer Art, je nachdem die Heftigkeit der schädlichen Einwirkungen groß war im Verhältnisse zu dem konstitutionellen Erregbarkeitsgrade.

Besonders sind eben darum junge und schwächliche Menschen, so wie auch starke Wein- und Branntweintrinker sehr dazu geneigt.

Indessen gedenken wir nur des recht gefährlich werdenden Nasenblutens.

Z u f ä l l e.

Zufälle eines Gefahr drohenden Nasenblutens. Das Blut will sich nicht stillen lassen, rinnet
R. gleich.



gleichsam nur aus der Nase hervor; der Athem wird schwer, es klingelt und brauset dem Patienten vor den Ohren, Patient wird schwindlich, der Puls wird klein und aussetzend, die Extremitäten werden kalt, und es treten Ohnmächten ein.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Abzehrung, Erweiterung einer oder der andern Herzhöhle.
- 2) Tödliche. Verblutung, Schlagfluß.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Ist aus der bisherigen Erörterung leicht erkennbar, so wie auch

H e i l a n z e i g e.

Ganz gleich der bisherigen nur mit lokaler Beschränkung nach Befinden der Umstände.

H e i l v e r f a h r e n.

In schnell tödlichen oder sonst dringenden Fällen.

- 1) Der Kopf muß hoch gehalten werden und der Patient mit aufgerichtetem Kopfe und Brust sitzen.
- 2) Aller Druck enger Kleidungen muß entfernt werden.
- 3) Man setze Patienten in ein Senf-Fußbad.
- 4) Lasse man demselben Branntwein, zuweilen auch starken Weinessig in die Nase schnaufen, oder drehe damit befeuchtete Zapfen von Charpie in die Nase.
- 5) Gebe man ein Glas guten Wein oder Branntwein mit oder ohne Wasser.

Arz-

Arzneymittel. Bey dem schwer zu stillenden Nasenbluten müssen wir den Fall immer als eine Hyperästhenie ansehen, und darnach verfahren, vorzüglich durch lokal verstärkte Anwendung derselben Methode, nämlich durch Einreibungen von Nro. XIV. in die Schläfe, von Nro. XV. in den Nacken und Rücken. Lauwarmer Branntwein - Fußbäder. Dabey innerlich von Nro. XXIV. aller halben Stunden 40 — 80 Tropfen geben u. s. w.

XXIII.

Ohnmacht. *Lypothymia*.

Definition.

Ohnmacht ist plötzliche Unthätigkeit aller Lebensverrichtungen.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Brausen vor den Ohren, Trübheit oder feurige Funken vor den Augen, Neigung zum Brechen, Poltern im Unterleibe, Zittern der Lippen, Blässe des Gesichts, kalte Nase und Gesicht, Schwindel.
- 2) Beym Ausbruche. Empfindung und willkührliche Bewegungen gehen verloren, Puls und Athem bleiben aber in ihrem natürlichen Zustande.
- 3) Bey der Zunahme bis zur größten Höhe. Man bemerkt kaum noch Athemholen, der Puls ist kaum mehr zu fühlen, setzt ganz aus, und die Besinnung fehlet ganz. Endlich erfolgt Scheintod.

R. a

Schäd.



S c h ä d l i c h k e i t e n .

Uebertriebene körperliche Anstrengung, anhalten- des Studiren, Trunkenheit, heftige Leidenschaften, z. B. Zorn, starke Gerüche, zu heftig und stark wirkende Dinge, z. B. Opium u. s. w. Ferner: starke Ausleerun- gen, Hunger, heftige Kälte, Blutflüsse aller Art, Schre- cken, Aerger u. s. w.

H e i l u n g s k a r a k t e r .

Gemeiniglich reine Asthenie der willkührlichen Be- wegungsorgane vom zweyten Grade. (S. m. Entwurf. Th, II. §. §. 430. 433.) Dennoch aber kann sie hyper- asthenischen Ursprungs seyn.

H e i l a n z e i g e .

Man hebe schnell den vorhandenen Grad der rei- nen Asthenie oder Hyperasthenie und suche die Empfin- dungs - und Bewegungsorgane wieder in Thätigkeit zu setzen.

H e i l v e r f a h r e n .

Vor allem entferne man festanliegende Kleidungs- stücke, lege den Patienten horizontal, lasse ihn ein Glas Wein trinken, reibe ihn mit warmen Tüchern, oder Wein oder Brantwein den ganzen Körper, Rücken, die Herzgrube, halte ihm angebrannte Federn, oder ei- nen Schwamm mit scharfem Essig befeuchtet, oder frisch aufgeschnittene Zwiebeln unter die Nase, gebe gleich eine Tabakrauchs - Klystir, und lege Senfumschläge auf die Füße.

Arzneymittel. Im allgemeinen bedient man sich hier am besten:



a) Wenn sie rein asthenischer Natur ist, Nro. XXXII. zu 30 bis 40 Tropfen.

b) Wenn sie aber hyperasthenischer Natur ist, am besten Nro. XXVII., so wie der Einreibungen von Nro. XIV oder XV. in die Schläfe, Rücken, Fußsohlen u. s. w.

Ferner kräftig inzitirender Klystire von einem Aufguss von Rad. Arnicae mit Naphtha Vitriol, und Tinctur. thebaic. u. s. w.

XXIV.

Scheintod. *Asphyxia*.

D e f i n i z i o n.

Scheintod ist Mangel aller Lebensäußerungen in dem Körper, wobey aber noch Reizempfänglichkeit derselben einiger Massen wenigstens vorhanden ist.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Uebermächtig stark, plötzlich und heftig einwirkende, inzitirende Potenzen, z. B. Zorn, höchster Grad von Betrunkenheit; ferner alle diese Ursachen, wodurch dem Körper Lebensreize entzogen und die Erregbarkeit schnell zu sehr angehäuft wird, z. B. heftige Kälte, Blutflüsse u. d.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Dritter der Asthenie der willkührlichen Bewegungsorgane, so zwar, dass auch dieselben Erscheinungen durch Hyperasthenie erzeugt werden können.

Heil.



H e i l a n z e i g e .

Gehörige Berücksichtigung und zweckmäßige Beseitigung der gedachten ursachlichen Momente des Organismus.

H e i l v e r f a h r e n .

Die potenzirende Methode in ihrem ganzen Umfange ist hier in jeder Rücksicht angezeigt.

Die hierzu schicklichsten und sichersten Mittel sind.

1) Reiben des ganzen Körpers mit wollenen Tüchern, Flachs, Werg, Stroh, Heu. Nur mache man diese Dinge alle vorher erst mäßig warm, oder durchräuchere sie vorerst mit Wachholder, Mastix u. d. gl. Vorzüglich reibe man Arme, Beine, Schenkel, Unterleib, Brust, Magengegend, Rückgrat und Fußsohlen, aber immer nur anfangs etwas gelinde, und von den Gliedern aufwärts nach dem Stamme, dann immer stärker, solange, bis die Haut roth wird. Nachher befeuchte man dieselben Reibwerkzeuge mit warmem Branntwein oder starkem Weinessig, und verfare eben so.

2) Reizung des Darmkanals, welcher am längsten seine Reizbarkeit behält. Dies kann geschehen:

a) durch Reizung zum Brechen. Man reizet in dieser Absicht mit dem Barte einer Feder mit Oel, noch besser mit Wein bestrichen, den Schlund oder die Kehle, oder mit einem Büschel Haare, oder mit dem Finger. Zugleich lege man Senfteig oder Sauerteig mit Essig



Essig auf die Magengegend, und lasse die Stelle roth ziehen, oder man reibe die Herzgrube (wie oben) klopfe auf den Rücken, und lasse den Körper mit vorgebeugtem Kopfe aufrecht sitzen, oder ihn auf die linke Seite legen. Kann der Kranke noch schlucken, so gebe man ihm ein kräftiges Brechmittel, Wein, Branntwein u. dgl. außerdem aber ja nicht.

b) Durch beygebrachte Klystire, entweder von Wein, oder Branntwein mit Wasser, oder Weinessig, am besten aber von Tabaksrauch, oder einem Aufdampf von Tabak.

3) Reizung zum Niesen. Hierzu bedient man sich entweder eines Federbarts mit Wein bestrichen, oder man halte zerschnittene Zwiebeln, Meerrettig, frisch gemahlenen schwarzen Senf, Schnupftabak, zerstoßenen Pfeffer, Ingwer unter die Nase, oder bringe diese Dinge selbst in die Nase.

4) Tropfbad. Man läßt aus einem Gefäße mit einer Röhre von der Höhe (z. B. wenn man sich auf einen Stuhl stellt) entweder kaltes Wasser oder Wein auf die Brust tröpfeln.

5) Ferner kann man auch noch folgende Mittel anwenden: Das Peitschen mit Brennesseln oder dünnen Ruthen, Stechen mit Nadeln zwischen den Nägeln und an den Fußsohlen, trockene Schröpfköpfe auf den Körper hin und hergezogen, Reiben der Scham, Aufträufeln des siedenden Oels oder brennenden Siegelacks auf die Haut, besonders auf die Fußsohlen, Brennen mit



mit glühendem Eisen oder einem Lichte an die grofse Fußzehe, Applikazion stark durchdringender Töne vor die Ohren, z. B. Trompetenschall, Knall von einer Pistole u. s. w.

Sobald der Scheintodte etwas schlucken kann, gebe man ihm sogleich eine Tasse Thee mit Wein, oder Rum, oder Branntwein.

Bey dieser Gelegenheit merke ich noch die Behandlung folgender Arten vom Scheintode an.

A. Erfrieren.

Die besten und gleich anzuwendenden Mittel sind folgende: Nur wisse man, daß der höchste Grad von direkter Asthenie die Ursache dieses Scheintodes ist.

- 1) Man bringe den Erfrorenen in ein kaltes Zimmer, kleide ihn aus, lege ihn mit dem Kopfe aufrecht, bedecke ihn über und über, das Gesicht ausgenommen, mit ein paar Hände hoch Schnee. Außerdem aber setze man ihn in ein ganz kaltes Bad, oder schlage beständig kalte nasse Tücher und Decken um ihn.

Thaut der erstarrte Körper auf, so legt sich gemeinlich um ihn her eine Eistrinde an. Wenn diese anfängt zu zergehen, so nehme man den Körper aus dem Wasser, und reibe ihn mit etwas äußerst wenig warmem Wasser, mit etwas Wein oder Branntwein, vermehre allmählig nach und nach den Wärmegrad, dadurch, daß man warme Steine abwechselnd um ihn her legt. Findet sich nun etwas Beweglichkeit des Körpers und Wärme, dann trockne man den Körper



per mit etwas gewärmten Tüchern ab, und lege ihn in ein leicht gewärmtes Bette, oder in das sogenannte

- 2) Aschbette. Nämlich man bestreuet ein großes Tuch eine halbe Hand hoch mit mäsig warmer Asche, oder Sand, oder Salz, leget den Körper, nachdem man ihn mit warmen Tüchern wohl abgetrocknet hat, darauf, und bestreuet denselben gleichfalls allenthalben, das Gesicht ausgenommen, eine halbe Hand hoch mit den genannten Dingen. Um den Hals leget man einen damit angefüllten Strumpf, und auf den Kopf eine damit angefüllte Mütze.

Sobald sich wieder einige Lebensbewegungen äußern, verfare man wie bey obigem Heilverfahren 1. bis 5. angegeben worden ist.

B. *E r t r i n k e n.*

Verfahrungsart.

- 1) Man sey beym Herausziehen aus dem Wasser bedacht, daß Kopf, Brust und Hals nicht verletzt werden.
- 2) Man rüttele einen solchen Körper ja nicht, noch vielweniger stelle man ihn auf den Kopf.
- 3) Man bringe ihn eilig mit aufgerichtem Kopfe in das nächste Haus in eine mäsig Wärme, lege den Kopf etwas hoch und auf die rechte Seite, entkleide, trockne und wickle ihn vorerst in warme Tücher.
- 4) Reibe man beständig denselben, besonders die Fußsohlen.



- 5) Reinige man den Mund und die Nase von Schleim, Sand u. f. w. mit einem in Oel getauchten Lappen oder Federbart.
- 6) Man blase ihm etwas Luft durch Mund und Nase ein, drücke zugleich die Brust gelinde, um die Bewegung derselben beym Athemholen nachzuahmen und verfare wie oben bey 1. bis 5.

C. *Erhängen* oder *Erwürgen*.

Nöthiges Verfahren.

- 1) Man schneide den Strick los, und verhüte, daß der Körper nicht auf die Erde stürze.
- 2) Man löse gleich alle Kleidungsstücke.
- 3) Man bringe den Körper in kühle Luft und in eine solche Lage, daß der Kopf und die Brust etwas erhoben liegen.
- 4) Man öffne eine Ader am Arme oder an den Füßen, scarifizire den Kopf, Nacken, hinter den Ohren, und agire weiter wie oben beym Heilverfahren 1. bis 5.

Die Arzneymittel überhaupt anlangend bemerke ich hier nur folgendes.

1. Verweilt der Scheintod noch innerhalb der reinen Asthenie, dann behandle man dasselbe Subjekt mit Nro. XIV oder XV. äußerlich, und wenn der Kranke wieder etwas schlucken kann, reiche man ihm von Nro. XXIV.

2. Außerdem aber greife man nach Nro. XXVI. oder XXVII. Späterhin nach Nro. XXXIII. und fahre mit den Einreibungen u. f. w. fort.

XXV.

Schlagfluß. *Apoplexia.*

D e f i n i z i o n.

Schlagfluß ist plötzlicher Verlust des Bewusstseyns und der willkührlichen Bewegungen, mit tiefem Schläfe, Schnarchen und Lähmung verbunden.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Gewöhnlich gehen die Zeichen der Asthenie voraus. Oft bemerkt man schon lange vorher häufig wiederkehrenden Schwindel, Ueblichkeit und Erbrechen, ohne vorhergegangener Ueberladung des Magens, besonders bey alten Leuten, ein Gefühl von Ameisenlaufen in den Gliedern, ungewöhnliche Schläfrigkeit ganz ausser der Zeit, ungewöhnliches Kauen im Wachen und Schläfe, Herabhängen der Unterkinnlade, lange andauerndes Brausen und Klingeln vor den Ohren, Herabhängen der Augenlieder, ungewöhnlich starkes Zittern in den Armen und Beinen, schwarze und dunkle Erscheinungen und Flecken vor den Augen, kleine Verzerrungen des Mundes oder anderer Gesichtsmuskeln, besonders bey alten Leuten, schmerzhaft empfindungen im Nacken bis ins Vorderhaupt, plötzliches Umfallen, unwillkührliche Thränen, Gähnen, Vergessenheit, Schwäche des Gedächtnisses, Stumpfsinn, langsame oder stammelnde Stimme, hingestreckte Lage auf den Rücken, tieferes Athemholen.

2)



a) **Beym Ausbrüche.** Steht der Patient aufrecht, so sinket er plötzlich zu Boden, fällt in tiefen Schlaf, wobey noch der Athemzug, wiewohl mit Röcheln, nebst dem Pulschlage übrig bleibt.

b) **Bey der Zunahme bis zur größten Höhe.** Patient verlieret alles Bewusstseyn, scheint im tiefsten Schlafe zu liegen mit Schnarchen, der Schaum tritt ihm vor den Mund. Im höchsten Grade gehet der Puls äußerst langsam, die stärksten Reize vermögen keinen fühlbaren Eindruck zu machen. Das Schlucken ist ihm unmöglich, die Pupillen sind erweitert und empfindlich, alle Theile sind gelähmt. Koth und Urin fließen unwillkührlich weg, die untere Kinnlade hängt herunter, es stellen sich kalte Schweisse ein u. s. w.

A u s g ä n g e.

- a) **Krankhafte.** Anlage zur öfteren Wiederkehr, Fieberanfälle, einzelne Lähmungen.
- b) **Tödliche.** Der Tod selbst.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

- a) **Negative Reize.** Unnässiges und zur Gewohnheit gewordenes Aderlassen, kalte Witterung, schlechte Nahrung, feuchte Witterung, kalter Trunk bey sehr erhitztem Körper, Gram, Furcht, oftmalige Ueberladung des Magens, häufige Onanie u. s. w.
- b) **Positive Reize.** Alle heftige und lange andauernde sthenische Krankheiten, höchster Grad von Trun-



Trunkenheit, sehr heftige Bewegung des Körpers, heftige Leidenschaft, z. B. übermäßige Freude, heftige Liebe, äussere Hitze, grosse Sonnenhitze, schnell und heftig inzitirende Arzneyen, z. B. Opium, zu langer und unmässiger Genuß des Lebens u. s. w.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Relative Depotenzirung der Sensibilität bey absoluter Potenzirung derselben, und dadurch bewirkte Verminderung der Irritabilitätsäusserung in den willkührlich beweglichen Organen. (S. m. Entwurf Th. II. §. 430.)

Anmerkung. Obgleich der Schlagfluß auch durch die Hyperästhenie erzeugt werden kann, wie ich a. d. O. bewiesen habe, so beschränke ich mich dennoch hier nur auf den eben erwähnten Fall, da letzterer weit leichter heilbar als dieser ist u. s. w.

H e i l a n z e i g e.

Man suche die Sensibilität, welche bis zum zweyten Grad der Hyperästhenie potenziert worden ist, wieder zu ihrem Normalgrad zu depotenziren, je nachdem die Potenzirung derselben rein sensiblen oder rein irritablen Ursprunges ist.

H e i l v e r f a h r e n.

Der Zeitpunkt, welcher unsere Hülfe am meisten verlangt und am ersten bedarf, ist der Anfall des Schlagflusses selbst. Vor allem aber unterrichte man sich erst von der vorhergegangenen Lebensart, Beschaffenheit des Kranken, und von jenen Schädlichkeiten, welche vor dem Ausbruche des Schlagflusses unmittelbar vorhergingen.



gen. Finden wir, daß kein örtlicher Fehler die Ursache des Schlagflusses ist, dann wende man, je nachdem die Asthenie direkter oder indirekter Beschaffenheit ist, die sthenische Methode in ihrem ganzen Umfange und von allen Seiten an. Die nöthigsten Mittel sind:

- 1) Vor allen Dingen lege man den Patienten beym Anfalle auf den Rücken und mit dem Kopfe aufrecht. Nur wisse man, daß die angezeigten Mittel vorzüglich auf den besonders leidenden Theil, welches meistens der Kopf ist, appliziert werden müssen.
- 2) Reibe man wo möglich mit gewärmten Flanell-Lappen den ganzen Körper, oder wasche denselben mit starkem Brantweine.
- 3) Auf dem Kopfe mache man Bähungen von Brantwein, blase etwas Tabaksrauch oder gestossenen Pfeffer in die Nase, und verfare übrigens wie beym Scheintode.
- 4) Ist Jemand nach Tische, nach Ueberladung von blähenden und gährenden Speisen schlagflüssig geworden, dann gebe man ihm ein Brechmittel von Nro. IV. V. VI. oder VII. reizende Klystire, oder nach Befinden der Umstände ein Abführungsmittel von Nro. VIII., weil dieser Schlagfluß aus einem örtlichen Leiden des Magens entstanden ist.
- 5) Wo man zu heftigen Andrang des Blutes nach den Kopf bemerkt, lege man ein Rubefaciens im Nacken und auf die Fußsohlen, reibe von Nro. XIV. fleissig die Schläfe, das Rückgrat und die Herzgrube, und applizire ähnliche Klystire besonders

ders von Tabaksrauch, oder von abgekochtem gestoffenen Senf, jedoch so, daß man in einer Kolatur von zehen Unzen drey Gran Brechweinstein auflösen läßt.

Arzneymittel. Man erwäge bey der Anwendung derselben immer, daß der vorliegende Zustand gleich sey dem zweyten Grade der Hyperasthenie. Daher folgendes Verfahren.

1. Reibe man von Nro. XIV. fleißig in die Schläfe, von Nro. XV. eben so fleißig in das Rückgrat, den Unterleib und die Fußsohlen ein.
2. Ist der Fall irritabler Art, dann rathe ich vorzüglich zu Nro. XXXV. oder zu 6 bis 10 Gran Moschus, solange zu gebrauchen, bis der Torpor nachläßt. — Sodann lasse man ein Infusum von Valerian, Arnica und Flor. Chamomil. roman. bereiten, unter einer Kolatur von 6 Unzen noch 2 Skrupel Castoreum-Pulver mischen, und Eßlöffelweis nehmen. Nebenbey Thee von Ingwer oder Senf trinken u. s. w. (S. erster Th. §. 169.)
- 3) Ist der Fall sensibler Art, dann greife man außer oben gedachten Einreibungen entweder zu Nro. XXVI. oder XXII.; und wenn der Torpor verschwunden ist, zu Nro. XXX., wobey man nebenher noch Pfeffermünzthee kann trinken lassen. (S. erster Theil. §. 169.)

Hierbey bleiben Bäder, mit gehöriger Vorsicht angewendet, besonders von reiner Senfabkochung und Branntwein bereitet, ein souveränes Mittel.



XXVI.

Starrfucht. *Catalepsis.*

D e f i n i z i o n.

Starrfucht heisst plötzlicher Verlust der willkührlichen Bewegungen und des Bewusstseyns, wobey der Körper in derselben Lage und Stellung bleibt, welche er vor dem Anfalle angenommen hatte, so dass die Glieder ihre Bewegsamkeit noch beybehalten, und der Puls und Athem fortdauern.

Die Behandlungsart bleibt nicht nur dieselbe, wie bey dem Schlagflusse, über den die Starrfucht noch hinausliegt, folglich gleich ist dem dritten Grade der Hyperasthenie der willkührlichen Bewegungsorgane, sondern eben darum müssen wir uns hier nicht der Arzneymittel 3. überhaupt, sondern derer in noch stärkern Dosen bedienen, so wie auch der Einreibungen und Bäder.

XXVII.

Lähmung. *Paralysis.*

D e f i n i z i o n.

Lähmung ist der Verlust der Bewegung und Empfindung eines oder des andern Theiles unseres Körpers

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche jener Lähmungen, welche überhaupt von Asthenie herrühren, gehet sehr oft eine Schwere, blasse Farbe, Betäubung und trägere Bewegung eines oder des andern Glied-

Gliedes, manchmal eine Verdrehung oder ein Zittern in demselben vorher. Man bemerkt Schwindel, Betäubung, unwillkührliche Thränen und Verzagtheit, Abnahme des Gedächtnifs und der Verstandeskräfte.

2) Beym Ausbruche unterscheide man folgende Arten:

a) Entweder sind alle Glieder an einer Seite, den Kopf ausgenommen, gelähmt, dann heist sie halbseitige Lähmung.

b) Oder es sind alle Gliedmassen des ganzen Körpers unter dem Kopfe gelähmt, dann heist dieser Zufall allgemeine Lähmung.

S c h ä d l i c h k e i t e n .

Dieselbe wie beym Schlagflusse.

H e i l u n g s k a r a k t e r .

Lähmung ist ein parzieller Schlagfluss. (S. m. Entwurf. Th. II. §. 440. etc.)

H e i l a n z e i g e .

Wie bey dem Schlagflusse. Nur bemerke folgende Punkte noch:

1. Muß im Durchschnitte die indizirte Methode zugleich noch örtlich an den gelähmten Theil angewendet werden, besonders je empfindungsloser derselbe ist. In welchem Falle im Durchschnitte auf eine vorzügliche Affektion der sensiblen Funkzion geschlossen werden, und darum eher Kohlenstoff angewendet werden muß, gleich der Hyperasthenie, oder dem Schlagflusse.



- 2) Je empfindlicher aber der bewegungslose Theil ist, desto mehr muß man nicht nur die Ursache der Lähmung in einer asthenischen Affektion des irritablen Systems suchen, daher eher stickstoffhaltige Mittel anwenden, sondern desto mehr muß man den gelähmten Theil mit der örtlichen Behandlung verschonen.

H e i l v e r f a h r e n.

Ist gleich dem beym Schlagflusse, nur mit Berücksichtigung der bey der Heilanzeigen angegebenen Momente.

Uebrigens verweise ich hierüber, was die totale Rekonstruktion dieses Zufalles anlangt auf meinen Entwurf Th. II. §. 437 seq.

XXVIII.

Schlaffucht. *Sopor.*

D e f i n i z i o n.

Schlaffucht ist ein unnatürlicher tiefer, lange anhaltender Schlaf.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Alle positive und negative Reitze, z. B. heftiger Andrang des Blutes nach den Kopf, beträchtlich starke Stöße auf denselben, Mißbrauch des gewöhnlichen Schlafpulvers, kurz: alle heftig und schnell inzitirende Potenzen, z. B. einzelne Gifte u. s. w. Ferner: starke Blutflüsse, groÙe Kälte u. s. w.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Relative Depotenzirung der Sensibilität. Da nun aber diese gesetzt werden kann durch Hypersthenie
und

und Hyperästhenie, so muß der Heilungskarakter eben darum als ein möglicher doppelter angenommen werden.

H e i l a n z e i g e .

Man entferne die relative Depotenzirung der Sensibilität, je nachdem der eine oder der andere beyder möglichen Fälle vorhanden ist. Jedoch bemerke man, daß der hypersthenische als solcher nicht lange andauert, ohne entweder in den Tod, oder wo möglich in Hyperästhenie überzugehen.

H e i l v e r f a h r e n .

Meistens ist daher anwendbar die positive Methode wie beym Scheintode nach Beschaffenheit der vorausgegangenen Schädlichkeiten. Nur bemerke man, daß man diesen Fall immer wie Hyperästhenie behandeln müsse. Ausgenommen da, wo zu sthenischen Krankheiten sich Schlaffucht gesellet, hebe man die Krankheiten selbst bald durch die denselben angemessene Methode, weil sonst sehr schnell Hyperästhenie entstehet.

Arzneymittel. Zu den gewöhnlichern Fällen gehört es zwar, daß die Schlaffucht, nachdem wie sie gewöhnlich sich einstellt, irritablen Ursprunges ist, daher Nro. XXXV. XXXII. oder noch besser oft Nro. XXV. schnell wirksam sich zeigen. Allein wenn dieselbe entweder ursprünglich sensibler Art war, oder aus Ursache ihrer zu langen Andauer letztere Beschaffenheit erst angenommen hat, so greife man nach Nro. XXVII. oder XXVI. und verfähre übrigens wie beym Scheintode überhaupt.

K r a m p f . S p a s m u s .

D e f i n i z i o n .

Krampf ist eine verstärkte, gewaltfame, anhaltende und unwillkührliche Zusammenziehung der irritablen Fasern irgend eines Theils unseres Körpers, verbunden mit Anstrengung, den auf ihn haftenden Schmerz zu erleichtern.

S c h ä d l i c h k e i t e n .

Alle negative und positive Reitze z. B. häufige Nachschweisse, Erkaltungen, Diarrhöe, Ruhr; häufiger Genuß von Säuren, grofse Kälte, Brech - Laxir - und Aderlafs - Gewohnheit, Frühlingskuren, Blutflüsse. Ferner hoher Grad von Trunkenheit, heftiger Zorn, beträchtliche Körperanstrengung z. B. grofse Fußreisen u. f. w.

H e i l u n g s k a r a k t e r .

Dieser Zufall kann sthenischen und asthenischen Ursprungs seyn. (S. m. Entwurf. Th. II. 337. seq.)

H e i l a n z e i g e .

Gleich entweder der Sthenie oder Asthenie,

H e i l v e r f a h r e n .

Ist der Krampf sthenischen Ursprungs, dann suche man vorerst auszukundschaften, ob der vorhandene Zustand des Organismus noch rein sthenisch oder hypersthenisch ist, und verfähre dann in beyden möglichen Fällen wie beym Entzündungsfieber überhaupt angegeben worden ist.

Wich-



Wichtiger und angelegener ist uns indeffen hier der asthenische Krampf. Bey der Behandlung desselben bemerke man indeffen überhaupt vorerst wo möglich die Schmerz und Krampf erregenden Schädlichkeiten zu entfernen, wenn dieselben noch vorhanden sind.

Sodann suche man zu erfahren, ob die vorhandene Krankheit rein asthenisch oder hyperasthenisch ist, was aus dem Grade und Vorhandenseyn der Empfindlichkeit und Reizbarkeit, oder aus der totalen Abwesenheit derselben erkennbar ist u. s. w.

Endlich erkundige man sich nach derjenigen Funktion, oder demjenigen Theil, welcher der vorzüglich oder auch ursprünglich angegriffene sey, und vergleiche dann das Leiden desselben mit dem Grade der Krankheit, um ganz bestimmt auf den vielleicht möglichen Wechsel der ursprünglichen Art der Krankheit schliessen, und auf diese Weise die gegenwärtig vorhandene Beschaffenheit der Krankheit zu erfahren.

Im Allgemeinen können indeffen zur Heilung von Krampffällen gebraucht werden, z. B. Thee mit Wein, Brantwein, Rhum, Arrak, ein Glas Wein, Hoppelpoppel- geistige Einreibungen, Frottiren mit Flanell, der mit Mastix durchräuchert ist, Senf-Fussbäder, ganze lauwarne Bäder, Flanell auf blossen Leibe getragen, kräftige, gewürzhafte, und leicht verdauliche Zubereitungen von Fleisch z. B. Fleischbrühe mit Zimmt, Muskatennüsse, Pfeffer etc. einige Tassen Kaffee mit Rhum oder Pfeffer etc.

Arzneymittel. Die Qualität, Form, so wie die Dosis und besondere Anwendung derselben richtet sich theils nach der Qualität theils nach dem vorhandenen



nen Grade der Krankheit selbst; weshalb ich, was die totale Rekonstruktion dieses Zufalles betrifft, auf meinen Entwurf Th. II. S. 349. seq. mich berufen muss, und hier mich begnüge, blos die wichtigsten Fälle anzugeben, und ihrer adäquaten Behandlungsart überhaupt hier nur zu gedenken. Nämlich

- 1) Angenommen, der Fall sey irritabler Art, und der Krampf mit heftigen Schmerzen verbunden, folglich rein asthenischer Beschaffenheit, dann empfehle ich vorzüglich den Gebrauch von Nro. XXXV. viertel - oder halbstündig zu 10 — 15 Tropfen, oder blos die Essentia Castorei zu 10 bis 12 Tropfen; oder auch von Nro. XXXII. halbstündig zu 12 bis 15 Tropfen, alles am besten in Chamillen- oder Baldrianthee gegeben.
- 2) Gefellt sich aber zu diesem Krampf Torpor, besonders des vorzüglich affizirten Theils, dann sehe man den Fall als hyperasthenisch an, und verfähre äußerlich mit Nro. XXI. und innerlich steige man entweder mit Nro. XXXV. zu vierzig bis sechzig Tropfen, oder man wende Nro. XXV. an.
- 3) Ist der Fall ursprünglich schon sensibler Art, mit heftigen Schmerzen verbunden, folglich gleichfalls auch asthenischer Art, dann rathe ich entweder zu Nro. XXIV. oder zu Nro. XXXIII. davon aller halben Stunden 10 bis 15 Tropfen in Pfeffermünzthee zu nehmen.
- 4) Aendert er aber sich nun wie 3), oder geht die ursprünglich irritable Asthenie in die zweyte Hälfte der Hyperasthenie über, dann mache man von Nro. XIV. oder XV. Gebrauch, und verbinde damit
inner-



innerlich entweder Nro. XXVII., oder wenn dieses nicht zureichen sollte, Nro. XXVI.

XXX.

Mundsperrre. *Trismus.*

D e f i n i z i o n.

Mundsperrre ist ein Krampf, welcher die Kinnlade zusammenpresst, steif und unbeweglich macht.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Dieselben des Krampfes überhaupt.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Hyperästhenie vom zweyten Grade, von welcher besonders das Rückenmark, die Interkostalnerven, und mittelst derselben die Kinnlade ergriffen ist.

H e i l a n z e i g e.

Wie bey dem Krampf überhaupt, nur mit besonderer Rücksicht auf die Affektion der Kinnlade.

H e i l v e r f a h r e n.

Ist dasselbe, wie bey dem Krampf, nur mit dem Unterschiede, daß die Mundsperrre anfänglich schon gleich dem zweyten Grade der Hyperästhenie behandelt, und darum die Heilmethode vorzüglich auf das Rückgrat, auf die Rippennerven und Kinnladen noch angewendet werden muß.

A r z n e y m i t t e l.

1. Ist der Fall irritabler Beschaffenheit, dann rath ich äußerlich nicht nur überhaupt zu Bädern, be.



besonders mit einem Zusatze von einer Auflösung des lapis causticus, und Einreibungen von Nro. XXI., sondern innerlich vorzüglich entweder XXV. oder zu XXXV.

2) Ist er aber sensibler Art, dann greife man zu Branntwein-Bädern, Einreibungen von XIV. oder XV., und innerlich besonders zu Nro. XXVI., worauf man, wenn der Anfall selbst gehoben ist, von Nro. XXX. Gebrauch machen kann.

XXXI.

Starrkrampf. *Tetanus.*

D e f i n i z i o n.

Starrkrampf ist eine heftige, lange andauernde und unwillkührliche Zusammenziehung entweder des ganzen Körpers, oder des Halses u. s. w. so dass der Körper der Länge nach ausgestreckt daliegt, hart und unbeweglich ist, und womit gewöhnlich, obgleich nicht immer, Verlust des Bewusstseyns verbunden ist.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Sind die der Mundsperrre, besonders unmäßige Hitze, Armuth, Verwundungen u. s. w.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Hyperästhenie vom dritten Grade, von welchem besonders die Muskeln des Rückgrates befallen sind.

Heil-

Heilanzeigen und Heilverfahren.

Sind darum gleich der beym Trifinus, nur mit dem Unterschiede, daß man dieselbe Methode noch mehr, als bey der Mundsperrre, verstärken, und die indizirten Mittel besonders auf das Kückgrat äußerlich anwenden muß. Jedoch wird man am sichersten dabey im Durchschnitte zu Werke gehen, wenn man vorerst wenigstens zum äußerlichen Gebrauch zu Nro. XIV. oder XV. zum innerlichen Gebrauch aber zu Nro. XXVI. oder nach Befinden der Konstitution, wenn nämlich dieselbe thoröfer Art ist, zu Nro. XXXIV. greifet.

Diät und Hausmittel bleiben übrigens dieselben wie beym Krampf überhaupt.

XXXII.

Fallfucht. *Epilepsia.*

D e f i n i z i o n.

Fallfucht ist ein Anfall von heftigen allgemeinen Zuckungen des ganzen Körpers, mit Mangel des Bewusstseyns und der Empfindungen.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Der Geist wird stumpf, die Sinne matt, das Aussehen aufgedunsen, stupid; es stellet sich Schwindel, Schwere des Kopfes, Druck über den Augen, Schwere in den Gliedern, Ohrenklingen, Vergesslichkeit und ein besonderes Ameisenlaufen in irgend einem Theile des Körpers aus nach dem Kopfe zu u. s. w. ein.



- 2) Beym Ausbruche. Auf einmal stürzt Patient mit blassem Gesichte, mit einem Geschrey und ganz besinnungslos zu Boden, schäumt, schlägt die Daumen ein, schlägelt mit dem Kopfe und Gliedern, verdreht fürchterlich die Augen mit den heftigsten Konvulsionen durch den ganzen Körper. Hierzu gesellet sich unwillkühlicher Abgang des Urins, des Kothes und Samens.
- 3) Bey der Zunahme bis zu ihrer Höhe. Der Athem wird stark und röchelnd, die Zunge verbissen, der Kranke fällt in einen festen oder schlagflüssigen Schlaf. Dieß dauert längere oder kürzere Zeit.
- 4) Bey der Abnahme. Patient erwacht, weiß von nichts, was mit ihm vorgegangen ist, ist meistens noch einige Zeit gelinde verwirrt, wird hernach auf einen oder mehrere Tage traurig und sehr mit Blähungen geängstigt; klagt über Wehthun im Kopfe und den Gliedern. Kommt das Uebel öfterer, so wird er zuletzt ganz stupid.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Fortdauernde Anlage zur Epilepsie, Lähmungen, Wassersucht, Wahnsinn, Melancholie.
- b) Tödliche. Schlagfluß.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Kälte, schlechte Nahrung, feuchte und verdorbene Luft, Blutflüsse, Gram, Schrecken, Onanie, Ausschweifungen in der Liebe, im Trinken geistiger Getränke, und Geistesanstrengung u. s. w.

Heil-

Heilungs k a r a k t e r.

Dekomposition in dem willkürlich beweglichen Organe, veranlaßt und unterhalten durch eine bestimmte Individualität des zweyten Grades der Hyperasthenie. (S. m. Entwurf. Th. II. §. §: 388. 392.)

Heil a n z e i g e.

Beseitigung der vorhandenen Hyperasthenie im Allgemeinen nach der Qualität der Sensibilität,

Heil v e r f a h r e n.

Im Allgemeinen,

1. Beym Anfalle selbst mache man viel Geräusch um den Ohren, halte aufgeschnittene Zwiebeln oder angebrannte Federn unter die Nase, blase dem Kranken Pfeffer in die Nasenlöcher, wasche die Schläfe und Pulsader der Handgelenke mit Wein, Brantwein, reibe denselben auch warm in die Herzgrube und längst dem Rückgrate ein, Hände und Füße reibe man recht mit warmen Tüchern, gebe reizende Klystire besonders von Tabak oder Tabaksrauch etc,
- 2) Um dergleichen Anfälle zu verhüten, unterbinde man den Theil, von welchem manchmal der Vorbote ausgeht, sogleich als er seine Ankunft verkündet. Ausserdem kann man auch sogleich alle die gedachten Mittel anwenden, so wie man schon im Stande ist, durch angemessene und nahrhafte Diät die Anfälle selbst zu verringern und zu vermindern.

Arz.



Arzneymittel.

- 1) Man lasse von Nro. XIV. oder XV. das Rückgrat und die Herzgruben einreiben, Klystire von Arnica, Valer, Chamomillen mit Naphta etc. geben.
2. Wenn Patient etwas schlucken kann, rathe ich zu XXVI., sodann wenn der Zufall nachläßt, sich mindert, und die Krankheit ursprünglich schon sensibler Natur ist, greife man zu Nro. XXX. Sollte aber dieser Zufall, wie sehr häufig der Fall ist, ursprünglich irritabler Art seyn, dann rathe ich von Nro. XXVI. zu Nro. XXXII. dann zu Nro. XXII., und späterhin zu Nro. XXXII. überzugehen, und dann nach der im ersten Theile §. 167. gegebenen Anleitung zur völligen Wiederherstellung des Kranken zu verfahren.

XXXIII.

Wasserscheue. *Hydrophobia.*

D e f i n i z i o n.

Wasserscheue ist ein besonderer Abscheu vor allem Getränke, mit oder ohne Raserey.

Z u f ä l l e.

Ist die Vergiftung geschehen, so vergehet einige Zeit, in welcher der Kranke nichts spürt. Endlich wird die Wunde, die schon geheilt war, wieder roth, ohne veranlassende äußere Ursache. Dazu gesellet sich Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Widerwillen gegen Speise und Trank, ein gewisser Grad von Bräune, wobey das Schlucken gehindert wird.

Mit

Mit einem Male kann Patient keine Flüssigkeit mehr schlucken, er empfindet schon Schauder beym Anblicke derselben, er wirft beständig Speichel aus, wüthet bisweilen, will beißen u. s. f. Diese Krankheit endiget gewöhnlich mit Konvulsionen, die den Tod bringen, oft binnen zwey oder drey Tagen.

S c h ä d l i c h k e i t.

Vergiftung wüthender Thiere durch den Speichel.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Konvulsivische Bewegung bewirkt durch den dritten Grad der Asthenie vorzüglich der Speicheldrüsen.

H e i l a n z e i g e.

Depotenzirung der Sensibilität besonders in dem vorzüglich angegriffenen Theile.

H e i l v e r f a h r e n.

Vor allen Dingen suche man den Ausbruch dieses Uebels zu verhüten. Die Mittel dazu sind im Allgemeinen:

- a) Vorerst lege man oberhalb des verletzten Theiles feste Binden an.
- b) Ist ein geschickter Chirurg vorhanden, so lasse man gleich die gebissene Stelle ausschneiden. Außerdem wasche man die Wunde gleich mit stark gesättigtem Salzwasser oder Seifenfiederlauge aus, mache rings um die Wunde blutige Einschnitte, lege einige Schröpfköpfe darauf, und lasse dieses so lange ziehen, bis alles Blut aus dieser Stelle ausgefogen ist. Hierauf streue man Schießpulver

in



in die wunde Stelle, zünde dasselbe an, lege sodann ein spannisches Fliegenpflaster darauf, und lasse die Stelle ganz auseitern.

Arzneymittel allein vermögen es nur, diese Krankheit, wo möglich noch zu heben. Nämlich:

- a) Um zu verhüten, daß sie nicht zum Ausbruche komme, rathe ich nach erfolgtem Biss [zu Nro. XXXII. Erfolgt der Ausbruch, aber noch nicht sehr heftig, dann gebe man entweder Nro. XXXV. 60 bis 100 Tropfen, oder 10 — 15 Gran Moschus; Außerdem aber greife man nach Nro. XXVI., vergesse aber dabey ja nicht die Einreibungen entweder von Nro. XXIII. oder von Nro. XIV. in den Hals. (S. m. Entwurf. Th. II. etc.)

XXXIV.

Unverdaulichkeit. *Dyspepsia.*

D e f i n i z i o n.

Unverdaulichkeit ist Mangel an Appetit mit Schwäche des Verdauungs - Vermögens.

Z u f ä l l e.

- A) Anfänglich verringert sich der Appetit, wir können die gewöhnliche Menge und Qualität der Nahrungsmittel nicht mehr ohne Beschwerde und Aengstlichkeit vertragen, und der Stuhlgang wird auch träger.
- B) Endlich fällt der Appetit immer mehr und mehr weg, die Verdauung wird geringer und schwächer;



cher; nach jedem Genuße von Speisen hat man eine Empfindung von Vollheit in der Herzgrube und dem Unterleibe, mit Aufblähung desselben. Hiernit verbindet sich äußerst sparsamer Stuhlgang, Stuhlzwang, zuweilen mit Erbrechen, Aengstlichkeit, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Magenweh, sauerem Aufstoßen u. s. w.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Zu heftige oder zu lange anhaltende Einwirkung sowohl positiver als negativer Einflüsse vorzüglich auf die Verdauungsorgane. Nämlich: a) schlechte Nahrung, sitzende Lebensart, Traurigkeit, Kummer, häufiger Genuß von Obste, Säuren, Pflanzenspeisen, schlechtes Wasser, modisches Purgiren, jährliche Frühlingskuren. b) Mißbrauch von stark gewürzten und sehr nahrhaften Speisen, Ausschweifungen im Genuß geistiger Getränke, zu große und anhaltende Anstrengungen des Gemüthes, des Geistes und Körpers, häufiges Theetrinken.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Es ist nicht zu läugnen, daß mancherley organische Fehler der zum Verdauungsgeschäft beytragenden Organe, so wie andere örtliche Leiden z. B. Ueberladung des Magens auf eben so mancherley Art Unverdaulichkeit erzeugen können. Allein erstere Fehler sind feltener, als man gewöhnlich glaubt, und können von uns auch hier nicht besonders berücksichtigt werden; und letztere Leiden dauern entweder nicht sehr lange an, oder bewirken endlich den Grad von asthenischer Affek-

Affektion des Magens, welcher die Unverdaulichkeit setzt. Indessen richtet sich der Heilungskarakter nach den Erscheinungen, d. h. bey *A.* ist noch reine Asthenie, bey *B.* dagegen Hyperasthenie. (S. m. Entwurf Th. II. §. 1453. 1459)

H e i l a n z e i g e.

Depotenzirung der Sensibilität ins Besondere der Verdauungsorgane, und zwar:

- a) Nach dem Grade der Asthenie *A* oder *B*.
- b) Nach der Qualität der Verdauungsorgane d. h. der Sensibilität.
- c) Nach der Form der Differenz derselben.

H e i l v e r f a h r e n.

Nur eine zweckmäßige und gehörige Anwendung der potenzirenden Methode kann diese Form des Uebels allein gründlich heilen. Nur vergesse man hierbey die erste Regel nicht, nämlich daß die angegebenen Mittel bey reiner Asthenie (S. Zufälle *A.*) in kleinen Quantitäten, in kurzen Zwischenräumen wiederholt, und immer mehr verstärkt; bey Hyperasthenie hingegen (S. Zufälle *B.*) anfangs in großer Quantität und in großen Zwischenräumen, aber immer mit Verminderung ihrer Stärke gegeben werden müssen.

Die angezeigten Mittel sind folgende:

I. Diät. Hieher rechne ich vorzüglich:

- 1) Fleischspeisen, jedoch mit der Einschränkung, daß dieselben anfangs wenigstens, meist in flüssiger, weicher und geleeartiger Form genossen werden.

2)

- 2) Eyer, roh mit etwas Zucker und Zimmt, oder das Gelbe davon mit Fleischbrühe oder warmem Wasser und Rhum, oder mit abgefottener Milch, ist ohnstreitig eines der vorzüglichsten Hülfsmittel gegen die Unverdaulichkeit.
- 3) Milchspeisen, wenn nicht eine besondere Idiosyncrasie des Magens sie verbiethet, sind sehr rathsam.
- 4) Häufige Bewegung, Reiten, täglicher Genuß reiner Luft, Heiterkeit des Gemüthes; kurz alles, was den Körper beleben und stärken kann, ist hier angezeigt.

II. Hausmittel.

- 1) Bittere Essenzen, bittere Kräuterweine, ein Abfud von Wermuth, Rhum oder guter Branntwein mit warmem Wasser und Eygelbe, oder ganz pur, nach Befinden der Umstände und nach Geschmack des Kranken, sind hier vorzüglich heilsam. Nur gebe man bey reiner Asthenie wenig davon auf einmal und öfterer; bey Hyperasthenie mehr und seltener.
- 2) Ingwerthee, d. i. ein halbes Quentchen mit einer Tasse kochenden Wasser übergebrühet, öfters umgerührt, und nach einer Viertelstunde das darauf stehende Wasser davon abgegossen und täglich drey bis vier Tassen getrunken, auch täglich ein- bis zweymal eine Messerspitze voll in Fleischbrühe genommen, empfehle ich als ein vorzügliches Mittel gegen asthenische Unverdaulichkeit.



- 3) Zerquetschter Senfsame täglich zu einem Theelöffel voll unter einer Tasse Fleischbrühe genommen, wirkt gleichfalls vortrefflich, besonders bey hyperasthenischer Unverdaulichkeit, z. B. bey starken Weintrinkern u. s. w.
- 4) Ist mit der Unverdaulichkeit Schmerz im Unterleibe verbunden, dann kann man ihn mit einem Bierglase voll warmen Wasser, wozu man etwas Brantwein gießen kann, beynahe augenblicklich heben. Eben so kann Thee von Kümmel, Pfeffermünze oder Chamillen auch getrunken werden.
- 5) Vorzüglich rathe ich an, alle Abende den ganzen Körper mit lauwarmem Seifenwasser abzuwaschen, und einige Minuten lang nachher zu frottiren. Besonders aber reibe man einigemal täglich den Unterleib mit bloßer Hand oder Flanell.
- 6) Auch bittere Biere, die eben nicht sehr schwer verdaulich sind, können hier sehr gut benutzt werden. Eben so rothe Weine und Bischof.
- 7) Morgens vor oder nach Tische 10 weiße Pfefferkörner verschluckt, heben manchmal schon allein rein asthenische Unverdaulichkeit.

Arzneymittel. Die Anwendung derselben richtet sich im Allgemeinen zunächst nach dem Grade der Unverdaulichkeit. Nämlich:

- 1) Ist die Unverdaulichkeit noch im Werden, lasse man entweder von Nro. XXXIII., oder von Nro. XXXIX. oder wenn stärkere und anhaltendere Erregung nöthig ist, von Nro. XL. gebrauchen.



- 2) Nimmt sie zu, verbunden mit krampf- und schmerzhaften Kolikanfällen, dann greife man nach Nro. XXXVIII.
- 3) Verliert sich dabey alles Gefühl im Magen, stellt sich Kälte im Unterleibe ein u. f. w., dann ist es nicht nur ein Beweis von dem Uebergange dieser Krankheit in Hyperästhenie, sondern unser Verfahren muß sich nunmehr auch diesem Umstande akkommodiren, was vorerst geschehen kann und wird, sowohl durch die äußere Anwendung von Nro. XLII. auf den Magen und Unterleib eingerieben, als durch den innern Gebrauch von Nro. XXXVII. oder XXXVI. Sollte aber die Unverdaulichkeit ihren möglich höchsten Grad von Ausbildung erstiegen haben, dann rathe ich zu Nro. XXVI. u. f. w.

XXXV.

Sodbrennen. *Pyrosis.*

Definition.

Sodbrennen ist eine unangenehme Empfindung einer Hitze im Magen, die durch die Speiseröhre in die Höhe steigt, und bisweilen einen häufigen Zufluß von Speichel in dem Munde verursacht.

Zufälle.

Säure im Magen verrathet sich durch einen sauern Geschmack, saures Aufstossen und Brennen im Magen, starken Appetit, Mangel an Durst, Blässe des Gesichtes und der Lippen, grüne Farbe und sauern Geruch der Ex-



kremete, Stumpfheit der Zähne, wässerigen Urin mit dickem Bodensatze, Kälte und Schläffheit der Haut u. s. w.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Gleich denen der Unverdaulichkeit.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Reine Asthenie der Absonderungsgefäße des Magens. (S. m. Entwurf. Th. II. §. 1346. seq.)

H e i l a n z e i g e.

Entfernung der Asthenie dieser Gefäße zunächst des Magens, und zwar a) nach Qualität der Sensibilität, b) nach der Form oder nach der Differenzbestimmung dieser Funkzion.

H e i l v e r f a h r e n.

Im Allgemeinen ganz dasselbe wie bey der Unverdaulichkeit; besonders rathsam ist hier ein Absud von Wermuth, ein Gläschen bitteren Branntweins, Hoppelpoppel, frische Eyer, Pfeffermünzthee, schwarzer Kaffee mit Ingwer, Pfeffer oder Senf, Pfefferkörner u. s. w. sehr schnell oft heilsam.

Arzneymittel. Bey allem dem aber kann man seinen Zweck noch früher und zuverlässiger im Durchschnitte erlangen, wenn man Senf-Fußbäder gebrauchen, und nach dem Grade der reinen Asthenie, zu welcher sich das Sodbrennen gesellt, entweder von Nro. XL. oder XXXIX. oder im höhern Grade von Nro. XXXVII. anwenden läßt.

XXXVI.

Ekel und Erbrechen. *Nausea et Vomitus.*

D e f i n i z i o n.

Erbrechen heist die Umkehrung der wurmförmigen Bewegung des Magens, bey welcher die in dem Magen enthaltenen Massen durch den Oesophagus, Schlund und die Mundhöhlen gewaltsamer Weise ausgeworfen werden. Die Neigung dazu heist dann Ekel.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Genossene Gifte, Ueberladung des Magens, Magenentzündung u. s. w. von deren Behandlung noch in der Folge gesprochen werden wird, erregen auch zuweilen diese Zufälle. Ausserdem aber können die bey der Unverdaulichkeit angeführten Schädlichkeiten diese Art von Uebelbefinden sehr leicht herbeyführen.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Krampfhafte Affekzion des Magens mit Umkehrung der Richtung seiner Bewegung, möglicher Weise sowohl rein asthenischer; als hyperasthenischer Natur. (S. m. Entwurf, Th, II. §. 1435. seq. 1453.)

H e i l a n z e i g e.

Dieselbe wie bey der Unverdaulichkeit.

H e i l v e r f a h r e n.

Gleichfalls wie bey der Unverdaulichkeit, nach dem Grade der reinen Asthenie oder Hyperasthenie.

Nur



Nur vergesse man nicht zu bemerken, daß die Reizbarkeit des Magens oft so groß ist, daß er auch das geringste, was er bekommt, wieder wegbricht. In diesem Falle hüte man sich ja, dem Kranken nichts schlucken zu lassen; sondern man behandle ihn bloß äußerlich. Besonders empfehle ich einen Umschlag von gewöhnlichen Pfefferkuchen mit Wein oder Brantwein zu einem Teich geknetet, oder statt des Pfefferkuchens Roggenmehl mit vielem Pfeffer vermischt, und eben so zu einem Teiche bereitet, außen auf die Herzgrube zu legen, denselben öfterer zu erneuern. Nebenbey lasse man fleißig Ingwerthee alle zwey bis drey Stunden eine Tasse voll trinken, oder gestossenen Ingwer Messerspitzenweis mit Fleischbrühe eben so oft nehmen, das Rückgrat und den Unterleib mit Brantwein waschen, und alle Abende ein Senf-Fußbad nehmen. Uebrigens gilt alles, wie bey der Unverdaulichkeit angegeben.

In dem eben erwähnten Falle kann man sich auch mit großem Nutzen der Einreibungen von Nro. XLI. oder XLII. in die Magengegend bedienen, so wie der bey der Unverdaulichkeit nach den verschiedenen Graden desselben bestimmten Arzneymittel.

XXXVII.

Magenkrampf. *Dyspepsodynia.*

D e f i n i z i o n.

Magenkrampf ist eine ängstliche oft schmerzhaftige Empfindung in der Gegend des Magens.

Zu-

Z u f ä l l e.

Ein ängstlicher, zuschnürender Schmerz in der Magengegend mit Hartleibigkeit, Rückenschmerzen, Neigung zum Erbrechen, oder wirkliches Erbrechen, kalte Extremitäten oft mit Krämpfen, schrecklichem Herzklopfen, Ohrensausen und Ohnmachten verbunden.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Wie bey der Unverdaulichkeit; besonders aber Obst, Sallat, Limonade, Punsch, schlechter saurer Wein oft und in Menge zu sich genommen, sind die gewöhnlichsten Schädlichkeiten.

Heilungskarakter, Heilanzeige und Heilverfahren sind ganz dieselben wie bey der Unverdaulichkeit. Nur wie er gewöhnlich vorkommt, ist er gewöhnlich auch Folgewirkung eines höhern Grades der reinen Asthenie des Magens, nicht selten gleich dem vorhin gedachten Falle des Erbrechens, womit er dann auch meistens verbunden ist. Daher auch die vorhin angegebene Bemerkung auch hier gilt.

XXXVIII.


K o l i k. *Colicodynia.*

· D e f i n i z i o n.

Kolik heist jeder Schmerz im Unterleibe, vorzüglich um den Nabel herum.

Z u f ä l l e.

Ein Schmerz in den Gedärmen, welcher bald sich nur um dem Nabel herumzeigt, bald aber Schluchzen,
Er-



Erbrechen und allerley krampfge Anfälle erreget, bald periodisch, bald anhaltend ist, späterhin mit Durchfall, Verstopfung oder Auftreibung des Unterleibes, heftiger Angst, unterbrochenem Athem, kleinem, schnellem, schwachem Puls zum Vorschein kommt.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Darmentzündung, hartnäckige Verstopfung, und Verengerung des Darmkanals.
- 2) Tödliche. Brand des Unterleibes.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Wie bey der Unverdaulichkeit. Vorzüglich Erkältungen, blähende Speisen bey sonst schwachem Magen und vielleicht noch häufig genossen u. s. w.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Gleiche Affekzion der dünnen Gedärme, wie die des Magens bey dem Magenkrampfe, nur mit dem Unterschiede, daß bey der Kolik gewöhnlicher als bey dem Magenkrampfe eine Luftentwicklung in denselben sich hinzugesellt.

H e i l a n z e i g e.

Dieselbe wie bey dem Magenkrampfe.

H e i l v e r f a h r e n.

Ganz dasselbe wie bey der Unverdaulichkeit, oder dem Magenkrampfe. Vorzüglich sey man nur darauf bedacht, durch Tabaksklystire und nach Befinden der Umstände fleissige Einreibungen in den Unterleib die vorhandenen Krämpfe zu heben.

Die

Die Arzneymittel betreffend, rathe ich hier vorzüglich äußerlich Nro. XLI. oder XLII. anzuwenden, und innerlich Nro. XXXVI. oder XXXVII. brauchen zu lassen.

XXXIX.

Verstopfung. *Colycaëdyne.*

Ich meyne hier besonders jene Hartleibigkeit, welche entsteht, wenn durch die Gefäße der Oberfläche unseres Körpers viel Schweiß verloren gehet, wodurch die Einsaugung des Darmkanals vermehret, dadurch Trockenheit in den Därmen, und endlich Hartleibigkeit erzeugt wird. Man beobachtet diesen Zufall auf langen Reisen oder Fahren, auf hitzige Arzneyen, Nahrungsmittel und Getränke der Art. u. s. w.

Bey dieser Hartleibigkeit nützen warme Bäder, Mandelöl, verdünnende Getränke, viel Zucker in Wasser aufgelöst, Bestreichen des Körpers mit Oel. u. s. w.

Die übrigen Arten von Verstopfungen richten sich ganz nach der Behandlung der Unverdaulichkeit im Allgemeinen.

XL.

Durchfall. *Diarrhoea.*

D e f i n i z i o n.

Durchfall ist ein häufiger dünner Stuhlgang mit oder ohne Leibes Schmerzen, zuweilen auch mit etwas Fieber verbunden.

Schäd-

Schädlichkeiten.

Sind dieselben, wie bey den bisher gedachten Fehlern des Magens und Darmkanals.

Heilungskarakter.

Gewöhnlich Folge einer rein asthenischen Affektion des Darmkanals, ob er gleich auch hyperasthenischer Beschaffenheit seyn kann.

Heilanzeigen.

Wie bey der Kolik.

Heilverfahren.

Vorzüglich ist zu empfehlen Eygelb, Brodrinde mit Muskatennuß bestrichen und abgekocht, Chokolade und Fichelkaffee, so wie gestossene und mit Fleischbrühe abgekochte Schnecken.

Gesellt sich Stuhlzwang hinzu, dann lasse man aromatische Kräuter absieden, die Dämpfe davon an den Mastdarm gehen, Klystire von Milch oder Fleischbrühe mit gewöhnlichem Oele setzen, und kräftige leichtverdauliche animalische Diät führen.

Arzneymittel. Eines der wirksamsten ist der Gebrauch von Nro. XXXVIII, oder Nro. XXXVII. abwechselnd mit Nro. XXX, genommen; verbunden mit Einreibungen von Nro. XV. oder XLII. auf den Unterleib, und Klystire von Baldrian mit Tinctur. thebaica.

XLI. Ruhr. *Dysenteria.*

Definition.

Ruhr ist ein Fieber mit Schneiden in den Gedärmen, Stuhlzwang, und Abgang einer mehr oder minder blutigen, oder auch wohl schleimigten Materie verbunden.

Z u f ä l l e.

- 1) Vor dem Ausbruche. Gewöhnlich gehen erst einige Zeit Mangel an Appetit, Diarrhöe oder Verstopfung, ungewöhnlich starke Aufblähung des Unterleibes u. s. w. vorher.
- 2) Beym Ausbruche weecheln einige Tage Kälte und Hitze ab, die fökulente Ausleerung geschieht häufiger, als in gesunden Tagen, und gehet endlich in oft unzählige schleimige oder blutige Stühle über. Hiermit verbindet sich Bauchgrimmen, reissende und herumziehende Schmerzen im Unterleibe, eine beschwerliche Empfindung im Mastdarme mit einem Triebe zu Stuhle zu gehen, der nicht selten vergeblich ist, d. i. Stuhlzwang u. s. w.
- 3) Bey der Zunahme bis zur grössten Höhe. Anhaltende Schlaflosigkeit, Schluchzen, Schwämmchen, Kälte über den ganzen Körper mit einem fetten Schweisse an Armen und Beinen, verhindertes Schlucken, innerliche Empfindung von Hitze und vorzügliche Unruhe.

Aus-



A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte, Dörrfucht, langwieriger Durchfall, Schwindfucht, Wasserfucht.
- b) Tödliche, Brand, Eiterung.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Erkältungen, besonders wenn der Körper sehr erhitzt war, schlechtes und faules Wasser, schlechte nahrhafte und saure Speisen, z. B. unreifes Obst, welches den Körper ausnehmend erkaltet. Indessen gesellet sich zuweilen auch Ruhr zu gewissen örtlichen Fehlern, allein diese gehören nicht hieher.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Höherer Grad der Asthenie oder Hyperasthenie, als der, bey welchem Diarrhöe entsteht, (S. meinen Entwurf §. 1547. seq.)

H e i l a n z e i g e.

Dieselbe wie bey dem Durchfalle, nur mit Berücksichtigung des höhern Grades derselben vor der Diarrhöe.

H e i l v e r f a h r e n.

Die potenzirende Methode in ihrem ganzen Umfange ist hier angezeigt. Nur durch die sinnlose Anwendung der kühlenden und schwächenden Mittel werden meistens die gewöhnlichen Ruhren so sehr in die Länge gezogen, gefährlich und tödlich gemacht. Indessen muß ich im Allgemeinen für die gewöhnlichern Fälle hier vor allen Dingen die Regel geben, daß man bey der Anwendung der sthenisirenden Methode mit den angezeig-

zeigten Mitteln sich nach dem gröfseren oder geringeren Grade der Erregbarkeit des kranken Subjektes richten, und folglich nur mit kleinen Dosen von den Heilmitteln anfangen, dieselben in kurzen Zwischenräumen geben dürfe, und nach und nach immer verstärken müsse.

Die angezeigten Mittel sind:

I. Diät. Milchspeisen, Eyer, Fleischbrühe, alter Wein, Gerstengraupen, Hafergrütze dick gekocht mit etwas Wein vermischt und fleissig getrunken. Eben so kann auch eine Abkochung von Sago, Salep sehr nützlich seyn. Uebrigens muss das Verhalten warm, aber nicht heifs seyn.

II. Hausmittel.

- 1) Ist die Ruhr nicht sehr beträchtlich, dann reichen schon einige Tassen Chamillenthee mit 1. Löffel Branntwein alle Stunden genommen, nebst der Diät, besonders zwischen durch Mandelöl in Eygelbe aufgelöst genommen, öfters schon zu, die Ruhr zu heben.
- 2) Einreibungen von Branntwein in den Unterleib, und darauf warme Umschläge von Leinsamen und Hafergrütze mit Milch abgekocht.
- 3) Klystire von Stärkenmehl und Leinsamen.
- 4) Auch reibe man das Rückgrat mit Branntwein.
- 5) Auf die Fusssohlen lege man Senfumschläge.
- 6) Warme Bäder, besonders von Milch, oder mit etwas Wein, thun treffliche Dienste.
- 7) Ist der Schmerz im Unterleibe und der Stuhlgang sehr heftig, dann lege man einen Senfumschlag auf den Unterleib, bis die Stelle roth wird.



8) Bey Stuhlzwang mache man warme Breyumschläge auf den After, bestreiche denselben mit Oel, und lasse auch Oel oder Mohnsamen in Milch abgekocht, und durchgeseiht, mit einem Zusatze von Baumöl, einspritzen.

Arzneymittel. Reichen eben gedachte Mittel nicht zu, oder wird die Ruhr heftiger, (S. Zufälle 2.) dann rathe ich noch zu Einreibungen von Nro. XLI. und zu dem innern Gebrauch von Nro. XLIII., oder auch von Nro. XXXIV.

Ist sie aber noch in Hyperasthenie übergegangen, (S. Zufälle 3.) dann verstärke man nicht nur die Einreibungen z. B. von Nro. XIV. oder XV., sondern lasse besonders von Nro. XXVI. oder auch XXVII. gebrauchen, bey Minderung der Heftigkeit der Krankheit abwechselnd mit Nro. XXX.

XLII.

Schwere Gallenkrankheit.

Cholera gravior.

D e f i n i z i o n.

Gallenkrankheit ist Diarrhöe mit Erbrechen Magen - und Leibweh.

Z u f ä l l e.

1) Vor dem Ausbruche gehen gewöhnlich Sodbrennen und ungewöhnlich starke Aufblähung des Unterleibes voraus.

2)

2) Beym Ausbruche. Hierauf folget Erbrechen und Durchfall einer gelben, grünen, oder dunkel gefärbten Galle, mit großem Durst, schnellem, unmerklichem, kleinem Puls, und kalten Gliedern.

3) Bey der Zunahme bis zur grössten Höhe. Der Puls wird kaum fühlbar, es stellen sich kalte Schweisse, Herzklopfen, Krämpfe, Schluchzen, Ohnmachten, Zuckungen, Irrereden, unterdrückter Urin, Unempfindlichkeit, kalter Brand, und endlich der Tod ein.

Schädlichkeiten.

Jene der bisher gedachten Unpässlichkeiten des Magens und Unterleibes.

Heilungskarakter.

Gleich dem Erbrechen oder Durchfall. Eben so auch die

Heilanzeigen.

Nur muß man hierbey von den Zufällen 3. bemerken und erwägen, daß, so wie diese sich einstellen, die Krankheit hyperasthenisch geworden sey.

Heilverfahren.

Gleich dem Erbrechen oder der Diarrhöe. Uebrigens ist es bey einer leichten Cholera schon hinreichend, fleissig warme Fleischbrühe zu trinken, und als Klystire zu nehmen, Branntwein in den Unterleib einzureiben, Mandelöl in Eygelb aufgelöst Löffelweise nehmen zu lassen.



lassen, und zwischendurch eine Tasse Kaffee, oder auch Thee mit Milch zu reichen.

Geht die Krankheit in Hyperasthenie über, dann verfähre man eben so, wie im gleichen Falle bey der Ruhr angegeben worden ist.

Zweyte Abtheilung.

Asthenische örtliche Krankheiten.

Anmerkung. Da oft Kleinigkeiten von Krankheitsvorfällen angehende Aerzte bey weitem mehr in Verlegenheit setzen, als die gefahrvollsten Vorfälle, theils weil sie sich zu wenig um erstere bekümmern, theils weil nicht selten bey der Unbekanntschaft mit dem Verfahren bey denselben bey manchen Leuten die Reputation des Arztes leidet, so will ich ausser den hier nothwendig zu erwähnenden Krankheiten auch einiger der ersten, so wie ihrer allgemeinen Behandlung gedenken.

Außerdem werde ich mitunter auch bemerken, welche dieser Zufälle eben so leicht asthenischer Natur seyn können, und wie sie da im Allgemeinen behandelt werden müssen.

XLIII.

Magenentzündung. *Gastritis.*

Z u f ä l l e.

Ein heftiger Schmerz im Magen, der durch alles Genossene, durch äussern Druck, und selbst durchs
Athem-

Athemholen vermehrt wird. Höchst schmerzhaftes Erbrechen und Angst um die Herzgrube; Leibesverstopfung; kalte Extremitäten, Konvulsionen.

Hat die Magenentzündung erst einige Zeit gedauert, oder ist sie gleich sehr heftig, dann vergesellschaftet sich mit ihr noch Fieber und allgemeiner Entzündungszustand.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte. Verhärtung in der Gegend des Magenmundes und Pförtners, Eiterung, hartnäckige Verstopfung des Unterleibes, und alle Arten von Magenbeschwerden.
- b) Tödliche. Brand, brandige Wassersucht, Starrkrampf, Konvulsionen.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Verschluckte Gifte, oder sonst genommene scharfe Dinge, z. B. heftig wirkende Purgir- oder Brechmittel, Gewalt von außen, Stöße, oder eine Wunde des Magens.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Gewöhnlich asthenischer Natur, und zwar vom dritten Grad der reinen Asthenie des Magens. (S. m. Entwurf Th. II. §. 1434. seq.)

H e i l a n z e i g e.

Depotenzirung der allzusehr erhöhten Sensibilität des Magens.

H e i l v e r f a h r e n.

- 1) Sind die genommenen scharfen Körper im Magen noch vorhanden und ist die Entzündung
- U nicht



nicht sehr stark, dann suche man so schnell wie möglich durch ein Brechmittel dieselben fortzuschaffen. Hierzu kann man den Kranken recht viel Chamillenthee mit vieler Butter bis zum Erbrechen trinken lassen.

- 2) Ist aber die Entzündung sehr stark, so reiche man dem Kranken recht viel schleimige Getränke, um die schädlichen Körper einzuwickeln und es dadurch unmöglich zu machen, daß sie bey ihrem fernern Durchgang im Darmkanal allda Entzündung oder sonstigen Schaden hervorbringen. In dieser Absicht nützen vorzüglich laue Milch, Haberschleim, Baumöl, Gerstenschleim, Mandelmilch, vorzüglich Mandelöl in Eygelb aufgelöst u. s. w.

Hat Patient Gifte bekommen oder genommen, so handle man ihn auf die bey den Vergiftungen unten erwähnten Arten.

- 3) Um den Erfolg der gedachten Schädlichkeiten d. i. die Entzündung selbst, zu heben, sobald sie wirklich sthenischer Art seyn sollte, was jedoch sehr selten ist, reichen oft schon, besonders bey schwächlichen Subjekten, zehen bis zwölf Blutigel auf die Magengegend gesetzt, allein zu. Sollte aber die Entzündung beträchtlich seyn, dann muß man freylich ein Aderlaß von etwa 6 bis 8 Unzen vornehmen.

Hat man dadurch die Entzündung erst einigermaßen gemindert, dann lege man gleich ein Blasenpflaster, oder in Ermanglung dessen einen Umschlag von Sauerteig und Essig, oder einige Scheib-

Scheibchen von weissen Zaunrüben auf die Magengegend, und lasse diese Stelle einige Tage eitern, bis Patient nichts mehr wegbricht, und die Heftigkeit des Schmerzens nachläßt.

Breyumschläge, die man hier so gern verordnet, werden selten ohne Schmerzen vertragen.

Man gebe fleissig Klystire aus einer Abkochung von Leinsamen, Flieder und Chamillen, wozu man noch Lein- oder Baumöl mischt.

Einigemal des Tages setze man den Kranken in ein lauwarmes Bad bis über den Schoofs.

Uebrigens gebe man die schleimigen Getränke, Abkochungen von Salep, Sago, lauwarmer Milch u. s. w. fleissig dabey fort.

Hat die Entzündung schon länger angedauert, dann reibe man fleissig von einer Mischung aus Oel und Branntwein in die Magengegend ein.

A n m e r k u n g.

Bemerkt man diesen Zufall nach sogenannter zurückgetretener Gicht, oder nach Hautausschlägen, in welchem Falle das nunmehrige Leiden des Magens mehr ein Krampf, eine schmerzhaftes Kränklichkeit desselben, als Entzündung ist, dann lege man ein Blasenpflaster auf die Magengegend, lasse aber die Stelle nur roth ziehen, und gebe innerlich Ingwerthee. Kurz, man behandle diesen Zufall mehr als Magenkrampf.

Arzneymittel. Will man den Kranken brechen lassen, dann wähle man hierzu Nro. IV. V. oder VI.



Außerdem werden Einreibungen von Nro. XLI. verbunden mit dem innerlichen Gebrauch von XLIII. schnell und oft allein schon alles thun, nebst Bädern von Chamillen, Arnica etc.

Sollte aber dieser Zustand in Hyperasthenie übergegangen seyn, dann verfähre man mit Nro. XIV. äußerlich, und Nro. XXVI. innerlich.

XLIV.

Darmentzündung. *Enteritis.*

Z u f ä l l e.

Ein sehr heftiger, brennender Schmerz des Unterleibes, der beym Berühren zunimmt, mit Verstopfung des Stuhlgangs, häufigem Erbrechen, endlich mit Fieber und einem mehrentheils kleinen und harten Pulse verbunden.

Die Schädlichkeiten, der Heilungskarakter, so wie die Heilanzeigen und das Heilverfahren sind ganz dieselben, wie bey der Magenentzündung.

Ist aber die Ursache ein eingeklemmter Bruch eines Stückes der Gedärme, so wird dieselbe nach Zurückbringung desselben auf dieselbe Weise behandelt und gehoben.

XLV.

Milzentzündung. *Splenitis.*

Milzentzündung ist selten eine rein örtliche Krankheit, und verbindet sich meist mit allgemeiner Sthenie, außer bey absolut örtlich eindringenden Schädlich-

lich.

lichkeiten, z. B. Stichen, Stößen, Verwundungen. Kommt sie zum Vorschein, so ist Schmerz, Spannung und Brennen auf der linken Seite unter den Rippen bemerkbar.

Kommt übrigens im Ganzen mit der Magenentzündung überein.

XLVI.

Leberentzündung. *Hepatitis.*

Leberentzündung kann vorkommen:

- a) im oberen, gewölbten Theile, oder
- b) im unteren, hohlen Theile der Leber,

Z u f ä l l e.

Im ersten Falle zeigt sich ein heftiger, stechender Schmerz in der Lebergegend, der durch jede Bewegung des Zwergefells, z. B. bey dem Einathmen, Niesen, Lachen u. s. m. vermehrt wird, und bis zum Halse und dem rechten Schulterblatte vorzüglich heraufsteigt. Dabey ist das Einathmen beschwerlich, aber das Ausathmen leichter; zuweilen zeigt sich auch Geschwulst nach außen.

Im zweyten Falle bemerkt man einen stumpfen, drückenden Schmerz, der durch die Bewegung des Zwergefells vermehrt wird. Hierzu gesellt sich oft Ekel, Erbrechen und Gelbsucht.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Meistentheils können alle jene Einflüsse, welche allgemeine asthenische Entzündung hervorbringen, auch Leberentzündung erregen, daher sie auch meistens eine
asthe.



asthenische Krankheit ist. Indessen wird jene örtliche Leberentzündung meistens von Stößen, Verwundungen, Gallensteinen, Fäulen u. d. gl. hervorgebracht.

In allem gleich der Magenentzündung.

XLVII.

Nierenentzündung. *Nephritis.*

Z u f ä l l e.

Ein heftig brennender Schmerz in der Gegend der Nieren, wozu sich meistens Fieber gesellet. Der Urin ist sehr roth und feurig, und muß oft, jedoch immer nur Tropfenweis, gelassen werden. Im höchsten Grade der Krankheit ist er wässerig, der Hode in die Höhe gezogen, es äußert sich am benachbarten Schenkel Taubheit oder Erstarrung, in den Geburtstheilen Schmerz; manchmal gesellet sich Kolikschmerz und Erbrechen hinzu.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Sehr selten ist die Nierenentzündung eine bloß örtliche Krankheit, außer wenn Nierensteine, oder andere mehr örtlich schädliche Einflüsse in denselben wüthen.

H e i l a n z e i g e.

Man verfare wie bey dem dritten Grade der Asthenie überhaupt.

H e i l v e r f a h r e n.

Im Durchschnitte gleich der Magenentzündung.



XLVIII.

Harnblasenentzündung. *Cystitis.*

Z u f ä l l e.

Ein heftiger, brennender, fixer Schmerz in der Gegend der Urinblase mit den Zufällen eines Fiebers. Häufiges, schmerzhaftes Auströpfeln eines feurigen, mit einem schnell zu Boden sinkenden Schleime vermischten Urines; Erbrechen; Leibesverstopfung.

In allem gleich der Nierenentzündung.

XLIX.

Gebärmutterentzündung. *Metritis.*

Z u f ä l l e.

Ein heftiger Schmerz, Brennen und Schwere im Becken. Der Muttermund schmerzt beym Berühren, ist hart, verschlossen und zurückgezogen. Harn- und Stuhlzwang, Erbrechen, Schmerzen in den Brüsten und dem Kopfe; Unterdrückung der Monats- und Kindbetter-Reinigung.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Nur Geburtsarbeit, Gewaltthätigkeiten auf die Gebärmutter und andere dergleichen Dinge, deren Wirkung sich blos auf die Gebärmutter einschränkt, können Gebärmutterentzündung hervorbringen. In sofern ist dieselbe meistens eine örtliche Krankheit.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Reine Asthenie der Gebärmutter vom dritten Grade.

Heil-



H e i l a n z e i g e.

Depotenzirung der Sensibilität besonders in der
Gebärmutter.

H e i l v e r f a h r e n.

Bey einer gelinden Gebärmutterentzündung richtet lauwarmes Wasser, äußerlich angebracht, und leicht aromatische Getränke bey gehöriger Ruhe des Körpers, meistens alles schon aus.

Ist dieselbe aber beträchtlicher, so halte man die Kranke ruhig und still, in einer gemäßigten Temperatur, und lege den Körper etwas zurück oder tief.

Die Geburtstheile wasche man fleißig mit lauwarmem Wasser aus, und bey heftigem Schmerz derselben reibe man fleißig Brantwein in den Unterleib und an die inneren Schenkel ein, und mache auch lauwarme Seifenumschläge mit Brantwein vermischt auf den Unterleib. Nimmt die Hitze und das Brennen im Unterleibe noch mehr zu, so wasche man den ganzen Körper, vorzüglich aber den Unterleib mit lauwarmem Wasser und Brantwein, und gebe leicht reizende Klystire, z. B. von Chamillen und Baldrian mit Leinöl. Innerlich gebe man schleimige Getränke, und vorzüglich Mandelöl mit Eygelb aufgelöst.

Sobald aber beträchtliche Schwäche des ganzen Körpers sich einstellen sollte, dann reiche man öfter, aber sparsam, erquickende Nahrung, gebe zuweilen ein Glas Wasser mit Wein, und endlich auch puren Wein.

Arzneymittel. Zu Einreibungen auf den Unterleib bediene man sich Nro. XLI., zum Waschen des Rückgrates, der Schenkel Nro. XIV oder XV.; innerlich

lich reiche man entweder Nro. XLIII., oder auch Nro. XXV. u. f. w. wie bey der Magenentzündung,

Mifsgebären. *Abortus*.

D e f i n i z i o n .

Mifsgebären heist jede unzeitige und frühzeitige Geburt.

Z u f ä l l e .

Wenn Mifsgebären im Anmarsche ist, so empfindet die Schwangere Schmerz im Rücken und in den Lenden, welcher sich gegen die Schenkel herunterzieht, und ein Pressen und Drängen verursacht, wie es bey wahren Geburten gewöhnlich ist. Gemeinlich finden sich geschwinder Puls, Kopfschmerz und Ekel dabey. Die Brüste werden welk und fallen zusammen. Es äussert sich widernatürlicher Abgang des Blutes aus den Geburtstheilen, oder es kommt abgehendes Kindswasser aus der Gebärmutter. Mehrmals entstehen Ohnmachten und andere Zufälle.

Ist das Kind im Mutterleibe wirklich todt, dann spüret die Schwangere keine Bewegung desselben mehr, sie hat ein Gefühl von Schwere im Becken, die Frucht senkt sich plötzlich, und fällt bey jeder Bewegung des Körpers von einer Seite zur andern. Das Gesicht wird blafs, die Brüste welk, der Unterleib ganz kalt. Es äussern sich Schauer, Ekel, Erbrechen, Ohnmachten, starke Rückenschmerzen, kalte Schweisse, fliegende Hitze u. f. w.

Schäd-



S c h ä d l i c h k e i t e n .

Große Gewaltthätigkeiten, Stöße, Fälle, Verwundungen. Ferner: häufiges Aderlassen, Purgiren, Diarrhöe, Ruhr, Nervenfieber u. s. w.

H e i l u n g s k a r a k t e r .

Hyperasthenische Affektion der Gebärmutter; seltener hypersthenische Affektion.

H e i l a n z e i g e .

Gewöhnlich Depotenzirung der Sensibilität vom Grade der Hyperasthenie bis zu ihrem Normalgrad.

H e i l v e r f a h r e n .

- 1) Ist der Zustand hypersthenisch, dann sind bey den Vorboten mäßiges Aderlassen, kaltes Wasser getrunken und auf den Unterleib und die Geburtstheile geschlagen, übrigens aber überhaupt das ganze Verhalten des Entzündungsfiebers angezeigt und wirksam.
- 2) Ist aber, was meistens der Fall ist, der Zustand asthenisch, und wie gewöhnlich hyperasthenisch, dann verfare man auf folgende Weise, um den Abortus zu verhüten:
 - a) Man lege den Körper niedrig, so daß die Schenkel höher, als der Kopf zu liegen kommen.
 - b) Die Schwangere muß sich in jeder Rücksicht ganz ruhig verhalten.
 - c) Reibe man in den Unterleib und Rückgrat lauwarmen Wein oder Brantwein ein.

d)



d) Man gebe der Kranken kräftige Fleischbrühe mit Eygelb, Hoppelpoppel, Chocolate, zwischendurch ein Gläschen Wein, Brodrinde mit Muskatennuß bestrichen und abgekocht. Jedoch brauche man vorerst immer die Vorsicht dabey, immer mit den gelindern Reizmitteln anzufangen und dieselben mehr und mehr zu verstärken.

e) Gesellen sich Blutflüsse hinzu, dann verfare man, wie dort schon angegeben worden ist.

f) In dringenden Fällen rathe ich, einen Senfumschlag über den ganzen Unterleib zu legen, bis derselbe roth gezogen ist.

Arzneymittel.

Einreibungen auf den Unterleib, an die Schenkel von Nro. XIV. oder XV. innerlich nach Befinden der Umstände anfänglich wenigstens Nro. XXVI., später aber, wo nicht gleich anfangs Nro. XXXV. u. f. w.

LI.

Schwere Geburt. *Dystocia.*

Da der Zustand der Gebährenden und Wöchnerinnen gewöhnlich asthenisch ist, und eine gehörige Entwicklung des Kindes häufige und kräftige Zusammenziehungen des Unterleibes und Zwerchfelles verlangen, so folgt ganz natürlich, daß wenn ein Subjekt sehr schwächlicher Konstitution ist, oder sich sonst in irgend einem asthenischen Zustande befindet, die Gebährende die nöthigen Kräfte nicht habe, und folglich die Geburt sehr langsam vor sich gehe und schmerzhaft werde.

Da-

Daher ist es rathsam, wenn nicht schiefe Lage des Kindes oder sonst örtliche Fehler des Beckens und der Gebärmutter die Ursache davon sind, Gewürze und gewürzhafte Dinge, Zimmt in Wein oder auf irgend eine Art mäßig genommen, eben so auch ein Glas guten Wein, und warme Umschläge über den Unterleib beyzubringen.

Arzneymittel. Vorzüglich sind die Einreibungen von Nro. XLI. XIV. so wie auch XV. in den Unterleib sehr rathsam, innerlich dagegen reicht oft schon Nro. XLIV. oder XXIV. zu, ausserdem aber bey hyperasthenischen Anfällen würde ich entweder zu Nro. XXXV. oder zu XXVI. rathen.

Ueberhaupt würde ich allen jenen schwächlichen und dabey schwer gebährenden Subjekten die letzten 4 bis 6 Wochen, alle Abende vor Schlafengehen 1 Eßlöffel voll von Nro. XXXIX. bis zu ihrer Niederkunft zu nehmen, anrathen.

LII.

: Mastdarmvorfall. *Exania.*

Es ereignet sich sehr oft, daß der Mastdarm vorfällt, Kinder ziehen sich oft dieses Uebel durch Schreyen und mühsamen Stuhl zu. Auch Durchfall, Ruhr, Hämmorrhoiden, Stuhlzwang, Reizung eines Steines, bey Weibern Geburtswehen oder erweiterte Mündung des Afters, Lähmung, Mißbrauch der Klystire u. f. w. können manchmal Ursache werden, daß der Mastdarm sich umkehrt, manchmal mehrere Zolle lang heraushängt, und sich einklemmt.

Hei

Heilungskarakter.

Gewöhnlich Lähmung des Intestini recti.

Heilanzeigen.

Beseitigung der Hyperästhenie des Intestini recti.


Heilverfahren.

Bey dergleichen Fällen bestreiche man den Mastdarm mit Lein- oder Baumöl, und bringe ihn wieder langsam zurück. Nachher befeuchte man Kompressen mit warmem Wein, oder streue gestossenen Mastix darauf, lege dieselben fest auf den After, und vermeide sorgfältig alles, was Verstopfung verursachen kann.

Ist aber der vorgefallene Mastdarm entzündet und angeschwollen, dann setze man vorher erst einige Blutigel in der Nähe desselben und mache Umschläge von kaltem Wasser darauf, ehe man es waget, denselben zurückzubringen.

In einigen Fällen, wo der Mastdarm schon mehrere Tage nacheinander vorgefallen, wieder zurückgebracht worden war, und dennoch immer wieder vorfiel, half Wachholderbeeren-Thee, täglich zu drey bis vier Tassen, in einem Verlauf von 36. Stunden ausnehmend. Daher würde ich in denen Fällen, wo der Mastdarmvorfall schon zur Gewohnheit geworden ist, diesen Tee besonders anempfehlen.

Arzneymittel. Ausserdem rathe ich bey dergleichen Fällen noch innerlich Nro. XXXVI. fleissig zu brauchen, und das Rückgrat eben so fleissig mit Nro. XV. sich waschen zu lassen.



LIII.

Steinschmerzen. *Lithiasis.*

Steinschmerzen können sich vorfinden:

- a) in den Nieren,
- b) in der Blase.

Z u f ä l l e.

- 1) Beym Nierensteine bemerkt man Druck und Schmerzen in der Lendengegend, welcher bey jeder Bewegung, vorzüglich beym Reiten, oder beym Fahren an steinigten Orten, stärker wird. Die Absonderung des Urins gehet nicht gehörig von statten, oft ist derselbe mit Blut vermischt, oft gehen damit kleine Steinchen ab, oder eine rothe oder weisse steinartige Masse.
- 2) Beym Blasensteine finden sich Krämpfe und Beschwerden beym Urinlassen. Oft wird der Urin plötzlich unterbrochen, und viel dadurch erleichtert, wenn sich der Kranke vorwärts beugt und die Beine auseinander stellet. Oft bemerkt man eine Erstarrung, Fühllosigkeit, oder einen schmerzhaften Druck im Schenkel. Beym Urinabgang zeigt sich oft häufiger Schleim. Der Urin ist vielmal dünn, blutig, von unbedeutender Menge mit beschwerlichem Abgange. Männer fühlen einen Schmerz oder ein Jucken in der Eichel, Drang zum Wasserlassen. Weiber empfinden einen Reiz an der Harnröhre, und eine Schwere im Mittelfleische u. s. w.

Heil-

H e i l v e r f a h r e n .

Ich muß hier nothwendig erinnern, daß es hier nicht auf Hebung und Entfernung des Blasen- oder Nierensteines, sondern blos auf Linderung der sich manchmal damit verbindenden heftigen Schmerzen in der Nieren- oder Blasengegend abgesehen ist.

In dieser Absicht ist es das rathsamste, Mandelöl in Eygelb auflösen zu lassen, und alle halbe oder ganze Stunden einen Löffel voll zu nehmen.

Ist Entzündung der Nieren oder der Blase vorhanden, dann behandle man dieselben wie oben bey der Brustentzündung angegeben worden ist.

Ist aber keine Entzündung in diesen Theilen gegenwärtig, dann reibe man warmes Oel in die leidenden Stellen ein, mache darüber warme Breyumschläge, setze den Patienten in ein warmes Bad, lasse ihm dabey zuweilen eine Tasse Thee mit einem Löffel Brantwein, und ausserdem des Tages über etwa drey Tassen Wachholderbeer-Thee mit Eygelb vermischt, trinken, und gebe ihm öfters Klystire von Milch und vier Löffel voll Baumöl.

Arzneymittel.

1. Einreibungen von Nro. XLI. in die Gegend der Nieren oder der Blase.
2. Klystire von Valeriana, Arnica, Chamomillen, mit Tinctura thebaic.
3. Innerlich nach Befinden der Umstände entweder Nro. XLIII. oder von Nro. XXXV. aller halben oder ganzen Stunden 15 bis 20 Tropfen, oder von Nro. XXIV.



LIV.

Ohrenweh. *Otalgia.*

Das Ohrenweh ist sehr oft sthenischer Natur, und rühret von stärkerer oder schwächerer Entzündung der Ohren her. Ist die Entzündung heftig und nimmt sie die innern Theile ein, dann bemerken wir die allgemeinen Zufälle eines Entzündungsfiebers, wozu sich ein sehr heftiger innerlicher Schmerz, nebst sehr feinem aber beschwerlichem Gehöre, Unerträglichkeit jedes Schalles, Schlaflosigkeit, Pulsiren, rothe Geschwulst und Hirnwuth gesellet.

Die Schädlichkeiten, welche dasselbe herbeyführen, sind entweder der Reiz von Wärme nach vorhergegangener Kälte, oder Steinchen, Würmer und andere fremde Körper.

Nicht selten aber fehlen die erstgedachten Zufälle, und man bemerkt nur Ohrenschmerz, z. B. nach lang angehaltener Ohrenentzündung u. s. w.

H e i l v e r f a h r e n.

- 1) Ist das Ohrenweh wirklich sthenischer Beschaffenheit, dann lege man einige Blutigel hinter das Ohr, giesse Oel in dasselbe, lege blasenziehende Mittel in Nacken, mache kalte Umschläge auf die äußern Theile des Gehörs, und verfare übriges wie bey der Synocha.
- 2) Sind Würmer oder Insekten im Ohre, so spritze man erst Oel, und dann Milch mit Knoblauch abgekocht in dasselbe.



- 3) Ist das Ohrenweh rein asthenischer Natur, welches man aus dem Karakter der Ursache, die dasselbe herbeygeführt hat, erkennen kann; dann giesse man fleissig einen Theelöffel voll Kuhwarmer Milch, oder das Weisse vom Ey, welches stark geschlagen ist, oder Mandelöl, oder laues Wasser hinein, oder lasse lauwarne Dämpfe von Wasser und Wein hineingehen.

Arzneymittel.

- 1) Einreibungen von Nro. XIV. im Nacken oder hinter das Ohr.
- 2) Senf-Fussbäder.
- 3) In heftigen Fällen innerlich von Nro. XLIII. oder XXIV., oder wenn etwa die Ursache Erkaltung war, von Nro. XVII. oder XXXI., so wie bey hohem Grade letzter Affektion von Nro. XVIII. halbstündig 2 Theelöffel voll zu nehmen.

LV.

Zahnschmerzen. *Odontalgia.*

Wenn der Zahnschmerz entzündlicher Beschaffenheit ist, welches man aus den vorhergegangenen Schädlichkeiten, z. B. nach warmen Speisen, hitzigen und reizenden Dingen u. s. w. erkennen kann, dann leiden gemeiniglich mehrere Zähne, oder eine ganze Seite. Man hat Hitze, Röthe, Geschwulst, Pulsiren. Das Zahnfleisch, die Kinnlade, und oft der Backen leiden. Der Athem ist heiss, und die Zähne scheinen länger geworden zu seyn.



Entstehet aber der Schmerz nach dem Genusse kalter Dinge, nach grosser Kälte, von Schwäche und Krampf, oder gefellet er sich zum Knochenfraß oder hohlem Zahne, dann ist der Zahnschmerz asthenisch.

H e i l a r t.

1. Ist der Zahnschmerz sthenischer Natur, dann lege man zwey bis vier Blutigel an das Zahnfleisch, nehme fleissig kaltes Wasser in den Mund, lege ein Blasenpflaster in den Nacken, und verfare wie bey der Synocha.
- 2) Ist derselbe aber asthenisch, dann lege man trockene und warme Säcken von Chamillen und Roggen mit einigen Gran zerstoßenen Kampfer vermischt auf den Backen, reibe Brantwein in denselben ein, nehme selbst davon öfterer mit lauwarmem Wasser vermischt in den Mund, und tröpfe davon auf Baumwolle, und drehe dieselbe in den vielleicht hohlen Zahn.
- 3) Ist der Zahn stark angefressen, dann lasse man ihn herausnehmen.

Die Arzneymittel anlangend verfare man hier wie bey dem Ohrenweh, nur mit Rücksicht auf das lokal verstärkte Leiden.

LVI.

Schweres Zahnen, *Dentitio difficilis*.

Z u f ä l l e.

Bev beschwerlichem Zahnausbruche äussern sich Geschwulst, Röthe und Entzündung des Mundes, des
Zahn-

Zahnfleisch, der Augen, Geschwulst der Ohrendrüsen, Ausschläge im Gesichte, Speichelfluss, Durchfall, Verstopfung, Erbrechen, Leibesbeschmerzen, beschwerliches Urinlassen, oder übermäßiger Urinabgang, Schleimfluss aus der Harnröhre mit Brennen, hartnäckiger Husten, Schlaffucht, Schlaflosigkeit, Zuckungen und Krämpfe aller Theile.

Heilungskarakter.

Gewöhnlich ist dieser Zufall Folge einer hyperasthenischen Affektion besonders der Speichelabsondernden Organe.

Heilverfahren.

- 1) Setze man das Kind in ein lauwarmes Seifenbad, oder auch in ein ähnliches nebst einer Zumi-
schung von aufgelöstem lapis causticus.
- 2) Gewöhnlich ist die Hyperasthenie besonders vom ersten Grade irritabler Art, daher wird man am besten verfahren, wenn man das Kind von Nro. XVIII. fleissig nehmen lässt.
- 3) Wird der Fall hartnäckiger, mit Konvulsionen etc. verbunden, dann gebe man von Nro. XXXV. halbstündig etwa 10 Tropfen.
- 4) Im höchsten Grade aber von Nro. XXVI. etwa 15 Tropfen.
- 5) Damit verbinde man Einreibungen von Nro. XIV oder XV. in den Hals, in das Rückgrat und Fusssohlen.
- 6) Uebrigens muss auch die Diät die bewusste hier adäquat seyn.



LVII.

Schwämmchen. *Aphthae*.

Z u f ä l l e.

Weisse Blasen und Flecken an den innern Theilen des Mundes, den Lippen, der Zunge, dem Gaumen, welche endlich eine Kruste bilden und sich zuweilen durch den Schlund, den Magen und Darinkanal bis in den After verbreiten. Fällt die Kruste ab, so erscheint eine zweyte, dritte und vierte mit immer zunehmender Bösartigkeit. Dabey ist meistens Fieber, Hitze, Unruhe, Leibschmerz, Durchfall u. s. w.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Gewöhnliches Purgiren der Kinder, Unreinhalten des Mundes, Ruhr, Scharbock, Durchfall u. dgl. m.

Heilungskarakter und Heilanzeigen sind gleich der brandigen Bräune, nur daß die Schwämmchen Produkte eines geringern Grades der Hyperasthenie sind.

H e i l v e r f a h r e n.

Man verfare hier diätetisch überhaupt, wie bey der Asthenie es erfordert wird. Nebenbey wasche man den Mund fleissig mit Wasser und Branntwein, oder Salbeythee mit Honig, oder mit Rüben - Mönren, oder Feigenfaft und Branntwein aus, gene zuweilen einen bis zwey Theelöffel voll Wein, Eygelb, kräftige Bouillon u. s. w.

Arzneymittel.

- 1) Aeußerlich zum Bestreichen der schwammigen Stellen im Munde bediene man sich Nro. XXIX.
 - 2) Innerlich Nro. XXVIII., abwechselnd mit Nro. XXX.
- Uebrigens wie bey der brandigen Bräune.

LVIII.

Niedergefallenes Zäpfchen. *Hypostaphyle.*

Sehr oft bemerket man, außer der sthenischen Halsentzündung, gelinde oder bloß asthenische Entzündungen am Zäpfchen, besonders wenn mehrmals Bräune vorausgegangen ist.

Ist das Zäpfchen entzündet, dann ist es geschwollen, heiß, schmerzend, hindert oft das Athemholen und Niederschlucken. In diesem Falle ist bloß kaltes Wasser mit etwas Essig im Munde gehalten sehr wirksam dagegen.

Ist aber das Zäpfchen bloß verlängert und schlaff, dann lege man auf einen Löffelstiel etwas gestossenen Pfeffer und bringe ihn an das Zäpfchen.

Arzneymittel. Am besten ist es, sich mit lauwarmem Goulardischen Wasser zu gurgeln, Einreibungen von Nro. XIV. in den Hals zu machen, und innerlich von Nro. XXXVI. aller zwey Stunden 40 Tropfen zu nehmen.

LIX.



LIX. Vermes.

Würmer. Vermes.

Zufälle.

Außer dem wirklichen Abgange von Würmern selbst giebt es kein ganz zuverlässiges Kennzeichen, woraus wir auf die Gegenwart von Würmern schliessen können. Indessen vergesellschafteten sich gewöhnlich mit Würmern folgende Zufälle.

Nämlich; übelriechender Athem, Neigung zum Brechen im nüchteren Zustande; ein blaßes Ansehen des Gesichtes, blaue Ringe um die Augen, besonders morgens früh; plötzliches Verwandeln der Gesichtsfarbe, vorzüglich der Wangen; öfteres Jucken in der Nase, rothe Nase, plötzliches Zusammenlaufen des Wassers im Munde, besonders des Morgens; häufiges Niesen ohne Schnupfen, irregulärer ungewöhnlicher Appetit; erweiterte Pupillen, Doppelsehen, Schielen, aufgeschwollener aber doch weicher Unterleib, Harnstrenge, aussetzender ungleicher Puls, öftere Kolikschmerzen, kleine Fieberbewegungen u. s. w.

Diese Thiere sind in manchen Fällen oft Ursache von konvulsivischen Zuständen, Nachtwandeln, Starrkrampf, Lähmungen, Staar, Epilepsie und andern dergleichen Zufällen.

Heilungskarakter.

Asthenie des Darmkanals.

Heilanzeigen.

Verstärkung der Irritabilität in dem Gedärme.

Heil-




H e i l v e r f a h r e n .

Sobald wir davon überzeugt sind, so suche man dieselben sogleich wegzuschaffen. Die Mittel dazu sind:

- 1) Möhrensaft täglich zu zwey bis drey Tassen getrunken.
- 2) Knoblauch auf Butter gestrichen, oder mit Milch abgekocht.
- 3) Gröfse Rosinen und Feigen recht viel gegessen.
- 4) Heringe sammt den Kräten gekaut und gespeist.
- 5) Klystire von Milch und ein paar Theelöffel voll gestossenen Zucker.
- 6) Bey großer Unruhe derselben fleissig Milch, Oel oder Fett genossen.
- 7) Nie darf man einen Wurmkranken hungern lassen; muß ihm täglich ein paarmal Wein zu trinken geben, und kann weit leichter bey abnehmendem Monde dieselben abtreiben.
- 8) Hat man Ursache zu glauben, daß man alle Würmer weggeschafft hat, dann suche man den Körper durch kräftige Nahrungsmittel gehörig zu stärken, besonders durch fleissige Bewegung des Körpers, Genuß reiner Luft, Gewürze und gewürzhafte Dinge, z. B. Pfeffer, Zwibeln, Wein, Fleischdiät, Eyer, und durch Einreibungen und Waschen des Unterleibes mit warmem Weine.

Arzneymittel. Die Stärke, so wie die Form derselben richtet sich nach dem Grade der Asthenie. Nämlich:

- 1) Gewöhnlich sind Würmer vorhanden, ohne besondere Zufälle zu erregen u. s. w. Hier benütze man Nro. XL.
- 2)



- 2) Bewirken dieselben Unruhe, Krämpfe, Heißhunger, mitunter Konvulsionen, Fieberbewegungen u. s. w. dann rathe ich äußerlich zu Nro. XLII. auf den Unterleib einzureiben, zum innern Gebrauche aber zu Nro. XXXVII. oder Nro. XXXVIII.
- 3) Werden gedachte Zufälle heftiger verbunden mit einem Torpor und Sopor u. s. w., dann gebe man von Nro. XXVI. einem Kinde von 3 Jahren 10 bis 20 Tropfen, und so verstärkt nach den Jahren u. s. w.

LX.

Heißer Brand. *Gangraena.*

Kalter Brand. *Sphacelus.*

D e f i n i z i o n.

Unter Brand verstehen wir gewöhnlich das Absterben eines oder des andern Theiles unseres Körpers bey fortdauerndem Leben des übrigen Ganzen.

Je nachdem nun der brandige Theil noch Empfindlichkeit besitzt, oder ganz gefühllos ist, nennet man den Brand der angegriffenen Theile entweder den heißen oder kalten Brand.

Z u f ä l l e.

- 1) Beym heißen Brande. Stellet sich dieser an einem äußern Theile unsers Körpers nach einer auf den höchsten Grad gestiegenen Entzündung desselben ein, so schwillt derselbe an, wird
stein-

steinhart, entweder bleich, oder dunkel- oder schwarzroth, und die entzündet gewesene Stelle wird mit rothen heißen Strahlen umgeben, die von weitem her sich darauf hinziehen. Die Empfindung der Hitze des entzündeten Theiles ist jener von Verbrennung ähnlich, und mit Krämpfen in den benachbarten Theilen und großer Beängstigung begleitet.

Wenn diese Gattung des Brandes weiter schreitet, oder aus Schwäche des Körpers entstehet, dann empfindet der Kranke einen dumpfen Schmerz, es kommt eine graulichte, abgestandene, braune, bläuliche und grünliche Farbe zum Vorschein, und beym Anfühlen der brandigen Stelle fühlet man keinen Widerstand.

- 2) Beym kalten Brande. Hier ist völliges Absterben des angegriffenen Theiles. Der Umfang ist geschwollen, kalt und blaß, manchmal auch zusammengefallen; die brandige Stelle selbst aber schwarz, gegen alle sonst schmerzhaften Eindrücke gefühllos und faulstinkend. Zuweilen ist sie trocken, welches der trockene Brand heisst, zuweilen aber auch weich, halbflüssig, wobey sich Blasen erheben, die ein röthliches Wasser von sich geben, und welches der feuchte Brand genannt wird.

Gefellen sich zum kalten Brande Schlaflosigkeit, Irrereden, Poltern im Unterleibe, Krämpfe, Schluchsen, kalte Schweisse, stille Ruhe oder Schlaffucht, dann ist der Tod gemeinlich sehr nahe.

Schäd-



S c h ä d l i c h k e i t e n .

Hoher Grad von Kälte, wie beym Erfrieren einzelner Theile unseres Körpers beobachtet wird; Zusammenschnürungen, starker Druck, oder starkes Binden, Lähmungen, eingeklemmte oder zu hart gebundene Brüche, Verrenkungen, Fallen, Stöße, heftige Entzündungen, Bisse wüthender oder giftiger Thiere, Gehirnerschütterungen, hohes Alter, Wassersucht, Schwindfucht, Scorbut, Wunden, Quetschungen, Zerreißungen u. s. w.

H e i l u n g s k a r a k t e r .

Hyperaesthenie vom dritten Grade zunächst vorhanden in dem Lymphsysteme.

H e i l a n z e i g e .

Man suche die Sensibilität, welche bey ihrer relativen Verminderung in den brandigen Theilen zu hoch absolut potenzirt ist, wieder gehörig zu depotenziren.

H e i l v e r f a h r e n .

Dieses leidet einige Abänderung nach folgenden Umständen:

- 1) Wenn der Kranke noch jung, stark, wohlgenährt und noch bey Kräften ist; wenn die Entzündung des schon zum Theil vom Brande ergriffenen Theiles noch heftig ist, der leidende Theil selbst noch sehr roth und unempfindlich ist, u. s. w. dann verfähre man wie beym ersten Grade der Hyperaesthenie, und auf den brandigen Theil selbst lege man fleissig abwechselnd frische warme Umschläge von 8 Loth in Wasser
ge-



gekochtem Leinsamenmehl, 6 Loth Chamillen und 4 Loth Flieder. Damit fahre man so lange fort, bis gehörige Eiterung der Brandstelle hergestellt ist u. f. w.

2) Ist aber die vorhanden gewesene Entzündung und das sie begleitende Fieber ganz verschwunden, der Kranke selbst schon sehr geschwächt, greift der Brand immer weiter um sich u. f. f. dann mache man fleißig und öfters erneuerte Umschläge von frisch geriebenen rohen Kartoffeln, und wenn sich hierauf nicht bald Besserung einstellt, dann sogleich andere warme Bähungen von Wermuth in Wein abgekocht auf die brandigen Theile, gebe dem Patienten leicht verdauliche, aber nahrhafte Speisen, z. B. junges, zartes, saftiges Fleisch, Eygelb, ein Gläschen guten Wein u. f. w.

3) Entsteht der Brand in irgend einem Theile unseres Körpers vom Erfrieren desselben, dann reibe man erst einige Zeit die verletzten Theile mit Schnee oder kaltem Wasser, und dann erst bediene man sich der Bähungen von wenigtem Wermuth - Absud.

4) Zuweilen entsteht, besonders bey alten Leuten, ein schneller und tödlicher kalter Brand an einer kleinen Zehe, woran sich zuerst eine Stelle als ein kleiner schwarzer oder blauer Fleck zeigt, von welchem sich das Oberhäutchen ablöst. Ein solcher Brand greift schnell oder langsam mit heftigen Schmerzen um sich. In diesem Falle trinke man nach Gutbefinden täglich eine halbe oder



oder ganze Bouteille Wein, mache Umschläge von alter Wagenschmiere oder Schifsteer darüber; oder man lasse Sauerteig, Weizenmehl, Honig und Wasser so lange bey'm Feuer kochen, bis die Gährung beginnt, und lege diese Masse kalt auf die brandige Stelle. Eben so kann auch eine Salbe von Pech und Wachs in diesem Falle sehr gute Dienste leisten.

Arzneymittel. Nicht immer wollen gedachte Mittel zur Hebung des Brandes zureichen, in welchen Fällen ich folgendes Verfahren anrath:

- 1) Befeuchte man Charpie mit tinctura thebaica und lauwarmem Wasser zu gleichen Theilen, lege sie auf die brandige Stelle, und wiederhole dieses Verfahren öfters des Tags.
- 2) Lasse man innerlich Nro. XXVI. abwechselnd mit Nro. XXX. brauchen, und verfähre übrigens wie bey'm Typhus. (S. m. Entwurf Th. II.)

LXI.

Verbrennung. *Ambustio.*

Verbrennung an einem fleischigen Theile ist eine schnell entstandene örtliche Entzündung, welche mit Röthe, brennendem Schmerz und Geschwulst, bald in geringerem bald höherem Grade verbunden ist, bey längerer Andauer ein allgemeines Entzündungsfieber erregt, wozu sich endlich noch auf dem entzündeten Theile Blasen und Eiterung gesellen.

Heil-



H e i l a n z e i g e.

Man vermindere so schnell wie möglich die vorzüglich örtliche sehr heftige Sthenie zunächst in den besonders davon ergriffenen Theilen.

H e i l v e r f a h r e n.

Eines der souveränsten Mittel sind öfters erneuerte Umschläge von jedesmal frisch geriebenen rohen Kartoffeln. Indessen kann man sich auch in Ermangelung derselben des Milchrahms, der Dinte, frischer Erde, gemeinen Oels, u. s. w. bedienen.

Hat man eine leichte Blase an einem Finger gebrannt, so öffne man dieselbe ja nicht, sondern man lege Milchrahm oder dünne Speckschwarte darum, und fahre damit einige Tage fort. Bey grossen Blasen aber lasse man das Wasser durch kleine Einschnitte auslaufen, fahre mit den schon gedachten Ueberschlägen fort, und bestreiche zwischendurch die Stelle mit einer Salbe aus 2 Löffeln voll Baumöl unter das Weisse von einem Ey gemischt.

Arzneymittel. Sehr heilsam ist gleich anfänglich Goulardisches Wasser lauwarm übergeschlagen.

Geht aber die verbrannte Stelle in Eiterung über, dann bereite man eine Salbe aus zwey Theilen Kalchwasser und einem Theile Leinöl mit einander vermischt aufzuschlagen u. s. w.



LXII.

Fingerwurm, Umlauf. *Panaritium.*

D e f i n i z i o n.

Fingerwurm ist eine Geschwulst an dem äußersten Ende der Finger, oder an der Mitte, oder an der Seite des Nagels.

Z u f ä l l e.

Diese Geschwulst fängt mit einem stumpfen klopfenden Schmerz an, endlich vermehrt sich das Klopfen, und es gesellet sich eine große Hitze und heftiger Schmerz dazu. Manchmal steigt der Schmerz sehr hoch, erregt Fieberbewegungen, und läßt dem Kranken weder bey Tage noch bey Nacht Ruhe. Sehr oft verbreitet sich die Geschwulst über die ganze Hand und zieht manchmal, wenn nicht gehörig Sorge getragen wird, den Brand nach sich.

Fängt das Uebel sogleich mit Geschwulst, Schmerz und Röthe an, dann ist es ein Beweis, daß das Uebel seinen Sitz mehr in der Oberfläche der Haut und in der Fetthaut hat.

Liegt aber das Nagelgeschwür tiefer, auf der Flechscheibe oder dem Knochenhäutchen, so ist anfangs keine Geschwulst zugegen, sondern erst späterhin äußert sich eine geringe, wässerige, endlich entzündungsartige Geschwulst an einem oder dem andern Finger, welche sich oft über die Hand, den Vorderarm, bis zur Achsel erstreckt. Allein hiernit ist ein weit heftigerer, brennender, stechender, klopfender Schmerz mit allgemeinem Entzündungsfieber verbunden.

Hei-



H e i l u n g s k a r a k t e r.

Dieser Zufall ist meistens ursprünglich asthenisch, kann aber auch Folge einer asthenischen Affektion theils der Blut- theils der Lymphgefäße und Sehnen zunächst dieses Theils seyn. In beyden Fällen aber kann dieser Zustand die hyperasthenische Beschaffenheit annehmen.

H e i l a n z e i g e.

Verschieden, so wie gedachte Fälle.

H e i l v e r f a h r e n.

1) Ist das Nagelgeschwür oberflächlich, und rein entzündlich, dann lege man bey heftigem Entzündungszustande desselben drey bis vier Blutigel an die Spitze des Fingers, welches man im Nothfalle einigemalen des Tages wiederholen kann; mache sodann Umschläge von kaltem Wasser darüber, und wenn hierauf nicht nach 24 Stunden Linderung erfolgt, dann sehe man den Zustand für hyperasthenisch an, besonders je mehr die Empfindlichkeit des Fingers abnimmt, und mache darum warme Umschläge von in Milch getauchtem Brode, oder suche man durch Auflegung einer Speckschwarte die Eiterung zu befördern.

2) Liegt aber das Nagelgeschwür tiefer, so bade man den Finger fleissig in heissem Seifenwasser, oder Heisser Lauge etc.

Arzneymittel.

a) Im ersten Falle bediene man sich lauwarmer Umschläge von Aqua vegeto mineral. Goulardi.

b) Im zweyten Falle lasse man den Tag über von Nro. XXIV. gebrauchen, und beyim Schlafengehen ein Pulver Nro. XXII. nehmen.



LXIII.

Schrunden, *Rhagades*.

D e f i n i z i o n.

Unter Schrunden versteht man gewöhnlich das Aufspringen oder Spalten der Haut an irgend einem Theile unseres Körpers.

Diese Schrunden werden oft an empfindlichen weichen Theilen, besonders jenen, welche der Luft meistens ausgesetzt sind, z. B. das Gesicht und die Hände, sehr unangenehm.

Die meisten derselben entstehen im Winter von der Kälte, oder auch von scharfer Lauge, womit z. B. Mägde waschen, u. s. w.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Desorganifazion der Haut.

H e i l a n z e i g e.

Man unterstütze gehörig die Reproduktion, besonders in Betreff ihres Antheiles an der Konstruktion der Haut.

H e i l v e r f a h r e n.

Sehr heilsam dagegen ist Wachsöl oder Eyeröl, oder die gewöhnliche Mundpomade, oder frische ungefalzene Butter, in die leidenden Theile einigemal täglich einzureiben, um die erregenden Schädlichkeiten zu vermeiden.

Am besten bleibt immer innerlich der Gebrauch von Wachholderthee mit Nro. XVII. und äußerlich das Bestreichen dieser Stellen mit Eyweiss. Nebstdem vernünftige Diät, Bäder, fleißige Bewegung des Körpers.



LXIV.

Unterlaufenes Geblüt. *Ecchymonia.*

D e f i n i z i o n.

Es ist dieses ein schwarzer oder schwarzrother, blauer oder schwarzblauer, nach und nach ins Braune und Gelbe fallender Fleck, welcher von unter der Haut ergossenem Blute entsteht.

Solche Flecken entstehen oft von Quetschung, vom Drucke, Stöße u. d. gl. an den verschiedensten Theilen unseres Körpers, und können zu mancherley Unannehmlichkeiten, besonders an sehr empfindlichen Theilen, z. B. unter dem Nagel, an der Fußzehe u. s. w. Gelegenheit geben.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Lähmung der Blutgefäße des leidenden Theils.

H e i l a n z e i g e.

Höhere Potenzirung der Irritabilität, um Resorption des ausgetretenen Blutes zu bewirken.

H e i l v e r f a h r e n.

Vorzüglich nothwendig und rathsam ist es, sobald wie möglich leinene, in lauwarmen Weinessig oder Brantwein, oder warmen Wein, oder einen weinigten Wermuth-Aufguss u. d. gl. oder Essig mit Wasser getauchte Tücher auf den mit Blut unterlaufenen Ort zu legen.

Arzneymittel. Das sicherste und am schnellsten wirkfame ist besonders anfänglich ein Unschlag von

Y lau.



lauwarmen Goulardischen Wasser, oder einer sehr saturirten Auflösung von Sacharum Saturni. Späterhin wird sich Nro. XIV., oder Eau de Cologne sehr wohlthätig zeigen.

LXV.

Quetschung. *Contusio.*

Quetschungen, Klemmungen, Stöße sind Gewaltthätigkeiten, wodurch die organischen Theile dergestalt gepresst, gespannt, zerrissen, oder übel behandelt werden, daß sogleich in dem gequetschten Theile eine Schwäche, und eine weiche schmerzhaftes Geschwulst entsteht, welche die gestossene Stelle einnimmt, und nicht selten sich weiter über ihre Gränzen ausbreitet.

Die Gefahren, welche aus Quetschungen entstehen können, richten sich blos nach der Wichtigkeit und Nothwendigkeit derjenigen Organe zum Leben, welche gequetscht werden. Uebrigens können Quetschungen sehr reizbarer und besonders vorzüglicher Theile schreckliche Folgen nach sich ziehen. Daher man denn auch, besonders bey schweren Quetschungen, bald die nöthige Heilmethode anwenden muß.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Gleich den unterlaufenen Geblüte.

H e i l a n z e i g e.

Dieselbe wie bey dem unterlaufenen Geblüte.

H e i l v e r f a h r e n.

- 1) Bey leichten Quetschungen lege man leinene, in lauwarmen Weinessig oder Seifenwasser getauchte Tücher

Tücher auf die Stelle; oder man mache Breiumschläge aus Brodkrumen, Fliederblumen und Chamillen, welche man in gleichviel Wasser und Weinessig abgekocht hat.

Sind dabey Austretungen der Säfte zugegen, ohne Gefahr der Entzündung, dann mache man Bähungen von Branntwein oder von warmen Weine, worin man vorher Wermuth, Majoran, Pfeffermünze oder sonst gewürzhafte Kräuter abgekocht hat. Auch Weinhefen kann man in diesem Falle mit vielem Nutzen anwenden.

- 2) Bey grossen Quetschungen, besonders muskulöser Theile, mache man erst auf die leidende Stelle obige zertheilende und entzündungswidrige Umschläge, halte das Glied in völliger Ruhe, und wenn demungeachtet nach einigen Tagen sich kein Zeichen der Verheilung vorfindet, und die Eiterung im Anmarsche ist, dann mache man fleissig erweichende Breiumschläge, und verfahre übrigens ganz so, wie es der Asthenie angemessen ist.

Arzneymittel sind dieselben, wie bey der Sugillation.

LXVI.

Verwundungen. *Plagae.*

Jede Wunde, wodurch weiche feste Theile getrennt werden, und welche gemeinlich voneinander stehende Wundlefen hat, mehr oder weniger blutig ist, und durch ein scharfes oder spitziges Instrument her-

vorgebracht worden ist, hat früher oder später, mehr oder weniger innormale Verminderung der Irritabilität vorzüglich in den unmittelbar affizirten Organen, nicht selten über den ganzen Organismus, zu Folge.

Sobald aber bey irgend einer Verwundung durch Verletzung eines grossen oder mehrerer kleinen, eben nicht sehr unbedeutlichen Blutgefässe ein grosser Blutverlust entstanden ist; dann nimmt der Zustand, in welchem der Kranke sich befindet, noch mehr zu, die Hyperasthenie bildet sich ganz aus.

Diese Rücksichten müssen bey jeder Verwundung genau erwogen und gehörig in Anschlag gebracht werden, bevor wir uns jeder Behandlung irgend einer Verwundung unterziehen wollen. Denn davon allein hängt die Bestimmung der Heilanzeigen und der nothwendig daraus abzuleitenden Heilart ab.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Hyperasthenie des verletzten Theils. (S. meinen Entwurf Th. II.)

H e i l a n z e i g e.

Potenzirende Methode am meisten von der Klasse der Kohlenstoffhaltigen Mittel.

H e i l v e r f a h r e n.

- I. Bey Verblutungen. Ist die Verblutung beträchtlich, und die Verwundung an einem äussern Theile; so suche man so schnell wie möglich den verletzten Theil oberhalb der Wunde gegen das Herz zu mit einer starken breiten Binde solange zu-

zusammenzuschneiden, bis die Blutung nachläßt. In dringenden Fällen kann auch schon ein Druck der Hand der ersten Gefahr vorbeugen, bis man Zeit gewinnt, andere Mittel anzuwenden.

Außerdem lege man Lerchenschwamm in stufenweise immer breiteren Stücken übereinander auf die Wunde, und befestige dieselben mit einer Binde.

Bey kleineren oder weniger beträchtlichen und weniger gefährlichen Blutungen kann man sich auch des Einstreuens halb verbrannter Brodkruste, Wein- geistes, gestossenen Tischlerleimes, Kolofoniums u. d. gl. bedienen.

Am besten ist es, die Lippen der Wunde zusammen zu drücken, in Ermangelung eines andern Mittels, Pech oder Tischler-Leim darüber zu streichen, und die Wundränder durch eine Binde zusammenzuhalten.

II. Bey Entzündung der Wunde, oder all- gemeinem Entzündungszustande des ge- sammtten Körpers.

Um die Entzündung der verwundeten Theile zu mindern und ihre Vermehrung zu verhüten, streiche man auf zusammengelegte Leinwand frischen Honig, lege sie auf die frische noch blutende Wunde, ohne das geringste andere daran vorzunehmen, und wiederhole bey grossen und tiefen Wunden denselben frischen Verband nach vier oder fünf Stunden wieder. Dieses Honigpflaster kann oft allein schon hinreichen, die ganze Wunde zu heilen.

Außerdem kann man auch im Nothfalle, nach- dem man die Wundränder vereinigt, und das Blut

ge-



gestillt hat, bloße Umschläge von Brantwein darüber machen. Bemerkt man aber, daß die Entzündung sich nicht mehr zertheilen läßt, sondern in Eiterung übergehen will, dann wende man warme Breiumschläge an.

Bey sehr empfindlichen Personen, schmerzhaften und sehr stark entzündeten Wunden verbinde man dieselben mit warmen Oele, worauf meistens eine schnelle Heilung erfolgt.

Uebrigens verfare man, wie bey der Hyperästhenie.

III. Nach starcken Verblutungen, welche dem Verwundeten einen hohen Grad von Hyperästhenie zugezogen haben, ist jede schwächende und kühlende Methode nicht allein nicht angezeigt, sondern nothwendig Gefahr bringend. Im Gegentheile muß man diesfalls durch kräftige Fleischbrühe, Fleischgelées, nicht aber durch feste Fleischspeisen, sondern durch leicht verdauliche und mäßig nahrhafte Diät, durch etwas Wasser und Wein u. s. w. die Erregung des Kranken wieder allmählig, jedoch mit der größten Behutsamkeit in der Menge der zu gebenden Nahrungs- und Erregungsmittel zu verstärken suchen. Dabey aber muß dennoch der Patient sich ganz ruhig verhalten, so wie alles um ihn her ruhig seyn.

So oft sich Anfälle von Ohnmachten vorfinden, gebe man dem Verwundeten ein Gläschen Wein zu trinken.



Arzneymittel. Das zweckmäßigste bleibt vorerst der Gebrauch von Nro. XXVIII. oder XXXIV. oder im höchsten Falle von Nro. XXVI.

LXVII.


Vergiftung. *Venenatio.*

Anmerkung. Da diese Materie einer höhern Deduktion u. s. w. bedarf, diese aber an einem andern schicklichen Orte mit der nöthigen Ausführlichkeit, nähern Bestimmtheit u. s. w. geschehen soll, so mag hier einstweilen im Allgemeinen Folgendes zu unserer gegenwärtigen Absicht hinreichen.

Unter Gift verstehen wir einen solchen Körper, welcher bey seiner Einwirkung auf den belebten Organismus schon in kleiner Gabe vermögend ist, das Leben in die größte Gefahr zu setzen, oder gar zu vernichten.

Die Wege, auf welchen die verschiedenen Gifte in unseren Körper gebracht, diese verheerenden Folgen für unser Leben hervorbringen können, sind entweder der Genuß, oder die äußerliche Anbringung der Gifte, oder das Einathmen giftiger Dünste und Luftarten.

Die eigenthümlichen Wirkungsarten der Gifte sind im Allgemeinen ganz dieselben, wie jene der gewöhnlichen Körper, die auf dem lebenden Organismus einwirken, und unterscheiden sich von jenen dadurch, daß sie schon in kleinen Gaben solche Wirkungen, und diese selbst



selbst wieder in kurzer Zeit mit einer außerordentlichen Heftigkeit und Schnelligkeit hervorzubringen vermögen. Nämlich: entweder vermehren die angebrachten Gifte schnell und heftig, mehr oder weniger die organische Thätigkeit über den mittelmässigen Standpunkt ihrer Stärke, wobey nur individuelles Wohlfeyn bestehen kann; oder sie erzeugen eine krankhafte Veränderung in der Mischung, Form und dem Zusammenhange der organischen Materie; oder sie thun beydes zugleich. Die erste Art der Gifte mögen wir daher, der nöthigen Unterscheidung und Deutlichkeit wegen, erregende, inzitirende; die zweyte Art eindringende, scharfe, ätzende; und die dritte Art gemischte, d. i. inzitirend - eindringende Gifte nennen.

Die inzitirende Gifte, in so fern sie auf die Erregbarkeit des Körpers vorzüglich wirken, bringen jedesmal allgemeine Krankheiten hervor, und zwar, in sofern sie die Lebens-Thätigkeit des Organismus vermehren oder verstärken, entweder sthenische, so lange die Gewalt ihrer Einwirkung das Wirkungsvermögen des lebenden Organismus übersteiget; oder hyperasthenische, sobald nämlich durch die Heftigkeit oder längere Andauer der Einwirkung der Gifte die Irritabilität allzusehr herabgestimmt wurde.

Eindringende Gifte bringen wegen ihrer verletzenden Eigenschaft, welche sie auf die Organifazion äußern, im Anfange wenigstens immer Desorganifazionen hervor.



Die gemischten, d. i. die inzitirend - ein-
dringenden Gifte erzeugen aus schon gedachten
Gründen gleichfalls auch gemischte, d. h. nicht nur
Krankheiten überhaupt, sondern zugleich auch Desorga-
nisationen einzelner Theile.

Die Zufälle, welche die verschiedenartigen Gifte
in dem lebenden Organismus hervorbringen, richten sich
nach der Verschiedenheit der ihnen eigenthümlich bey-
wohnenden Eigenschaften und Wirkungsarten. Ihre
Erkenntniß kann und muß in denen Fällen, wo wir
keinen völlig zuverlässigen Unterricht von dem eigent-
lich beygebrachten Gifte erhalten können, uns einiger-
massen leiten, um wenigstens doch mit einiger nähern
oder entfernteren Wahrscheinlichkeit auf die Gattung der
Gifte, zu welcher das zu bestimmende gehöret, schlies-
sen, und diesem gemäß unsere Behandlung zweckmäßi-
ger einrichten zu können.

Im Allgemeinen bewirken die inzitiren-
den Gifte, wenn sie in den Magen gekom-
men sind, folgende Zufälle. Nach einem all-
gemeinen Wohlseyn erscheinen plötzlich anfangs
Ueblichkeit und Neigung zum Erbrechen, mit geringen
Schmerzen im Magen, oder dem Gefühle eines drücken-
den Gewichtes in demselben. Hierzu gesellen sich
Schwindel, Taumel, Ohnmachten, Irrereden, Zuckun-
gen, eine feltame Betäubung, Schlaffucht, und be-
ständiges sogenanntes sardonisches Lächeln. Im ganzen
Körper äußert sich Erschlafung, Trägheit, eine gewis-
se Verwirrung des Gemüthes mit Besinnungslosigkeit

Der



Der Puls ist bald langsam, bald geschwind. Der Vergiftete wird gleichgültig, taumelt hin und her wie ein unsinniger Mensch. Endlich erscheinen schlagflüssige Zufälle, kalter Schweiß, Zuckungen, Ohnmachten, kalter Athem, und bald darauf der Tod, worauf bald die Haare ausfallen, und der Körper schnell in Fäulniß übergeht.

Die eindringenden Gifte hingegen verursachen im Magen und Darmkanale folgende Zufälle. Nach einem allgemeinen Wohlfeyn äussern sich plötzlich heftig brennende Schmerzen im Darmkanale und im Schlunde; starkes widriges Aufstossen, Neigung zum Erbrechen und wirklich mit enormer Heftigkeit erfolgendes Erbrechen, erstickende Beängstigung, Aufschwellen des Magens, starkes Einziehen oder Heraustreiben des Nabels vor Schmerzen, blutiger Stuhlgang, zuweilen aber auch völlige Verhaltung des Stuhles und Urins, Aufschwellen der Zunge, wildes Ansehen mit herausgetriebenen Augen und schwarzen Lippen. Ueber den ganzen Körper kommen Flecken zum Vorschein, mit Konvulsionen und Raserey. Endlich lassen alle Schmerzen nach, der Kranke fühlet die größte Schwachheit, es stellet sich eine Ohnmacht nach der andern, und bald darauf der Tod ein. Die Leichen solcher Getödteten sehen ziemlich gut aus, und gehen nicht so früh in Fäulniß über.

Die Zufälle der inzitirend-eindringenden Gifte sind aus den beyden genannten zusammengesetzt.

Die

Die Heilanzeigen bey den Vergiftungen beruhen

Erstens auf möglichst schneller Entfernung der beygebrachten Gifte.

Zweytens auf Hebung der dadurch erzeugten Disproporzion der organischen Thätigkeiten, oder der Organifazion selbst.

Nach diesen beyden Anzeigen muß denn auch im Allgemeinen die Heilart eingerichtet werden. Nämlich:

1) Um die erste Anzeige zu erfüllen, reize man den Vergifteten zum Brechen, wenn er nicht schon von selbst erbricht. Hierzu kann man sich entweder eines Fingers, den der Kranke sich in den Hals steckt, oder sonst eines am Gaumen angebrachten Reizes, z. B. des Bartes einer Feder, oder auch des häufigen Trinkens des Chamillenthees mit geschmolzener Butter, bis zum hinlänglichen Erbrechen genommen, bedienen. Erbricht aber der Patient schon von selbst, dann gebe man ihm viel lauwarms Wasser, Oel, Chamillenthee mit Butter und andere schleimigte Getränke zu trinken. Außerdem setze man ihm öfters Klystire von Milch, Oel und Zucker, oder lauwarmen Wasser, bringe ihn in ein lauwarmes Bad, oder wasche fleißig den Körper mit lauwarmen Wasser.

2) Um die zweyte Anzeige zu erfüllen, müssen wir uns erst gehörig zu unterrichten suchen, ob der durch das beygebrachte Gift erzeugte Zustand



stand der Erregung sthenischer oder asthenischer Beschaffenheit ist.

Meistentheils ist die Einwirkung der inzitirenden Gifte auf den Organismus zu heftig und zu schnell, wodurch der erzeugte sthenische Zustand ebenfalls schnell vorüber eilet, und wenn es anderst möglich ist, in eine Hyperasthenie übergeht. Allein gewisse Pflanzengifte wirken langsamer und nicht so heftig, und führen auf solche Art eine länger andauernde Sthenie mit Entzündungs-Zustände, vorzüglich der unmittelbar affizirten Organe herbey. Man bemerkt dabey, daß die Blutgefäße des Kopfes und Halses aufgetrieben, und andere Anzeigen von Entzündung und Kongestion vorhanden sind. In diesem Falle schreite man eiligst zur schwächenden (depotenzirenden) Methode. Hierzu gehören Aderlässe, Schröpfköpfe, Blutigel, kaltes Verhalten, Umschläge von Eis auf den Kopf, Unterleib, kaltes Getränke u. s. w.

Auch Abführungsmittel thun hier vortreffliche Dienste, sobald das Gift schon in die Gedärme gedrungen ist.

In den meisten Fällen aber haben wir es mit Hyperasthenie nach genossenen Giften zu thun, weswegen wir denn auch mit der sthenisirenden Methode eingreifen müssen. Indessen muß ich doch anmerken, daß es in diesem Falle weit zuträglicher ist, wenn wir die angezeigten Mittel auf jene Theile des Körpers applizieren, deren Rezeptivität durch die Einwirkung der Gifte nicht in dem Grade vermindert worden ist, als jene des Magens und des oberen Theiles des Darmkanals.

Man

Man verfährt daher in dergleichen Fällen am besten, wenn man den ganzen Körper, besonders das Rückgrat, mit in warmen Wein oder Brantwein angefeuchteten Tüchern reibet, an mehrere Stellen des Körpers, z. B. Arme, Fußsohlen, Senfumschläge leget, und bis zum Rothwerden dieser Stellen liegen läßt, Riechgeist, oder scharfen Weinessig, oder aufgeschnittene Zwiebeln u. s. w. dem Kranken unter die Nase hält, ihn in ein Bad bringt, und zwischendurch Klystire von Tabackabsud oder Tabaksrauch setzet u. s. w.

So viel von der Behandlung der Vergiftungen im Allgemeinen. Indessen leidet diese Angabe hier und da einige Ausnahmen von diesen allgemeinen Regeln, je nachdem die Beschaffenheit der genommenen und beygebrachten Gifte, wovon ich die wichtigsten mit der Angabe ihrer Zufälle, Heilanzeigen und besondern Heilart noch kürzlich durchgehen will, von einander abweichen. Nämlich:

A. Arsenik. *Arsenicum.*

Zufälle. Grausame Schmerzen, unerlöschlicher Durst, heftigstes Erbrechen, tödliche Beklemmung, Zittern, Krämpfe, Geschwulst, rothe Flecken, Konvulsionen, Ohnmachten, Tod.

Heilanzeigen. Man befreye den Kranken so schnell wie möglich von dem Gifte, wo nicht, so suche man dasselbe in dem Darmkanale zu neutralisiren, einzuwickeln, und den dadurch erzeugten Zustand der Erregung zu heben.

Heil-



Heilverfahren.

1) Ist das Gift ganz kürzlich in den Körper gekommen, dann lasse man den Kranken brechen, und lasse viel schleimigtes, oder noch besser nachfolgende Getränke nachtrinken.

2) Ist aber das Gift schon mehrere Stunden in dem Körper gewesen, dann darf man nicht zum Brechen reizen, sondern man lasse ein Pfund Seife mit vier Pfunden Wasser unter beständigen Quirlen so lange kochen, bis die Seife völlig aufgelöst ist, verführe diese Auflösung mit Zucker, und lasse alle halbe viertel Stunden eine halbe Tasse nehmen, und äußerlich davon Umschläge auf den Unterleib machen.

Bemerket man, daß die örtliche Entzündung des Unterleibs sich auch über den übrigen Körper verbreite, so lasse man nebenbey auch noch eine Ader öffnen.

Ferner gebe man von demselben Seifenwasser mit Oel vermischte Klystire.

Ist das Niederschlucken wegen Krämpfen des Schlundes zu beschwerlich, dann reibe man fleißig Oel in den Hals ein, und lege auf die Herzgrube Flanell oder Servietten in lauwarme Milch oder Seifenwasser getaucht.

Bey heftigen Durchfällen dienen Klystire von Milch oder Hafereschleim mit Oel, oder eine Abkochung von Leinsamen mit Oel.

End-

Endlich lasse man Milch mit Oel, oder zerlassene Butter und frische Eyertotter trinken.

Ist die grösste Gefahr vorüber, dann lasse man Honig mit Wasser, schwefelhaltige Mineralwasser, oder auch vorzüglich Isländisches Moos abgekocht einige Zeit nachtrinken.

Ist eine bedeutende Ausleerung vorausgegangen, so befindet sich der Körper allerdings zwar in einem Zustande von reiner Asthenie; allein die dadurch allzu sehr erhöhte Receptivität des Organismus, und vorzüglich des unmittelbar affizirten Speisekanals, erfordert die allergrösste Behutsamkeit in der Anwendung auch mässig inzitirender Mittel. Daher ist es am rathsamsten, dem Kranken mit Hafer Schleim, Milch, Reis- oder Gerstenschleim einige Zeit erst zu Hülfe zu kommen, bis der Kranke wieder mehr Reize vertragen kann.

Uebrigens ist bey den andern arsenikalischen Giften, z. B. Kobald, Sandarak, Opperment u. a. welche dieselbe gedachte Heilart erfordern, schon Milchrahm, häufig genossen, hinreichend.

Arzneymittel.

- 1) Um Erbrechen zu bewirken, gebe man dem Vergifteten auf einem Male von Nro. V. eines bis zwey Pulver, solange bis Brechen erfolgt.
- 2) Bey gehindertem Schlucken schreibe man von Nro. XIV. fleissig in den Hals ein.



3) Bey heftigen Durchfällen empfehle ich entweder Nro. XXXIV. oder XXVI. und nach denselben den Gebrauch von Nro. XXX.

4) Unmittelbar nach der Vergiftung mit Arsenik gebe man aber sogleich eine Auflösung von Sal tartari in Wasser, oder Asche mit Milch, Sal alculi fluor, Schwefelblumen mit Milch, Schwefelleber zu einem Quentchen in einem Pfunde heißer Milch aufgelöst, mit Zucker versüßt, und Eßlöffelweise genommen.

B. S u b l i m a t

Mercurius sublimatus corrosivus.

R o t h e r P r ä c i p i t a t

Mercurius praecipitatus ruber.

Z u f ä l l e. Beyde Gifte bewirken beynahe alle die bey der Arsenikvergiftung erwähnten Zufälle.

Heilanzeigen. Ist dieselbe, wie beym Arsenik.

Heilart. Sind diese Gifte nicht mehr durch ein Brechmittel wegzuschaffen, dann lasse man entweder recht viel Wasser allein, noch besser aber mit etwas reiner Asche von gebrannten Kohlen vermischt, oder lauwarmes Seifenwasser trinken, und verfare übrigens wie beym Arsenik; nur hüte man sich vor der Anwendung von Säuren und Milch, am besten kann man anfänglich Krebsaugen, Kreide, Potaschen etc. nehmen lassen.

Dieselbe Behandlung gilt auch vom Spiessglase.

C.

C. Bleygifte. *Saturnina.*

Zufälle. Bleygifte in groſſer Menge gegeben oder genommen, wirken eben ſo ſchnell und heftig, als die eindringendſten Gifte. In kleinen Portionen, aber nach und nach eine beträchtliche Zeit lang genommen, bringen dieſelben alle die Zufälle hervor, welche wir unter dem Namen Bleykolik zuſammenfaſſen. Nämlich die gewöhnlichen Zufälle einer Bleyvergiftung ſind: heftige Leibſchmerzen mit hartnäckiger Verſtopfung oder Durchfall und Erbrechen, beſonders von Galle, der Bauch iſt hauptſächlich um der Nabelgegend, meiſtens eingezogen, der Koth hart und kugelförmig, der After einwärts eingezogen, der Speichel bläulich und ſüß, der Puls meiſtens hart und langſam. Hiermit verbinden ſich endlich Zuckungen, Krämpfe, heftige Gliederſchmerzen, Zehrung, Schwindel, Lähmung der Extremitäten, und endlich erfolgt der ſchmerzlichſte Tod.

Heilanzeigen. Da dieſe Gifte unter die vorzüglich inzitirenden gehören, ſolglich in groſſer Quantität ſchnell eine heftige Entzündung hervorzubringen vermögen, ſo verſtehet es ſich von ſelbſt, daß wir in dieſem Falle, wenn das Gift nicht noch zeitig durch ein Brech- oder Abführungs mittel aus dem Körper gebracht werden kann, die antiſtheniſche, d. i. ſchwächende Methode anwenden müſſen. Allein da der dadurch hervorgebrachte ſtheniſche Zuſtand meiſtens ſchnell vorübergehend iſt, und eine Hyperaſthenie herbeyführt, welches denn auch bey kleinen, aber öfters und eine Zeit lang genoſſenen Bleygiften derſelbe Fall iſt, ſo müſſen wir die ſtheniſche Methode zu Hülfe nehmen.

Z

Heil-



Heilverfahren. Ist die Bleyvergiftung durch eine große Quantität des Materials und ohnlängst erst geschehen, dann gebe man ein Brechmittel, und lasse fette Brühen, Oel, Milch mit warmen Wasser oder Baumöl, Wasser mit Honig trinken, gebe Seifenklystire, mache lauwarme Umschläge über den Unterleib, setze den Patienten in ein lauwarmes Seifenbad, und gebe ein gelindes Abführungsmittel.

Ist heftige Entzündung vorhanden, lasse man gehörig zur Ader.

Will diese Behandlung nicht fruchten, dann ist es ein Beweis, dass die Sthenie in Hyperasthenie übergegangen sey. Hier greife man zu stark inzitirenden Mitteln. Unter diätetischen wähle man Wein, Reis- oder Gerstenschleim, kräftige Bouillons, Eyer mit Zimmt und Zucker. Aeußerlich wende man Umschläge von Wermuth, Majoran, Pfeffer oder Krausemünze in Wein abgekocht auf den Bauch an, setze den Patienten in ein Schwefelbad, lege an verschiedene Stellen des Körpers Senfumschläge bis zur Röthe der Haut u. s. w.

Arzneymittel. Wie bey dem Arsenik.

D. Kupfer. *Cuprum.*

Grünspan. *Aerugo.*

Zufälle. Schnell erfolgendes Erbrechen grünefarbter und mit Kupfergeruch begleiteter Stoffe, Beängstigung, Schmerz in dem Schildknorpel, Kupfergeschmack im Munde.

Heilanzeigen und Heilart sind wie bey dem Arsenik. **E.**



E. G y p s, K a l k.

Zufälle. Ihre Wirkungen sind jenen der Bleygifte ähnlich, gewöhnlich aber verursachen diese Vergiftungen blassen Mund, weiße Lippen, wüthenden Durst, brennende Schmerzen im Munde und Bauche, Engbrüstigkeit, Schwindsucht, Tod.

Heilanzeigen und Heilart wie bey den Bleygiften; besonders ist der Gebrauch der Alcalien, Seife etc. hier anzuempfehlen.

F. Mineralische Säuren. *Acida mineralia.*

Laugenfalze. *Salia alcalina.*

Ich rechne hierher alle konzentrirte Säuren, Scheidewasser, Vitriolspiritus u. f. w.

Zufälle. Gemeiniglich ist die Luftröhre dabey zum Ersticken zusammengeschnüret; Mund, Hals, Zunge, Schlund, Magen und Gedärme werden angegriffen, und wie vom Feuer verbrannt.

Heilanzeigen. Verdünnung der Flüssigkeiten ist das Beste und Nothwendigste.

Heilverfahren. Man lasse eine Menge laues Wasser trinken, auch oft Oel nehmen, hernach etwas reine Asche mit Wasser verdünnt zwischendurch, und endlich reichlich Milch trinken.

Bey Vergiftungen durch laugenhafte Salze bewirke man erst Erbrechen durch häufiges Trinken von lauem Wasser mit Honig und Essig vermischet. So-



dann gebe man Limonade, faure Molcken, geschabtes Obst, ausgepresste Säfte von sauren Beeren, und nebenbey Klystire von saueren Molcken und Honig.

G. P f l a n z e n g i f t e.

Die meisten Pflanzengifte besitzen zwar mehr inzitirende Eigenschaften; allein es gibt auch unter ihnen welche, die mehr eindringend wirken, und wieder andere, welche beyde Wirkungsarten zugleich in sich vereinigen.

Unter die inzitirenden Pflanzengifte gehören vorzüglich: Nachtschatten, Lolch, Stechapfelsamen, Taxusbeeren, Kraut Wurzel und Samen vom Bilsenkraute, die Dollkirsche, Schierling, Mohnsaft u. s. f.

Unter die eindringenden Gifte rechnet man besonders: das Laufekraut, den Fingerhuth, das Schweinsbrod, den Wasserpfeffer, die Zaunrübe, die Waldrebenarten, die Küchenschelle, viele Ranunkelarten, die Wolfsmilch, die Aronswurzel, den Kellerhals u. d. gl.

Unter den inzitirend eindringenden Pflanzengiften gehören hieher vorzüglich die Wurzeln, Blüthen und Samen der Herbstblumen, weiße Nieswurz, Eisenhuth, die Zwiebel der Kaiserkrone, der Wasserschierling, Tabak, Fischkörner, die Safrangelbe Rebendolde, Kirschlorbeer, wilde Christwurz, und die giftigen Schwämme, z. B. der Fliegenschwamm, die Parasiten der Löcherschwämme überhaupt, und insbesondere der zierliche Löcherschwamm, ferner auch der unverschämte Gichtschwamm u. a. m.

Alle



Alle diese verschiedenartigen Gifte besitzen ihre eigenen Wirkungsarten, so wie die Zufälle, welche sie in dem lebenden Organismus hervorbringen, gleichfalls von einander abweichen. Nämlich:

1) Zufälle der inzitirenden Pflanzengifte. Diese verrathen sich anfänglich durch Verwirrung der Sinne und des Verstandes, dann erscheinen Schwindel, Aberwiz, Dummheit, Traurigkeit, Schlummerfucht, wilde Gaukeleyen, Aengstigkeit, Krämpfe, Konvulsionen, Schlaf- und Taubfucht.

2) Zufälle der eindringenden Pflanzengifte. Brennende Empfindung im Halse, Kneipen in der Herzgrube, unaussprechliche Herzensangst, Würgen und Erbrechen, wobey oft Blut mit ausgeworfen wird, bald mit heftigem Durchfalle, bald mit hartnäckiger Verstopfung.

3) Zufälle der inzitirend eindringenden Pflanzengifte. Bey dergleichen Pflanzengifte findet man gewöhnlich beyderley Zufälle zugleich miteinander verbunden.

Heilanzeigen ist dieselbe, wie bey der allgemeinen Heilart der Vergiftungen angegeben worden ist.

Heilverfahren. Das Nothwendigste und Beste bleibt in jedem Falle von dergleichen Vergiftungen die Wegschaffung des Giftes durch ein Brechmittel, wenn nämlich das Gift erst kürzlich in den Körper gekommen ist, worauf man nachher fleissig schleimige und ölige Getränke nachtrinken läßt.

So-



Sobald aber das Gift schon mehrere Stunden in dem Körper gewesen ist, dann verfare man folgendermassen:

1) Bey inzitirenden Pflanzengiften.

Vor allem unterfuche man, ob nicht sich irgendwo noch Spuren einer örtlichen Entzündung, oder eines allgemeinen Entzündungsfiebers sich vorfinden, in welchem Falle man fogleich zur Ader lassen, Klystire aus Essig und Wasser geben, den Kranken mit Essig und Wasser besprengen und waschen, und für eine kühle und reine Atmosphäre um ihn her sorgen muss u. f. f. Ausserdem lasse man den Kranken viel säuerliches und schleimiges Getränke, saure Molken, Buttermilch, Himbeeren- und andere Säfte von säuerlichen Früchten u. d. gl. trinken.

Sobald aber keine Entzündungsanzeigen mehr vorhanden sind, und das Gift schon lange im Körper gelegen hat, oder gleich in grosser Quantität beygebracht worden ist, dann ist Hyperästhenie die eigentliche Ursache des gegenwärtigen Zustandes. In diesem Falle verfare man wie bey der Bleyvergiftung.

Arzneymittel. Hier rathe ich fogleich und vor allem zu der Anwendung von Nro. XXV. zu 4 — 6 Theel. oder gleich zur Hälfte zu nehmen, in den Körper fleissig von Nro. XXI. einreiben zu lassen, lauwarne Bäder von Seife oder Lapis causticus zu verordnen.

H. Stiche und Bisse von Schlangen, Insekten und Würmern.

I. Nicht überall und nicht zu jeder Zeit vergiften die Stiche von Schlangen, Skorpionen und Vipern. Wenn dieses aber der Fall ist, dann entsteht an der gebissenen Stelle bald ein stechender, klopfender Schmerz, nebst einer im Anfange rothen, nach und nach blau unterlaufenen oder misfsarbigen Geschwulst, welche sich auf die benachbarten Stellen verbreitet. Endlich verlieren sich die wahren Entzündungs-Zufälle, und an ihre Stelle treten die begleitenden Zufälle von Hyperästhenie, nämlich grofse Mattigkeit, Herzklopfen, aussetzender Puls, Uebelkeit, Erbrechen, gelbe Farbe der Haut, nebst dünnem, eiterigem Ausflusse der Wunde (welches Folge der zugleich eindringenden Wirkungsart dieser Gifte ist,) Kälte in den äufsern Theilen, Zuckungen, kalte Schweisse und oftmals der Tod.

Heilart. Vor allem suche man das Gift nach geschehenem Bisse durch angeetzte Schröpfköpfe wegzuschaffen, wasche sodann die Wunde mit Lauge oder Salzwasser aus, und so lange noch die Zufälle der Entzündung vorhanden sind, verfare man wie beym Entzündungsfieber.


Sobald aber Hyperästhenie eingetreten ist, dann verfare man, wie bey den inzitirenden Giften schon angegeben worden ist, vorzüglich greife man äufserlich nach Nro. XIV. und innerlich nach Nro. XXVI. oder XXVII. lasse den Kranken kräftige Bouillons, Eygelb, und mitunter auch Wein genießen, setze ihn in warme Bäder, und gebe öfters eine Klystire von Chamillenvaller mit tinctur. thebaic.



II. Wenn eine Kröte verfolgt und erzürnt wird, so spritzt sie manchmal eine Feuchtigkeit aus, welche bey Menschen Rothlauf und andere schlimmere Zufälle erregt. In diesem Falle bäheth man die bespritzte Stelle sogleich mit Salzwasser, oder mit einem Aufsud von Chamillen- und Fliederblumen, und brauche bey vorkommenden Entzündungen die Methode wie bey Bleygiften.


III. Stiche von Bienen, Wespen, Hornissen u. d. gl. machen kleine röthliche Entzündungen, die manchmal auch allgemein werden.

In diesem Falle bringt man, wo möglich, gleich den Stachel heraus, macht anfangs kalte Umschläge von Wasser, Erde, geriebenen rohen Kartoffeln darüber, oder suchet auch ausgepressten, etwas gesalzenen, weissen Zwiebelsaft in die Wunde zu bringen. Am besten aber bestreicht man die Wunde mit Honig oder Oel, und wiederholt es, wenn er trocken geworden ist. Kurz, man verfare wie bey Verbrennungen.



F o r m e l n

d e r A r z n e y e n.



I.

R. Cremor. tartari. Unc. I.
 eoque c. Aqu. Font. Libr. III.
 donec dispareat pulvis
 Cremor. tartar; dein adde
 Pomi citri concisi. Nro. I.
 Sach. Albi. Unc. II.
 M. S. *Oefters eine halbe, bis
 ganze Tasse voll zu trinken.*

II.

R. Infusi. Flor. Sambuc. Unc. VI.
 Spirit. Mindereri. Unc. II.
 Succi Liquirit. Dr. II.
 M. S. *Aller Stunden oder aller
 zwey Stunden einen bis zwey Eß-
 löffel voll zu nehmen:*

III.

R. Spirit. Mindereri. Unc. I.
 Syrup. de Althaea. Unc. II.
 M. S. *Aller Stunden oder al-
 ler zwey Stunden einen bis zwey
 Theelöffel voll.*

IV.

R. Tartar. emetic. Gr. III.
 Aqu. Font. destillat. Unc. IIβ.
 Oxymel. Scilitic. Unc. β.
 M. S. *Entweder den dritten
 Theil, oder die Hälfte davon auf
 einmal, und von dem Uebrigen al-
 ler Viertelstunden einen Eßlöffel
 voll zu nehmen, bis Brechen er-
 folgt.*

V.

R. Pulv. rad. Ipecacuanhae.
 Sachar. alb. $\overline{aa}$ Scr. I.
 M. F. Pulv. Divide in quatuor;
 partes aequales. D. S.
*Aller Viertelstunden ein Pulver,
 bis Erbrechen erfolgt.*

VI.

R. Pulv. rad. Ipecacuanhae.
 Sachar. alb. $\overline{aa}$ Gr. XV.
 Tartar. emetic. Gr. I.
 M. F. Pulv. divide in quatuor
 partes aequales. D. S. *wie das
 Vorige.*


VII.

R. Tartar. emetic. Gr. I.
 Pulv. Amyli. Scr. I.
 Sachar. alb. Ser. β.
 M. F. Pulv. D. S. *Auf ei-
 nem Male in einer Tasse Cha-
 millenthe zu nehmen.*

VIII.

R. Folior. Sennae. Dr. II.
 Infund. C. Aqu. Fervid. Unc.
 IV. Jn. Colatur. Solv.
 Mannae elect. Unc. I.
 Tartar. emetic. Gr. I.
 M. S. *Aller halben Stunden ei-
 nen bis zwey Eßlöffel voll zu
 nehmen, bis Oeffnung erfolgt.*

IX.



IX.

R. Sal. mirabil. Glauber. Unc. I.
 Sachar. alb. Unc. β .
 Succ. citri. recent. Unc. I β .
 Decocti Avenae decorticatae
 tenuioris et percolati. Lib. I.
 M. S. *Aller zwey Stunden eine
 Tasse voll, bis Oeffnung erfolgt.*

X.

R. Nitri. depurat. Gr. IV —
 Scr. β
 Sach. alb. Scr. I.
 M. F. Pulv. Disp. doses ta-
 les No VI.
 D. S. *Aller Stunden oder aller
 zwey Stunden ein Pulver zu neh-
 men.*

XI.

R. Nitri. depurat. Scr. β .
 Gummi. arabic. Gr. XII.
 Sachar. Althae, Gr. XV.
 M. F. Pulv. Disp. Doses tales
 No. VI.
 D. S. *wie das Vorige.*

XII.

R. Nitri. depurat. Dr. II.
 Solve in
 Aqu. Cerasor. nigror. S.
 Flor. Sambuc. Unc. V.
 Adde
 Syrup. de althaea. S. emul-
 siv. Unc. I.
 M. S. *In einigen Stunden zu ver-
 brauchen.*

XIII.

R. Sal. ammoniac. pur. Dr. II.
 Infus. Flor. Sambuc. Unc. VI.
 Succ. Liquirit. Dr. II.
 M. S. *Aller Stunden oder aller
 zwey Stunden einen bis zwey
 Eßlöffel voll zu nehmen.*

XIV.

R. Napht. Vitriol. Unc. β .
 Camphor. Dr. I.
 M. S. *Zum Einreiben.*

XV.

R. Balsam. peruv. Dr. I.
 Solv. in
 Spirit. Vin. Camphorat. Unc.
 V.
 M. S. *Zum Einreiben.*

XVI.

R. Opii. pur. $\frac{1}{2}$ Gr. I.
 Kerm. mineral. $\frac{1}{2}$ Gr. I.
 Eleosach. Menth. piperit.
 Scr. I.
 M. F. P. Disp. Doses tres. D.
 S. *Morgens ein halbes, und
 Abends ein ganzes Pulver.*

XVII.

R. Tart. emet. Gr. I.
 Infus. Flor. Sambuc. Unc. VIII
 Syrup. de Althae Unc. I.
 M. D. S. *Eßlöffelweise zu neh-
 men.*

XVIII.

R. Vin. Antimon. Huxh. Guttr.
 XXX.
 Mosch. Oriental. Opt. Gr. III.
 Aqu. Menth. piperit.
 Syrup. Rub. idaei. $\frac{1}{2}$ Unc. I.
 M. S. *Kindern von einem bis
 zwey Jahren aller Stunden oder
 aller zwey Stunden einen Thee-
 löffel voll.*

XIX.

R. Flor. Zinc. Gr. II.
 Calomel, Gr. I.
 Sach. alb.
 Pulver. Antiepil. March. $\frac{1}{2}$
 Scr. I.
 M. F. G. Divide in duas partes
 aequales, D. S. *Früh und Abends
 ein halbes Pulver zu nehmen.*

XX.

R. Camphor. Gr. II.
 Kerm. mineral. Gr. β .
 Sachar. lactis. Scr. I.
 M. S. P. Disp. Dos. VI. D. S.
 Kin-

*Hindern ein halbes, Erwachsenen
ein ganzes Pulver aller zwey
Stunden nehmen zu lassen.*

XXI.

R. Olei Amygdalar. recent.
exprefs. Unc. I.
Spirit. Sal. amoniac Caust.
Dr. II.
Tinctur. Cantharid. Dr. I.
M. D. S. Zum Einreiben.

XXII.

R. Opii pur. Gr. I.
Rad. Ipeacuanh. Grß.
Eleofachar. Menth. piperit.
Scr. I.
M. S. P. D. S. Nach Verord-
nung zu nehmen,

XXIII.

R. Aqu. Fontan. pur. Unc. IV.
Olei Amygdal. recent. expr.
Dr. VI.
Subige. c. Vitell. Ovi.
Sal. volat. C. C. Scr. I.
Syrup. balsamic. Unc. β .
M. S. Oesters einen Eßlöffel voll.

XXIV.

R. Liquor. anod. mineral.
Hofm. Dr. III.
Tinctur. Opii Vinof. Dr. I.
Aqu. Cinam. C. V. Unc. β .
M. S. Aller halben oder ganzen
Stunden fünfzehn bis dreyßsig
Tropfen zu nehmen.

XXV.

R. Mosch. Oriental. Optim.
Gr. XII.
Syrup. balsamic. S. de al-
thaea. Unc. II β .
M. S. Oesters zwey Theelöffel
voll zu nehmen.

XXVI.

R. Tinctur thebaic. Unc. β .
Valerian. Unc. I β .
Napht. Vitriol. Dr. I β .

M. S. Aller Stunden 60 — 100
Tropfen zu nehmen.

XXVII.

R. Aqu. Meliss.
Menth. piperit. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. II.
Napht. Vitriol. Dr. I β .
Syrup. cort. Aurant. Unc. I.
M. S. Oesters einen Eßlöffel voll.

XXVIII.

R. Spirit. Vitriol. Drß.
Mel. Rosarum
Syrup. Mororum $\bar{a}\bar{a}$ Unc. I β .
M. S. | Aller Viertelstunden einen
Theelöffel voll.

XXIX.

R. Spirit. Vitriol. Dr. III.
Aqu. Rosar. Unc. X.
Mel. Rosar. Unc. II.
M. S. Zum äußerlichen Gebrauch.

XXX.

R. Pulv. rad. Serpent. Virg. Unc. β
Infund. o.
Aqu. Fontan.
Vin. rhenan. Opt. $\bar{a}\bar{a}$ Unc. IV.
Post Sufficiant. digest. Co-
latur. adde
Syrup. Croci. Unc. I.
M. S. Aller Stunden od. aller zwey
Stunden einen oder zwey Eßlöf-
fel voll.

XXXI.

R. Essent. Gummi Guajac. Dr. II.
Tinctur. Opii. Vinof. Scr. I.
M. S. Alle Stunden 20 Tropfen
zu nehmen.

XXXII.

R. Liquor. C. C. Succinat.
anod. m. H. $\bar{a}\bar{a}$ Dr. II.
M. S. Aller Stunden vierzig
Tropfen zu nehmen.

XXXIII.

R. Essent. bals. peruv.
cort. Aurant. $\bar{a}\bar{a}$ Dr. II.
Bals.



Bals. vitae Hofm. Dr. I.
Tinctur thebaic. Gtt. XV.
M. S. *Aller 3 Stunden 20 — 24*
Tropfen zu nehmen.

XXXIV.

R. Opii pur. Gr. V.
Camphor. Scr. I.
Mucilag. G. arab. Unc. II.
Aqu. Cinam. Unc. VIII.
Syrup. emulsiv. Unc. II.
M. S. *Aller halben Stunden 2 Eß-*
löffel voll.

XXXV.

R. Liqueur. C. C. Succinat.
Essent. Castorei.
Valerian. $\overline{aa}$ Dr. I.
M. S. *Aller halben Stunden vier-*
zig bis sechzig Tropfen zu nehmen.

XXXVI.

R. Ol. Menth. piperit.
Cajeput. $\overline{aa}$ Gutt. V.
Solve in
Liquor. anod. m. H. Dr. II.
adde
Tinctur. cort. peruv. Whyth.
Essent. amar. Londinens. $\overline{5a}$
Unc. β .
M. S. *Aller drey Stunden sechzig*
bis achtzig Tropfen zu nehmen.

XXXVII.

R. Essent. Cort. Aurant. Unc. β .
Bals. vitae Hofm.
Napht. Vitriol. $\overline{aa}$ Dr. I.
Ol. Cinam. Gutt. X.
M. S. *Aller Stunden zwölf bis*
fünfzehn Tropfen zu nehmen.

XXXVIII.

R. Essent. Cort. Anrant. Dr. I β .
Balsam. peruv. Dr. I.
Tinctur. thebaic. Scr. I.
M. S. *Aller Stunden oder andert-*
halb Stunden achtzehn Tropfen
zu nehmen.

XXXIX.

R. Elixir. visceral. Klein. Unc. I.
Aqu. Cinam. Unc. II.
Liquor. anod. m. H. Dr. I.
Essent. Cort. Aurant. Dr. II.
M. S. *Vor der Mahlzeit einen*
Eßlöffel voll.

XL.

R. Extr. Quass. Dr. I.
Solv. in
Aqu. Meliss. Unc. V.
adde
Liquor. anod. m. H. Dr. I.
M. S. *Fünffmal täglich einen Eß-*
löffel voll.

XLI.

R. Ol. Fol. Hyosciam. nigr.
recens expr. Unc. I.
Camphor. Dr. II.
Liquor. anod. m. H. Dr. III.
M. S. *Zum Einreiben.*

XLII.

R. Ol. Nuc. moschat. recent.
expr. Dr. I.
Menth. piperit.
Cajeput. $\overline{aa}$ Gutt. XX.
Napht. Vitriol. Dr. II.
M. D. S. *Zum Einreiben.*

XLIII.

R. Aqu. Meliss. Unc. VI.
Camphor. Scr. I.
Mucilag. gummi. arab. Unc. I β
Syrup. Cort. Aurant. Unc. I.
M. S. *Aller halben Stunden einen*
Eßlöffel.

XLIV.

R. Aqu. Cinam. Unc. IV.
Liquor. anod. m. H. Dr. I.
Syrup. Diacod. Unc. I.
M. D. S. *Aller halben oder gan-*
zen Stunden einen Eßlöffel voll.

S u p l e m e n t
 z u d e s
 K l i n i s c h e n H a n d b u c h e s
 z w e y t e n T h e i l e s
 zweyter Abtheilung.

LXVIII.

Faulfieber. *Febris putrida.*

D e f i n i t i o n.

U n t e r F a u l f i e b e r v e r s t e h t m a n d i e j e n i g e G a t -
 t u n g d e s F i e b e r s , b e y w e l c h e m a l l e S ä f t e d e s K ö r -
 p e r s i n i h r e r A u f l ö s u n g b e g r i f f e n s i n d .

Z u f ä l l e .

In therapeutischer und klinischer Hinsicht ist es von der größten Wichtigkeit, zu wissen und zu unterscheiden :

- 1) ob das vorhandene Faulfieber primär, rein, und über den gesammten Organismus gleichmäfsig verbreitet, oder
- 2) ob es secundär, gemischt, aus je einer vorhergegangenen Krankheit entstanden, und in diesem Falle selbst wiederum:

A a i n

- a) in welchem Systeme dasselbe vorzüglich versire, und endlich noch,
- b) ob und welches seiner besondern Organe aufserdem noch ganz besonders davon ergriffen seye.

Die Verschiedenheit beyder erst genannten Geschlechter 1. u. 2. des Faulfiebers und deren Gegenwart erkennt man aus nachstehenden pathognomonischen Erscheinungen.

A.

Primäres, reines Faulfieber.

Febris putrida primaria.

Ist nicht etwa die Ursache des primären, reinen Faulfiebers eine zu bösertige Epidemie, oder ein zu durchdringendes Contagium, oder die Konstitution des zu erkrankenden Individuums nicht zu sehr geschwächt, dann hat und hält dasselbe einen bestimmten Verlauf; dem Ausbruche des Faulfiebers geh' ein besonderes Uebelbefinden voraus, und die begleitenden und bezeichnenden Erscheinungen der einzelnen Stadien desselben folgen dann gleichfalls in einer bestimmten Ordnung auf einander, und zwar:

- 1) Vor dem Ausbruche (*Stadium prodromorum, dubium*) grofse Mattigkeit, Schwere in den Gliedern; Eingenommenheit des Kopfes; eine gewisse Muthlosigkeit mit einer eigenen Vorliebe zu Todesgedanken, wobey der Kranke

er-

erzählt, Visionen gehabt zu haben, die ihm seinen Tod verkündet; Zittern bey jeder Anstrengung der willkührlich beweglichen Muskeln, als der Arme, Füße, der Zunge u. s. w.; ausnehmende Sehnsucht nach sogenannten herzstärkenden Dingen, als Wein u. s. w.; kalte, feuchte, klebrichte Haut; unruhiger nicht erquickender Schlaf mit nächtlichen ermattenden Schweissen; geringer Appetit und schwache Verdauung, ohne besonderem Geschmacke im Munde; öligter Urin; übelriechender Stuhlgang; Neigung zu Blutungen, besonders wenn das erkrankende Subjekt dazu irgend schon disponirt ist, daher fliesende Hämorrhoiden, profuse monatliche Reinigung, öfteres und häufiges Nasenbluten vorzüglich bey Kindern und jungen Leuten sich einstellen. *Specie levis, facultate gravis.*

2) Beym wirklichen Ausbruche sind die vorzüglichsten Kriterien:

a) Die äußerste Schwächung der wichtigsten Functionen des Körpers und des Geistes. Sie ist gleich Anfangs sehr bemerkbar; der Kranke hat nunmehr allen Muth, so wie alles Interesse an sonst ihm interessanten Dingen verloren; schlummert beständig, ist dumm, und betäubt, murmelt gewöhnlich allerley abentheuerliches Zeug daher, unterbrochen zuweilen von mehr schon ausgebildeten *deliriis blandis et taciturnis.*

b) Die Beschaffenheit des Pulses.

Dieser ist klein, weich, schnell und geschwind (*parvus, mollis, frequens et celer.*)

Vorzüglich aber zeichnet er sich dadurch aus:

α) Steht er in keinem gleichen Verhältnisse mit der vorhandenen Hitze auf der Haut, sondern je mehr der Puls sinket, desto stärker wird die Hitze und umgekehrt.

β) Eben so verhält es sich auch mit den Delirien, so zwar, daß je mehr der Puls sinket, desto mehr vermehren und verstärken sich dieselben, und damit zugleich auch die Gefahr des Lebens.

γ) Erfolgt bey dem Genusse von Wein und sonstig excitirenden Dingen alsbald Ruhe und Stetigkeit des Pulses; sonach kühlt und temperirt hier der Wein zugleich; daher es das gefährlichste Kennzeichen ist, wenn nach 1 — 2 Gläsern Weines der Puls sich nicht hebet.

c) Die Eigenthümlichkeit des Fiebers. Bis jetzt ist das vorhandene Fieber seinem *Typus* nach noch eine *continua remittens*, tendirt aber schon in eine *Continens* überzugehen. Die Remissionen sind noch groß, die Exacerbationen aber heftig; der Frost unbedeutend, die Hitze dagegen anhaltend, brennend (*Calor mordax*) und

und steigt mit jeder zunehmenden Kleinheit des Pulsés.

d) Die Erscheinungen zunächst in dem Ab- und Aussonderungs-Systeme. Der Athem riecht faulicht; ebenso schmeckt und riecht alles dem Kranken; die Zunge, Zähne und das Zahnfleisch sind mit einer weißlichten, geblichten, braunlichten Materie überzogen; der Urin ist dick, saturirt, braunlicht, zuweilen blutig, und faulicht riechend; dazu gesellen sich kopiöse und faulicht riechende Schweisse und Stuhlgang. Außerdem ist das Aussehen des Kranken gleich einem mit tiefer Wehmuth verbundenen Ernste nebst einer eigenen Verwirrung in den Augen; und der Appetit wenig bemerkbar.

3) Bey der Zunahme bis zur größten Höhe. Die Schwäche ist aufs Höchste gestiegen, die Delirien dauern jetzt unausgesetzt fort; die Sinne sind ganz stumpf; das Auge ohne dem mindesten Glanz und Feuer; das Gehör äußerst schwer; der Geschmack wie der Apetit gänzlich verschwunden; der Puls kaum mehr fühlbar; die Zunge gespalten, und diese so wie die Zähne und das Zahnfleisch mit einer schwarz braunen Materie überzogen.

Dazu gesellen sich noch Hämorrhagien, als: blutiger Urin, Gebärmutter Blutfluß, blutige Diarr-

Diarrhoe, kolliquatives Nasenbluten; ferner äußerst kopiöse, ölichte, röthlichte, nicht selten dem Blutwasser (*Serum cruentum*) ähnliche Schweisse. Das Blut aus der Ader gelassen, bildet wohl einen Blutkuchen, dieser ist aber schleimicht, spielt wie ein Regenbogen gegen das Licht, coagulirt sehr langsam und schwach, gleicht einem lockern Brey; das *Serum* selbst sieht röthlich aus, und das Blut selbst riecht am Ende gleichfalls faulicht. Es extravasirt endlich in das Zellgewebe der Haut, und bildet allda rothe, blaue, oft schwarz farbige Flecken, die zuweilen so groß wie Sugillationen (*Vibices*) werden, *Petechien* genannt; so auch Gangren an diesem oder jenem Theile z. B. durch bloßes Liegen darauf erzeugt.

Das begleitende Fieber hat keine Remissionen mehr, sondern den Typus einer Continens angenommen, und verbinden sich dann mit diesem sehr gerne Entzündung der Lungen oder sonst eines Eingeweides des Unterleibes; daher die faulichte Lungenentzündung, oder *Meteorismus*, oder *Diarrhoea putridissima* mit tympanitischem Unterleibe.

Wo diese letztgenannten Erscheinungen zum Vorschein gekommen, oder die Hamorrhagien ganz kolliquativ geworden, oder ein vollendeter soporöser Zustand sich ausgebildet, oder die Gangren je eines äußeren Theiles über Hand nimmt, ist das Todesurtheil ohne Rettung gesprochen.

B.

B.

Secundäres, gemischtes Faulfieber.

Febris putrida secundaria, composita.

Was dieses Geschlecht des Faulfiebers anlangt, so verstehen wir darunter alle jene Fälle, wo irgend eine Krankheit ihren ursprünglich eigenthümlichen Charakter und Typus mit jenem des Faulfiebers vertauscht hat. Daher werden die hieher gehörigen Faulfieberarten darum genannt a) *secundär*, weil sie die Folgen einer andern vorhergegangenen Krankheit sind, und b) *gemischte*, weil der Charakter des primären Faulfiebers durch die Individualität sowohl der vorhergegangenen Krankheit, als auch derjenigen Systeme, in welchem dasselbe versiret, getrübt werden, folglich nicht mehr rein sind, und darum einen gemischten Charakter angenommen haben.

In diagnostischer Hinsicht gelten daher für dieses Geschlecht des Faulfiebers folgende Sätze:

- a) Im ersten Stadio dieses Faulfiebers werden die Charaktere der demselben vorhergegangenen Krankheitsformen immer noch vorherrschen, nur mit dem allgemeinen Charakter des Faulfiebers tingirt, bis die ersteren nach und nach immer mehr den letztern sich subordiniren werden. Dennoch aber werden
- b) die dem reinen Faulfieber eigenthümlichen Charaktere durch ihren ganzen Verlauf nicht
nur

nur der *Qualität* desjenigen Systemes, in welchem die vorhergegangene Krankheit versirt hat, gemäß sich formen, sondern

c) vorzüglich auch in eben demselben prädominiren, so wie auch in ihrer größern Heftigkeit allda zum Vorschein kommen. Daher sind

1) bey einem s. g. *Febris gastrica putrida*, mit denen *sub A.* 2) genannten Erscheinungen vorzüglich die gastrischen Erscheinungen verbunden. Man bemerket demnach in diesem Falle sowohl gleich anfangs als auch bis ans Ende eine große Neigung zu Schweißen; eine schmutzige, weißlicht belegte Zunge; faulicht bitteren Geschmack, beständigen Ekel, Neigung zum Erbrechen, öfteres gallichtes Erbrechen und Durchfall, beydes faulicht riechend, gänzlichen Mangel an Appetit; dunkelrothen und kleynartigen Urin; schwarzgelbe Gesichtsfarbe, die vorzüglich im Weissen des Auges sichtbar. Die treuesten Begleiter dieser Faulfieberart aber sind Friesel und Petechien.

2) Bey dem s. g. *Febris inflammatoria putrida* zeigen sich als Reste der vorhergegangenen *Synocha* heftige und topische Schmerzen, den rheumatischen ähnlich; z. B. Glieder - Kopf - Brust - Schmerzen; kleiner, ge-

geschwinder und ungleicher Puls; blasses zusammengefallenes Gesicht; ganz kalte Hände und Füße; sehr beklemmter und kurzer Athem; wässerichte und faulriechende Diarrhoe mit Bauchgrimmen; kalter, klebrichter, kolliquativer Schweiß; unwillkührlicher Abgang der Excrementen und des Urins; Schluchzen, Sehnenhüpfen; weiser Friesel, Schlafsucht, Verlust alles willkührlichen Gebrauches seiner Kräfte. etc. Woran man übrigens den Uebergang einer lokalen Entzündung irgend eines Theiles in das Faulfieber erkennen könne, habe ich an seinen Orten in der ersten und zweyten Abtheilung des zweyten Theiles dieses Handbuches angegeben.

- 3) Ist das *Febris putrida* aus einer *nervosa* entstanden; dann sind mit dem Zeichen der *putrida* jene der *nervosa* gleich im ersten Anfange verbunden. Ein vorzüglich charakteristisches Zeichen dieser Fieberart aber ist der beständige obgleich nur momentane Wechsel der dem Faulfieber eigenen Erscheinungen mit ihren entgegengesetzten, z. B. bald ist völliger *Stupor* bald wieder ausnehmende Empfindlichkeit vorhanden, daher ist das Gehör manchmal äußerst schwer, dann aber wieder sehr empfindlich; bald ist der Leib verschlossen, bald wieder blutige Diarrhoe u. s. w. Dabey ist der Puls mehr ungleich und kon-

konstringirt; als schnell und klein, u. s. f. bis endlich das *Schema* des primären Faulfiebers (S. A. 3.) sich ganz vollendet hat.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafte: Taubheit; Blindheit; *Stupor*, Verstandesverwirrung; Verlust des Gedächtnisses; Lähmungen ganzer Gliedmaßen, allgemein konvulsivische Zustände; Hysterie und Hypochondrie; Abscesse; Forunkeln, Gangren; Lungenschwindsucht, chronische Diarrhoe.
- b) Tödliche (S. oben *sub* A. 3.) am Ende.

S c h ä d l i c h k e i t e n.

Außer den erst vorhin genannten Arten des secundären Faulfiebers, und allen jenen Krankheiten, welche, wie in der ersten und zweyten Abtheilung des zweyten Theils dieses Handbuches gezeigt worden, in das Faulfieber überzugehen geneigt sind, sammt deren Ursachen, giebt es noch einige ganz besondere und unmittelbare Veranlassungen desselben, so zwar, daß wir in der Regel da, wo dieselben das Faulfieber verursacht haben, daraus schon auf die Gegenwart eines primären Faulfiebers schließen können.

Unter diesen unmittelbaren Veranlassungen unterscheide ich selbst hinwiederum zwischen denen, welche eine längere, und denen, welche eine kürzere Zeit ihrer Einwirkung zur Hervorbringung des primären Faulfiebers bedürfen.

Zu

Zu den ersten rechne ich

- a) allgemeine Schwäche der Lebenskraft.
- b) Erschlaffung der festen Theile des Körpers,
- c) Scorbutische Diathesis.
- d) Profuse Ausleerungen, häufige Salivation, Ausschweifungen in der Liebe.
- e) Uebermäßige Anstrengung des Körpers und des Geistes, anhaltende Strapazen, und nächtliche Meditationen, besonders traurige und gehässige Gemüthsbewegungen. (Hierauf erklärt es sich sehr leicht, wie bey allgemeiner Noth und Elend Faulfieber - Epidemien herrschend werden können.)
- f) Anhaltender, häufiger oder übermäßiger Gebrauch s. g. schwächender und auflösender Mittel z. B. *Mercurialien*, *Alcalien*.
- g) Mangel an Nahrung, oder schlechte Nahrung, woraus am ersten die *Febris gastrica putrida* entsteht.
- h) Sitzende Lebensart, besonders in eingeschlossener Luft; daher auf Schiffen das Faulfieber so häufig, desgleichen auch feuchte Luft.
- i) *Puerperium*.
- k) Armuth. Nicht allein mittelst der allgemeinen Schwächung durch Mangel an Nahrung, sondern auch durch Unreinlichkeit (daher *febris putrida exanthematica*) und Traurigkeit (daher *febris putrida nervosa*.)

Zu

Zu den zweyten, die in ungleich kürzerer Zeit, und zwar oft so schnell Faulfieber erzeugen können, daß dem Ausbruche desselben auch nicht das mindeste Uebelbefinden vorangeht, rechne ich ausschliessend jeden faulichten Stoff, der in unsern Körpern aufgenommen wird. Dieser Stoffe sind indessen mehrere, in ihrer Qualität und dadurch in ihrer individuellen Beziehungsweise auf die einzelnen Systeme und Organe des menschlichen Organismus verschieden, so wie die Arten, in welchen sie in denselben übergehen können. Die wichtigsten indessen darunter sind:

- a) Das faulichte *Contagium*, welches durch die Haut und Lungen in unseren Körper gelangen, es mag dasselbe sich aus lebenden Körpern entbinden (*Contagium vivum*) oder aus todtten Substanzen entwickelt werden (*Contagium mortuum*) z. B. aus einer grossen Menge Kadavern nach Schlachten, nach Ueberschwemmungen, wenn der zurückgebliebene Schlamm, Fische u. s. w. in Fäulnifs übergehen.

Gelangt dieses *Contagium* in einen gesunden Körper, so ist das dadurch erzeugte Faulfieber als ein reines, primäres anzunehmen; trifft es aber einen kranken Körper, so ist das daraus entstandene Faulfieber ein gemischtes, secundäres.

- b) Jene faulichte Stoffe, die durch den Mund in uns aufgenommen werden, z. B. faule Eyer, faule

faule Fische, faules Wasser. In diesem Falle geht dem Faulfieber erst ein *Status gastricus* voran, somit ist dasselbe ein secundäres.

c) Zurückgehaltene *Secreta*, besonders zurückgehaltene Hautausdünstung bey anhaltender feuchter Luft, selbst in feuchten Wohnungen; gehemmte Urinabsonderung, bey der Ischurie, wo gewöhnlich ein Faulfieber nachfolgt, so auch gehemmter Stuhlgang u. s. w.

d) Die Erzeugung eines putresciblen Stoffes in unserem Körper selbst, als sind

α) die gastrische Fäulniss, die allgemeine Fäulniss erregen kann.

β) Eiter, welches resorbirt wird, besonders bey inneren Geschwüren, z. B. bey der Lungenschwindsucht, die Fäulniss zur Folge hat; so auch bey faulichten Blattern, topischer Fäulnis (*Gangrena, Sphacelus*.)

P r o g n o s e.

Vor allem gründet sich die Prognose auf die Beschaffenheit der Kräfte des Kranken, und zwar in der Art:

a) Je mehrere Zeichen von Mangel an Kräften vorhanden, und je frühzeitiger diese sich einstellen und zunehmen, desto ungünstiger ist die Prognose.

b)

b) Eine Hauptsache hiebey ist die Beschaffenheit des Pulses (S: oben-sub A: 2: c.)

c) Je schneller s. g. excitirende Mittel die Kräfte des Kranken wieder heben, desto günstiger die Prognose, und umgekehrt.

Es kommt vorzüglich viel auf die übrige Gesundheits-Beschaffenheit des Kranken an. Befällt daher das Faulfieber ein schon kränkliches oder gar krankes Individuum, so ist dasselbe ungleich gefährlicher, als wenn ein gesunder Körper davon ergriffen wird.

In der Regel ist das secundäre Faulfieber immer gefährlicher, als das primäre.

Sehr viel kommt hiebey darauf an, ob der Kranke in der Lage ist, alles, was zur Heilung erforderlich ist, befolgen zu können, z. B. Reinlichkeit, frische Luft, kurz alle Requisiten des Heilungsgeschäftes.

Uebel ist es, wenn die Augen des Kranken sich entzünden, der Kranke unaufhörlich delirirt, stammelt, hastig spricht, und unwillkührlichen Abgang der Excrementen hat.

Tödtlich ist es, wenn der Kranke die Zunge nicht aus dem Munde bringen kann, sich beständig die Brust entblößen will, unaufhörlich die Beine aus dem Bette streckt, immer aus dem Bette heraus will, und auch beständig davon phantasiret, daß er sterben müsse.

Töd-

Tödliche Anzeigen sind, wenn ein *Meteorismus* sich einstellt mit stinkender und kolliquativer Diarrhoe, was immer vorhandenen Brand im Unterleibe beweist. Ferner Petechien mit Diarrhoe und *Meteorismus*; beschwerliches Schlucken mit einem hörbaren Herabfallen der Flüssigkeiten verbunden; Blindheit, die sich einstellt; Gelbsucht mit allgemeinem Zittern und einem schnellen, geschwinden und kleinen Pulse verbunden.

Die beym Faulfieber vorkommenden Ausleerungen sind immer sehr verdächtige Erscheinungen, theils weil sie in der Regel die Krankheit selbst noch verstärken, theils weil sie eine große Höhe derselben selbst beweisen. Hiher gehören zunächst die kopiösen Schweisse und der kolliquative Urinabgang. Indessen ist zuweilen mit denselben die Abnahme des Faulfiebers verbunden, und man kann es daran erkennen:

- a) wenn sie *tempore critico* sich einstellen;
- b) wenn sich dabey der Puls hebt, und Besserung der Symptome sich einstellt;
- c) wenn keine Petechien zugleich mit vorhanden;
- d) wenn mit der *Diabetes* zugleich Schweisse verbunden sind,
- e) wenn im Urin kleine Floken und salzkrySTALLen ähnliche und glänzende *Spicular* sich zeigen.

Diarr-

Diarrhoe und Hämorrhagien sind immer bedenklich, und müssen möglichst schnell beseitigt werden.

Gute Anzeichen sind: wenn Taubheit sich einstellt; Forunkeln zum Vorschein kommen, und die *Parotis* geschwillt, daher man diesen Geschwulst suchen muß zu unterhalten; desto schlimmer aber, wenn und je schneller er wieder verschwindet.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Allzugrofse absolute Potenzirung der Sensibilität bey gleichmäfsiger Depotenzirung insbesondere der Reproduction.

H e i l u n g s a n z e i g e.

Verminderung der absoluten Potenzirung der Sensibilität, und gleichzeitige und gleichmäfsige Potenzirung der Reproduction.

H e i l v e r f a h r e n.

Im allgemeinen gilt hier dasselbe, was oben S. 222 – 225 erinnert worden ist.

Da übrigens das Wesen des Faulfiebers darin besteht, daß die Sensibilität absolut potenzirt, und diesem gleich die Reproduction depotenzirt ist, so müssen hier nothwendig Arzneykörper angewendet werden, welche eben diesem Zustande der Sensibilität und Reproduction entsprechen. Nach frühern Beweisen gehören demnach hieher alle diejenigen Arzneykörper, welche in die Reihe der s. g. kohlenstoffhaltigen fallen.

In—

Indessen leidet das allgemein indizirte Heilverfahren insofern einige Modificationen, als nicht alle Faulfieber primärer Beschaffenheit sind, sondern auch secundärer Art seyn können, wie erwiesen und gezeigt worden. Demnach müssen die specifischen Beschaffenheiten der vor oder gleichzeitig affizirten Systeme und Organe hiebey genau in Anschlag gebracht, und deren Qualitäten gemäß die allgemeine Methode modifizirt werden.

Die angezeigten Mittel für das Faulfieber sind demnach folgende:

I. Diät. Sieh S. 225. und meine Schrift: Was soll man in den jetzigen Kriegszeiten thun, um sich gegen die Gefahren des Nerven- und Faulfiebers zu schützen. Leipzig, 1807.

II. Hausmittel. Sieh S. 289.

III. Arzneimitteln. Um Wiederholungen zu vermeiden, werde ich die hier angezeigten Arzneimitteln einzeln angeben, die besondere Art, Regeln, Zeit und Ort ihrer Anwendung und die sonst dabey nothwendige Modificationen bey jedem derselben mit angeben. Die wichtigsten darunter sind:

i) *Cortex peruvianus*, ist in der Regel vom Anfange bis zum Ende des Faulfiebers indizirt; ganz besonders aber,

a) wenn die Schwäche gar zu groß ist; daher je kleiner, schneller und matter der Puls;

B b

b) Je

- b) Je mehr *Stupor* zugleich vorhanden;
- c) Je mehr colliquative Zufälle, Haemorrhagien u. s. w. sich einstellen;
- d) Wenn die Zunge sehr schmutzig und mit einer schwarzbraunen Rinde belegt ist;
- e) Wenn das Fieber eine Continens geworden;
- f) Wenn die Hitze noch trocken ist.

Sollte indessen in diesen Fällen die *China* die erwarteten Dienste nicht leisten wollen, dann liegt der Grund davon gewöhnlich in der Form, worin sie angewendet wird. Am besten ist es daher, wenn man die *China in forma liquida* gebrauchen läßt, und ihr dann noch *Naphta vitriol*, *Liquor. anod. m. H.*, bey sehr grossem *Stupor* *Tinctur cantharid. g℞. IV. pro Dosi* zusetzen, oder auch diese mit *Campher*, *Alcali volatile* abwechselnd gebrauchen läßt.

Ist das Faulfieber aus einer *Synocha* entstanden, dann hüte man sich anfangs vor *China*; am besten wirken hier *Campher*, *Arnica*, *Valeriana*, *Senega*.

Ist dem Faulfieber ein *Status gastricus* vorgegangen, und der Kranke sehr empfindlich und schwächlich vom Magen, dann verordne man die *China* im *Infusum*, und setze demselben noch *Essent. cort. Aurant.* und *Liquor anod. m. H.* hinzu. Oder man nehme die *Tinctura cort. peruv. Whyth.* z. B. 80. g℞. *pro Dosi*.

Da die Surrogaten der *China* allgemein bekannt sind, so mag es hier schon genug seyn, ihrer nur ge-

gedacht zu haben, ohne mich auf ihre Anwendungsart selbst einzulassen.

2) *Radix serpentariae virginicae* ist vorzüglich da und dann indiziert, wo und wann es darauf abgesehen ist, die Kräfte des Kranken zu heben; darf aber durchaus nicht angewendet werden, wenn Colliquationen vorhanden sind.

3) *Radix et flores arnicae* sind vorzüglich indiziert

a) bey *febris gastrica putrida*, besonders

b) wo Diarrhoe, Colliquation vorhanden; indessen ist hier *Radix* den *Floribus* vorzuziehen, letztere passen mehr,

c) wo die *Nervosa in putrida* übergegangen, und *Stupor* des ganzen Systems vorhanden ist.

4) Wein, besonders Rheinwein ist zunächst indiziert, je mehr die Kräfte des Patienten sinken, wenn der Puls kleiner und geschwinder wird, und die *China* nicht so recht wirken will.

Am wirksamsten ist in dem Falle ein *Infusum chinae vinosum* zum gewöhnlichen Getränke.

In Ermangelung des Weines kann man auch des Branntweines mit Wasser etc. verdünnt, der *Tinctur cort. peruv. Whvth*, oder der *Tinctura amara Londinensis* zu 60 — 70 Tropfen in $\frac{1}{2}$ Tasse Wasser aller 2 Stunden sich bedienen.

Sollten aber auf dem Gebrauch des Weines die *Deliria* zunehmen, die Augen sich entzünden, die Sprache hastig und heftig werden, der Wein selbst

Hitze und Unruhe etc. bewirken, dann lasse man ihn vorerst noch bey Seiten:

Oft vermehrt der Wein die colliquativen Ausleerungen; dann darf man nur statt des Rheinweines und ähnlicher Weine rothen Franzwein verordnen, und es geht sogleich besser.

5) *Radix valerianae minoris*. pafst vorzüglich in *Stadio primario*, aber auch in der Folge, besonders

- a) wenn starke Krämpfe vorhanden,
- b) wenn die *Nervosa* in die *Putrida* übergegangen.

Nur dann, wenn die Kolliquation der Haut sehr grofs und stark ist, ist sie kontraindiziert.

6) *Acida mineralia*, besonders bey *Calor mor-
dax*, und Kolliquationen. Die wirksamsten darunter sind:

- a) *Spiritus vitrioli*, am zweckmäfsigsten anwendbar bey der *inflammatoria*, und in denen Fällen, wenn die Kolliquationen, Blutflüsse, Schweisse u. s. w. sehr dringend werden.
- b) *Acidum Salis*, besonders indiziert, wenn im Darmkanal viele faulichte Stoffe vorhanden, *Meteorismus*, *Diarrhoe*, Kolliquation zugegen sind.
- c) *Acidum Nitri*, ganz vorzüglich, wenn die *Putrida* aus der *Synocha* oder irgend einer ihrer Formen entstanden.

Zu-

Zuweilen erregt der *Spiritus Vitrioli* Diarrhoe, Kolik, Magenkrampf; in diesem Falle substituirt man demselben am besten das

d) *Elixir acidum Halleri*, besonders bey der s. g. *Inflamatoria*. Ist aber der Kranke sehr entkräftet, dann wähle man vor diesem *Elixir* lieber das

e) *Elixir vitrioli Mynsichtii* z. B. zu 40 Tropfen aller 2 Stunden,

7) *Naphtha Vitrioli, Aceti* ist besonders anwendbar in denen Fällen des Faulfiebers, wo grofse Unempfindlichkeit und *Stupor* vorhanden, und die Verrichtungen des Darmkanals sehr darniederliegen. Kontraindizirt ist sie aber dann, wenn Durchfälle zugleich mit zugegen sind.

8) *Champher* zeigt sich am wirksamsten in der *Putrida*,

a) wo die Functionen des Nervensystems sehr darniederliegen, dabey viele krampfhafte Symptome sich äufsern z. B. *Deliria*, *Subsultus tendinum*;

b) wenn der Puls sehr klein und weich ist;

c) wenn das Gesicht des Patienten sehr eingefallen und todtenbleich ist;

d) Im *Stadio* des Ueberganges der *Gastrica* in die *Putrida*;

e) Bey klebrigten Schweißsen und exanthematischen Erscheinungen.

Die

Die beste Form, in welcher der *Campher* gegeben wird, ist eine *Emulsion* desselben in Verbindung mit *China*.

Außerdem wendet man denselben auch äußerlich an, besonders wenn sich irgendwo eine *Idiosyncrasie* vorfindet,

a) In Klystiren, z. B. *Ol. Bezoard. Drjj. Napht. Vitriol Drj*, wovon unter jedes Klystir 40 — 50 Tropfen zu mischen;

b) Als Einreibungen in die Hände, Füße, Schläfe, Rückgrath, wozu man am besten den *Spirit. Vin. Camphorat.* gebraucht. Man kann mit demselben auch außerdem *Servietten* befeuchten, und sie auf den Unterleib legen lassen.

c) Als *Fomentationen*.

9) *Opium*, vorzüglich anwendbar bey der *gastrica putrida*, und auch in dem Falle zunächst da, wo sich häufige Durchfälle und Erbrechen und Zeichen der Entzündung sowohl in den Gedärmen als den Lungen vorfinden.

Die besten Formen des *Opium* im Faulfieber sind

a) *Laud. liquid. Sydenhami*,

b) *Opium in Emulsion*.

10) *Moschus*, *Liquor C.C. succinat*, *Alcali volatile*, verdienen den Vorzug,

a) bey häufigen Schweißsen, Friesel, Petechien;

b) Bey vorzüglichen Affektionen des *Sensoriums*;

Aus-

Außer den bisher genannten Arzneykörpern gehören hieher noch als vorzüglich wirksame Mittel:

11) *Vesicatoria* und *Rubefacientia*, sind in der *Putrida* ungemein schätzbar, und wirken oft mehr als eine Bouteille Wein. Leisten diese keine Wirkung mehr, dann ist keine Hoffnung mehr vorhanden. Indessen muß man bey ihrer Anwendung sehr vorsichtig seyn, weil die vesicirten Stellen leicht brandig werden.

Am wirksamsten, folglich dienlichsten sind sie:

- a) bey großer Unempfindlichkeit und Stumpfheit der Sinne,
- b) wenn das Gesicht des Kranken roth und aufgetrieben ist, Patient heftig delirirt und hastig spricht,
- c) bey anfangenden örtlichen Entzündungen der Brust, des Unterleibes und des Gehirns.

Schädlich sind sie aber in dem Falle, wo die Empfindlichkeit des Kranken sehr groß, die Kolliquation ausnehmend stark, und die lokale Entzündung schon weit vorgeschritten ist.

Uebrigens wählt man zu diesem Behufe statt den *Vesicatorien* lieber *Sinapismen*.

12) Bäder, und zwar in der Art:

- a) Darf das Bad nie zu warm seyn, sondern der Grad, der nicht kältend ist, ist der beste.

b) Ver-

- b) Verbinde man mit demselben immer aromatische Kräuter, am besten *Hb. Scordii*, *Card. Benedict*; *Rad. Calam. aromat*; *Rad. Angelicae*; *Flor Lavendulae*; *Chamomill Rom.*, *Hb. Salv.*, *Millefolii*.

Ganz vorzüglich wirksam werden diese aromatischen Bäder durch einen Zusatz von *Alcali*, oder Wein, oder *Acetum vini*, oder *Spirit. vini*, besonders aber von *Spirit. vini camphorat*.

- c) Der Kranke darf nicht zu lange im Bade verbleiben, etwa $\frac{1}{2}$ Stunde, weil darüber seine Kräfte nicht ausdauern.
- d) Sollten sich diese Bäder nicht anwenden lassen, dann instituire man topische Bäder, z. B. der Füße, Arme auf obige Art, mehrere Malen des Tages wiederholt, und durch die ganze Krankheit hindurch fortgesetzt.

13) Klystiere sind nothwendig und von großem Nutzen,

- a) wenn der Magen zu empfindlich ist, als daß er die verordneten Arzneyen, insbesondere die *China*, wenn sie auch sonst absolut indizirt seyn sollten, vertragen könnte;
- b) Wenn *Meteorismus*, kolliquative Durchfälle und ein übrigens sehr hoher Grad von Fäulnis vorhanden;
- c) Wenn Verstopfung sich einstellt.

In den beyden ersten Fällen *a*, *b*, verordne man China - Klystire zu *Unc. β pro Dosi*, nebst
eben

eben so viel *Ol. Lini* aller 4 Stunden. So auch 1 Unze Wein mit einer schleimichten Flüssigkeit *per Clysmata* öfters apliziert thut vortrefliche Dienste.

Sollten sie gleich wieder abgehen, so setze man denselben hinzu *Laud. Liquid. Sydenham*.

In dem dritten Falle lasse man Klystiere von *Chamomillen* und *Valerianae Infus*, nebst *Ol. Lini*; und wenn diese nicht zureichen, mit einem halben bis ganzen Eßlöffel voll gestossenen Zucker reichen.

Uebrigens ist es hier weit besser, wenn der Leib verschlossen, als Diarrhoe vorhanden ist.

14) Aromatisch - spirituöse Fomentationen und geistige Einreibungen auf den Unterleib sind vorzüglich rathsam bey *Meteorismus* und Durchfällen.

A n m e r k u n g e n.

A. Wenn man bey der Anwendung der bisher genannten Mitteln nicht die größte Reinlichkeit verbindet, so helfen sie alle nichts.

B. Je mehr bey dem Gebrauche dieser Mittel die Kräfte sich heben, und der faulichte Zustand sich verbessert, in demselben Verhältnisse lasse man mit den spirituösen und flüchtig reizenden Mitteln nach; desto länger aber muß man mit dem Gebrauche der anhaltend stärkenden Arzneyen, und selbst noch einige Zeit nach der Krankheit fortfahren, besonders, wenn die Anschwellung der *Parotis*, Forunkeln, Taubheit u. s. w. noch vorhanden seyn sollten.

Eini-

Einige besondere Symptomen des Faulfiebers, und deren Behandlung.

Eine ganz besondere therapeutische Rücksicht verdienen

I. Die Delirien, Konvulsionen, der Trismus, Tetanus, *Subsultus tendinum*, Zittern am ganzen Leibe.

Wenn mit den genannten Zufällen zugleich eine äufferste Entkräftung, ein kleiner und weicher Puls, und *Stupor* verbunden sind, dann ist die stärkste Anwendung der excitirenden und roborirenden Mitteln, besonders Wein, *Campher*, *Serpentaria*, *China*, *Liquor C. C. Succinat*, *Valeriana* vonnöthen, ganz besonders aber die Application von *Vesicatorien* und *Synapismen* in Nacken und auf die Waden. Indessen erregen die *Vesicatorien* an den untern Extremitäten leicht den Brand.

Wenn aber die genannten Symptomen mit sehr grofser Empfindlichkeit des Kranken verbunden sind, der Puls klein und hart ist, der Kranke bey jedem Geräusche, selbst bey dem Befühlen des Pulses erschreckt, nicht das mindeste Licht vertragen kann, das Delirium in Raserey übergeht; hier passen obige *Spirituosa* und *Vesicatoria* wenig oder gar nicht; dagegen sind hier ganz vortreflich *Moschus* in recht grofsen Dosen, z. B. 1 *Scrupel* bis Dr β auf einem Male. Reicht dieser nicht zu, dann

dann *Opium*, und zwar in den stärksten Dosen z. B. 40, gr. *pro Dosi* aller 3 Stunden.

II. *Diarrhoe*. Wenn noch andere Zeichen der Kolliquation vorhanden sind, die Ausleerung kadaverös ist, mit jeder derselben die Kräfte des Kranken schwinden bis zur Ohnmacht, dabey der Puls immer kleiner und schneller wird, und die Delirien zunehmen, dann muß man ernstlich darauf bedacht seyn, der *Diarrhoe* entgegen zu arbeiten. Zu dem Ende sind am dienlichsten: *Rad. Arnic*, *Serpentar* aller 2 Stunden, mit oder ohne *Laudanum Liquid. Syd.* nach Befinden der Umstände; aromatische Fomentationen mit *Opium* auf den Unterleib; Klystiere von *China* mit *Arnic* und *Laudanum*; und wenn alles nicht fruchten will, so gebe man innerlich ein saturirtes Decoct von *China* mit *Terra Japonica* und einem Zusatz von *Opium*.

III. *Sudor Colliquativus*. Wenn Beweise vorhanden sind, daß innere Kolliquation vorhanden ist, dann dienet hierzu am besten *Elixir acid. Halleri*; *cort. Quercus, peruvianus*, jedoch nur in den stärksten Dosen, mit Ausnahme der im vorigen bezeichneten besondern Modification dieses Zufalles.

Was übrigens die neuerdings von der naturphilosophischen Schule wieder aufgewärmten und selbst bey gewissen Faulfieberarten für absolut nothwendig und vernünftig erklärten Indicationen zu Brech - Laxier - Purgiermittel und Aderlässe anlangt, so beweiset diese Schule selbst
nur

nur ihre eigene empirische Tendenz, und verdient hier um so weniger einer Würdigung, als wir uns vielmehr dieser offiziellen Daten erfreuen, um daran faktisch nachweisen zu können, wessen Geistes Kind dieselbe ist, nemlich ein ganz gemeiner Eklekticismus, dem die Vernunft nothgedrungen zu Bathen hat stehen müssen!!!

Nervenfieber.

Febris nervosa.



Definition.

Unter Nervenfieber verstehen wir diejenige Ordnung des Fiebers, bey welcher das Nervensystem in seiner innersten Tiefe ergriffen erscheint.

Zufälle.

Auch hier, wie beym Faulfieber müssen wir genau wissen und unterscheiden, ob das vorhandene Nervenfieber ein primäres oder secundäres sey, und in letzterem Falle selbst müssen wir wiederum genau darauf achten, ob die dem Charakter des Nervenfiebers an sich fremdartigen, mit ihm aber nunmehr verbundenen Erscheinungen 1) dem Ausbruche des eigentlichen Nervenfiebers schon vorhergegangen, oder 2) im Verlaufe desselben erst zum Vorscheine gekommen. Diese Nichtachtung oder Verwechslung beyderley Vorgänge war bisher die nächste Ursache von den sowohl in den Handbüchern der Therapie als am Krankenbette selbst vorgekommenen Verwirrungen sowohl in der Diagnose als in der Behandlung des Nervenfiebers.

Ja

Ja selbst unsere neuesten Therapeuten unterscheiden hierinn noch nicht genau genug, und konfundiren sonach noch immer ihre Indicationen und Heilverfahren.

Wie nothwendig und wichtig eine genaue Unterscheidung beyder von einander verschiedenen Fällen sey; kann man schon daraus ersehen, indem im ersteren Falle 1) das Heilverfahren nach der Qualität der vorhergegangenen Krankheit schlechterdings modifizirt werden muß, nicht so aber im anderen Falle 2), wo nichts weiter erfordert wird, als daß die angezeigten allgemeinen Mittel nur mehr unmittelbar auf das vorzüglich leidende Gebilde, Organ u. s. w. und in stärkern Dosen angewendet werden muß. Da mit diesem Lehrsatze die Erfahrung immer vollkommen übereinstimmig gefunden worden, so glaube ich hierin auch zunächst den Grund gefunden zu haben, warum die Brownianer die sonst üblige Benennungen der s. g. komponirten Krankheiten als Unsinn aus der Diagnostik und Therapeutik verworfen, obgleich auch hieran wiederum die Einseitigkeit des Brownianismus sich erwiesen hat.

Wir klassifiziren demnach auch hier wiederum das Nervenfieber nach seinen beyden Geschlechtern, nämlich dem primären und secundären, und sind die pathognomonischen Erscheinungen derselben wie der Arten, folgende:

A.

Primäres Nervenfieber.

Febris putrida nervosa.

Auch das primäre Nervenfieber hat seine Vorbothen, wenn nicht dieselben Umstände, die bey dem Faulfieber schon erinnert worden, auch hier eintreten. Im ersteren Falle erkennt man den Verlauf desselben an folgenden Erscheinungen.

- i) Vor dem Ausbruche. Schon einige Zeit hindurch fühlt sich das zu erkrankende Individuum am Geiste und Körper abgespannt, ist ohne Muth und Entschlossenheit, leicht vergesslich, niedergeschlagen, missmuthig, sehr reizbar und empfindlich, fühlt sich durchaus sehr erschöpft und ermattet, besonders Früh Morgens, so lange er nüchtern ist; isst oder trinkt der Kranke etwas, wird es ihm wieder besser, sobald aber die Zeit der zweyten Verdauung kommt, stellt sich das alte Uebel wieder ein, bis die Verdauung vorüber ist, wo er sich wieder besser befindet, das ist am Ende.

Weiterhin fühlt er eine bleyerne Schwere in den Gliedern, leichte Gichtschmerzen abwechselnd mit Pelzichtheit einzelner oder mehrerer Glieder; anfliegende Hitze, die schnell wieder mit einem Frösteln abwechselt; der Urin ist meist wässerig, krüde, variabel, mitunter noch saturirt; der Puls klein, etwas hart, und zuweilen schnell und voll, doch ist

dies

diefs periodisch, so zwar, dafs er bisweilen wieder langsam und weich, und damit das Befinden des Kranken besser wird.

Noch weiter hin leidet sehr die Verdauung und das ganze gastrische System, der Kranke hat Verschleimung, eine belegte Zunge, Mangel an Appetit, Ekel, Ueblichkeit, die zuweilen in Heifshunger übergeht; *Vomitus spontaneus*; die Haut ist gewöhnlich trocken, frostig, zuweilen aber auch mit grofsen kalten Schweifstropfen bedeckt, auch der Mund ist gewöhnlich trocken; die Augen trübe, Flecken vor den Augen (*Scotomia*); bey jeder noch so geringen Muskelanstrengung wird der Athem schwer, abwechselnd mit Krämpfen im Unterleibe und Kopfe.

Kurz vor dem Ausbruche bekommt Patient Abends Frösteln, mit Schwäche, Müdigkeit, unruhigem Schlaf; der Puls ist Abends immer schneller und krampfziger; dazu gesellt sich äufserste Niedergeschlagenheit, stärkere Verdauungsbeschwerden, öfters kalte Schweisse an den Extremitäten, der Drang zum Urin wird immer häufiger; der Urin selbst äufserst wässerigt und schaumigt; es stellen sich Ohnmachten, wenigstens Anlage dazu, ferner Zittern der Hände, besonders häufiger Schwindel, *visus confusus*; eine eigene weinerliche Stimmung des Gemüthes mit beständiger Schläfrigkeit, ohne festen Schlaf zu bekommen, ein,
die

die Kräfte des Kranken schwinden immer mehr, und damit auch das Fleisch des Kranken.

- 2) Während dem Ausbruche. Jetzt erscheint das Fieber ganz ausgebildet, mit einem beständigen heftigen Frieren, abwechselnder Hitze, wozu sich Schweisse gesellen, die aber schnell wieder verschwinden, und ohne Erleichterung; der Puls ist durchaus ungleich, bald langsam, natürlich, bald wieder schnell, bald klein, bald voll und groß; auch der Typus und die Perioden des Fiebers sind irregulär z. B. bald ist die Exacerbation Früh, bald Abends, bald scheint das Fieber remittirend, bald intermittirend, bald sind gar keine Intermissionen da; die Symptomen korrespondiren sich eben so wenig: z. B. ein System ist stupid und torpid, das andere hingegen übermächtig gereizt, so auch Hitze oder Durst; der Urin ist bald hell, durchsichtig und mit Strangurie verbunden, bald wieder mehr roth und trübe, bald wieder blafs und wässerigt; die Delirien sind bald gelinde, bald heftig bis zur Raserey, der Patient bald niedergeschlagen, bald wieder munter und lebhaft u. s. w.

Bey der Zunahme bis zur grössten Höhe. In der Folge gesellen sich noch hinzu Ohnmachten, erschwertes Schluken; Stämmeln; *Carpologia*; *Crocismus*; *Vomitus frustaneus et inanis*; *Epilepsia*; *Excretio involuntaria alvi et urinae*; Exanthemen; Drüsenge-

C c. ; schwüls-

schwülste, Bubonen, Parotiden, Blutflüsse allerley Art, da und dort Brandflecken, Brand ohne sonderlichen Schmerzen. Endlich stellt sich ein scheinbares Befserfinden, und Verminderung aller der heftigsten Erscheinungen, damit aber auch zugleich der Tod ein.

B.

Secundäres Nervenfieber.

Febris nervosa secundaria.

Ich rechne hieher nur zwey Fälle, nemlich es kann ein s. g. Entzündungsfieber und s. g. gastrisches Fieber, nicht aber auch ein Faulfieber in ein Nervenfieber, obgleich dieses in jenes übergehen. Der neuerdings wiederum aufgestellte *Typhus putridus* ist daher nicht sowohl ein *Febris putrida nervosa*, sondern vielmehr ein *Febris nervosa putrida*; daher wir hier auch nur diese beyden Arten als solche gelten lassen, und hier charakterisiren, nemlich

- 1) *Febris inflammatoria nervosa.* Bey dieser Art des Nervenfiebers bemerkt man, daß die eigenthümlichen Charaktere desselben mit dem eines *Continens* verbunden sind; der Puls ist daher etwas hart, mitunter groß und voll; die Hitze mit Durst verbunden, die Zunge trocken, das Gesicht glühend, heiß und roth, die Augen ein wenig entzündet, verbunden mit Kopfschmerzen und Gliederreissen; die Respiration
sehr

sehr beschleunigt, der Appetit nicht ganz verschwunden, der Stuhlgang noch trocken und eher vermehrt noch, als verstopft, die Delirien heftig, ununterbrochen, an Raserey gränzend, endlich Peripneumonie, die zuletzt in Brand übergeht.

- 2) *Febris gastrica nervosa*. Die Gegenwart dieser Fieberart erkennt man daran, wenn mit den Zeichen des Nervenfiebers noch die bekannten des *Status gastricus* verbunden sind, so zwar, daß diese schon im *Stadio prodromorum* nicht nur sich vorzüglich zeigen, sondern auch während dem Verlauf des Fiebers immer vor den übrigen prädominiren, bis am Ende *Meteorismus*, *Singultus*, immer zunehmende Delirien, rasender Kopfschmerz, Taubheit, *Subsultus tendinum*, und die Zeichen der Darm- und Leberentzündungen, und endlich die des Brandes sich noch einstellen, und damit das Leben sich endet.

A u s g ä n g e.

- a) Krankhafter Speichelfluß, Fricsel, Forunkel, Schvämchen, Lähmungen einzelner Glieder, Taubheit, Ausschläge allerley Art.
 b) *Tetanus*, *Trismus*, Apoplexie, Brand der Lungen, der Leber; Erstickung.

P r o g n o s e.

In der Regel ist bey dem Nervenfieber die Prognose immer ungünstig zu stellen, besonders

aber, wenn dasselbe ein primäres ist; weniger ungünstiger aber ist dieselbe bey dem secundären Nervenfieber.

Uebrigens gründet sich die Prognose auf den Zustand der Kräfte des Patienten; daher

- a) je voller und stärker der Puls wird, und je mehr seine Frequenz dem natürlichen sich naht, desto besser.
- b) Je mehr wasserhell der Urin, desto übler; je mehr roth und gefärbt aber, desto besser.
- c) Ein gutes Anzeigen ist der *Sudor halituosus, universalis et tepidus*; ungünstig dagegen ist die Prognose zu machen, wenn der Schweiß tropfenweis auf der Haut steht, oder kalt ist, oder schnell kommt und eben so schnell wieder verschwindet.
- d) Je mehr krampfartige Erscheinungen mit der Abnahme der Kräfte überhand nehmen, desto bedenklicher.

Sehr nachtheilig ist eine grofse Stumpfheit der Sinne; tödlich ein anhaltender *Stupor* mit flockenlesen, Schnenhüpfen und *deliriis taciturnis*.

Bey diesem Fieber giebt es mehrere unvollkommene Krisen als: Friesel, Schwämmchen und Speichelfluss. Ob dieselben auf dem Wege seyen, erkennt man:

1) Friesel. Diese sind zu erwarten, wenn

a) die Haut stäts trocken ist;

b) der

- b) der Kranke vom Anfange des Fiebers an mit kolliquativen Schweissen bedeckt ist;
- c) wenn am 6ten, 7ten, 10ten, 11ten Tage zuweilen auch noch später sich öfters flüchtige Schauer mit Gähnen, trockenem und kurzem Husten, Aengstlichkeit, periodisch beschwertem Athem, Pelzlichtseyn der Haut, abwechselnd mit einem feinen Stechen und Jucken in derselben sich einstellen.
- 2) Schwämmchen. Die Vorboten derselben sind, wenn
- a) die Haut durchaus trocken bleibt;
- b) wenn sich mit dem 7ten oder 14ten Tage ein ängstlicher Schmerz sich einstellt;
- c) wenn der Kranke eine Trockenheit, besonders in der Tiefe des Schlundes verspürt;
- d) wenn beständig Ekel vorhanden, mit Brennen im Schlunde, ohne sonstigen gastrischen Zeichen.
- 3) Speichelfluss. Man erkennt dessen Nähe
- a) wenn die Haut trocken, der Urin wässrig bleibt;
- b) wenn *tempore critico* die *Glandulae submaxillares* anschwellen;
- c) wenn Taubheit, Kopfschmerzen und Delirien mit einander abwechseln, und periodisch wiederkehren.

Schäd.

S c h ä d l i c h k e i t e n .

Es können zwar alle die bey dem Faulfieber genannten Schädlichkeiten auch Nervenfieber erzeugen; besonders wenn das zu erkrankende Subject einen zart gebauten Körper hat, und sehr empfindlich ist. Indessen giebt es doch insbesondere gewisse Einflüsse, welche dasselbe früher, schneller und unmittelbarer herbeyführen. Ich nenne hier zunächst:

- 1) anhaltend nasskalte Witterung; daher auf den nördlichen Seeküsten, so wie auch in England die Nervenfieber zu Hause sind. Ferner diejenigen Winter, die keine reine Kälte haben; desgleichen auch mephitische und durch animalische Dünste verdorbene Luft.
- 2) Anhaltende Anstrengungen des Geistes, besonders Lucubrationen.
- 3) Anhaltendes Nachtwachen.
- 4) Häufige Wochenbette, besonders wenn die Mutter ihre Kinder immer selbst stillt.
- 5) Ausschweifungen in der Liebe, und Onanie.
- 6) Anhaltende Ausleerungen, besonders Haemorrhagien, häufiges Aderlassen, häufige Pollutionen, weißer Fluß; *Gonorrhea chronica*, anhaltender oder öfterer Speichelfluß, chronische Diarrhoe.

7) Trau-

- 7) Traurige Gemüthsbewegung, besonders ein leidenschaftlicher Zustand des Gemüths.
- 8) Jede andere Krankheit und deren Stoffe können Nervenfieber erzeugen, insbesondere
 - a) wenn der zu erkrankende Körper dazu schon disponirt ist;
 - b) wenn die epidemische Konstitution schon nervös ist;
 - c) wenn dieselben Krankheiten zweckwidrig oder gerade entgegengesetzt behandelt werden.
- 9) Mangel an kräftigen Nahrungsmitteln.

Hieraus erhellet, daß das Nervenfieber gleichfalls, wie das Faulfieber, epidemisch, endemisch und sporadisch seyn könne.

Als Ursachen des epidemischen Nervenfiebers gelten indessen ganz besonders

- a) anhaltende, mephitische, nasskalte und unreine Luft;
- b) Allgemeine traurige Affekte, als Kummer u. s. w.
- c) Allgemeiner Mangel oder Fehler der Nahrung z. B. Hungersnoth, Mißwachs, Genuß von kranken Thieren.
- d) Das geeignete Contagium.

Zu

Zu den Ursachen des endemischen Nervenfiebers gehören zunächst,

- a) wenn das Klima je eines Ortes feucht und nasskalt ist;
- b) wenn der Ort volkreich und enge gebaut ist, mit hohen Häusern und Straßen;
- c) wenn die Lebensart eines Ortes sehr luxuriös ist.

H e i l u n g s k a r a k t e r.

Innormale absolute Potenzirung der Sensibilität des Nervensystems selbst, und vorzüglich des Sensoriums.

H e i l u n g s a n z e i g e.

Relative Potenzirung der Sensibilität, und zwar nach der ursprünglich eigenthümlichen Qualität des Nervensystems überhaupt, und des Sensoriums insbesondere.

H e i l v e r f a h r e n.

I. Diät. Ausser der beym Faulfieber erwähnten Vorschrift müssen wir hier noch folgende Bemerkungen diesfalls beyfügen.

- 1) Die Nahrungsmittel müssen alle aus dem animalischen Reiche genommen, in konzentrirter Gestalt, und besonders in flüssiger Form, mehr lauwarm, als heiss, in kleinen Dosen und öfter wiederholt,
und

und mit balsamischen Gewürzen tingirt gereicht werden.

- 2) Die Luft um den Kranken muß immer kühl, in stets gleicher Temperatur, rein und möglichst trocken erhalten werden.
- 3) Am zuträglichsten sind dem Nervenfieber-Kranken fleissiges Trinken, doch nicht in zugroßen Portionen auf einem Male.

Am zweckdienlichsten in diesem Fieber sind:

- 1) Weinpanaden, besonders mit alten Rhein- oder Franzweinen; dieselbe auch ausserdem mit etwas Wasser verdünnt sind ein dienliches Getränke.
- 2) Selzerwasser mit Wein, Eyerwasser mit Wein.
- 3) Pommeranzenmolken, vorzüglich wirksam bey solchen Subjekten, die viel in *Venere* gearbeitet, an häufiger Menstruation gelitten oder noch leiden, und mit dem *Fluor albus* behaftet sind.
- 4) Nicht junge aber bittere Biere sind hier ganz vortrefflich, und kann der Verfasser von demselben bezeugen, daß er in der größten Höhe eines Nervenfiebers, woran er selbst in Jena tödtlich darniedergelegen, von dem Genuße desselben erstaunenswürdige heilkräftige Wirkung an sich selbst erfahren habe.

II. Hausmittel. S. Faulfieber. S. 581.

III. Arzneymittel. Bey der Auswahl derselben kommt es hier vorzüglich auf die Qualität desjenigen Systemes an, in welchem das Nervenfieber zunächst und vorzüglich versiret. Im allgemeinen gelten daher folgende Bestimmungen:

- 1) Da das Sensorium die Irritabilität in der Sensibilität repräsentirt, (wie zu seiner Zeit erwiesen werden soll,) so sind in denen Fällen des Nervenfiebers, wo das Sensorium und die von demselben unmittelbar abhängenden Functionen leiden, vorzüglich diejenigen Arzneykörper indizirt, welche in die Reihe der s. g. stikstoffhaltigen fallen, als sind: *Moschus*, *Sal. volatile C. C.*, *Spirit. C. C.*, *Spirit. Sal. amoniaci*, *Sal. juccini*, *Essentie Ambrae*, *Phosporus*, *Castoreum*, *Tinctura Cantharidum*.
- 2) Alle diese Mittel sind ausserdem vorzüglich in denen Fällen des Nervenfiebers angezeigt, wo
 - a) das Sensorium sehr angegriffen,
 - b) Stumpfheit der Sinne vorhanden,
 - c) besonders wo der Puls klein, hart und krampfhaft, übrigens aber grofse Empfindlichkeit vorhanden ist.
 - d) Ueberhaupt überall, wo krampfartige Erscheinungen zugegen sind.

3) Im

5) Im allgemeinen genommen ist zwar der *Moschus* durch das ganze Nervenfieber das souveränste Mittel, und reicht allein schon hin, und thut Wunder,

a) Wenn man ihn gleich bey dem Ausbrüche des Nervenfiebers anwendet.

β) Solange noch keine Anzeichen des Brandes vorhanden sind, in welchem Falle er wenig oder gar nichts mehr fruchtet, sondern die *Naphta Vitrioli*, wo möglich, allein noch helfen kann, nur muß man sie dann zu 30 — 40 Tropfen *pro Dosi* reichen.

γ) Wenn man in den, zwischen dem 2ten und 3ten Stadium liegenden, Graden des Nervenfiebers denselben nicht sparsam reichet. Dieselbe erfordern zuweilen einen halben Scrupel *pro Dosi*.

δ) Wenn der vorliegende Fall von der Art und Beschaffenheit ist, wie die unter 2) genannten Fälle *a* u. *d*.

ε) Ist dagegen der Fall gleich dem unter 2) erwähnten Falle *b*, und grofse Schwäche zugleich vorhanden, so verordne man erst einige Zeit hindurch, und zwar so lange die *Tinctur Cantharidum*, bis die Stumpfheit der Sinne und der Stupor überhaupt sich verloren, und einige Empfindlichkeit an dem Kranken wieder bemerkbar ist.

§) Ver-

3) Vermindern sich auf dem Gebrauche des *Moschus* die Zufälle des Nervenfiebers, und unter diesen besonders die allzugrofse Empfindlichkeit, dann kann man statt des *Moschus* eines oder des andern der bey dem *Moschus sub 1.)* mit genannten Mittel sich bedienen.

4) Ist das Nervenfieber nicht von einem der bisher genannten Fälle, sondern liegen etwa insbesondere die Kräfte des Kranken sehr darnieder, ist dabey der Puls klein, weich, langsam und aussetzend; dann

a) verordne man *Sal. volatile C. C., Spirit. Salis ammoniaci, Liquor C. C. succinatus, Sal succini*, abwechselnd mit

b) *Campher*; wenn aber *Idyosinerasie* dagegen vorhanden, statt dessen *Naphta vitrioli* zu 10–20 Tropfen, *Rad. Serpentariae, Valerianae, Contrajervae, Angelicae, Siliqua Vanillae, Rad. und Flor. Arnicae, Cortices und Folia Aurantiorum, Cort. Cinamomi*, so wie alle gewürzhafte Rinden und Kräuter.

c) Vergesse man nicht hiebey, dem Kranken nach Befinden der Umstände gute, alte und geistreiche Weine, z. B. Franzwein, alten Rheinwein, alten Frankenwein, Steinwein, Champagner, Tokaier reichen zu lassen. Nur mufs man mit denselben nicht gar zu sparsam umgehen, wenn er besonders

ders in dringenden und dem Brande zueilenden Fällen den erwünschten Erfolg haben soll. Der Verfasser hat einige Malen Damen, die am Nervenfieber schwer darniederlagen, und in gesunden Tagen kaum ein Glas Wein vertragen konnten, anderthalb bis zwey Bouteillen Franzwein, nebst einer halben Bouteille Tokaier binnen 24 Stunden trinken lassen, und nur darauf schnelle Befserung wahrgenommen

- d) Am besten thut man in dem unter 4) genannten Fällen, wenn man die obigen Wurzel – Rinden und Kräuter selbst sogleich mit Wein infundiren, und in dieser Form dem Kränken nehmen läßt.
- 5) Ist das Nervenfieber eine *inflammatoria nervosa*, dann reiche man *Campher*, am besten als Emulsion, *Spiritus Mindereri*, mineralische Säuren, nach den beym Faulfieber angegebenen Regeln, am besten abwechselnd mit *Moschus*, welcher aber um so mehr indiziert ist, je mehr der *Status nervosus* prädominirt.
- 6) Geht die *Gastrica* in eine *Nervosa* über, dann wende man gleich Anfangs eine Auflösung von bitteren Extracten mit *Liquor anod. m. H.* an, und man wird dadurch aus der Verlegenheit kommen, zu einem *Laxans* verführt zu werden.

Zeichen sich dabey besonders krampfartige Erscheinungen, dann steht die *Valeriana* am rechten Orte; so auch das *Extr. Hyosciami*.

Auch die *Tinctur. opii aquosa*, oder nach Befinden der Umstände das *Opium purum* als Emulsion gereicht, thun hier treßliche Dienste.

Außerdem ist in diesem Falle der *Balsamus vitae Hofmanni* von besonders guter Wirkung.

- 7) Die sogenannten *Roborantia fixa*, wie sie bey Faulfieber angegeben worden, passen während des Nervenfiebers wenig oder gar nicht. Ihre Anwendung findet nur statt, entweder noch *in Stadio prodromorum*, oder am Ende desselben und zum Behuf der Rekonvalescenz.

Unter diesen steht nun die *China* wiederum oben an, indessen müssen wir bey ihrer Anwendung jedesmal noch folgendes genau berücksichtigen.

a) Man verordne die *China* niemals eher, als bis wir keine ausgezeichnete Nervenzufälle mehr bemerken, und die Hautausdünstung gehörig hergestellt ist.

b) Auch auf dem Falle seye man mit der Anwendung der *China* vorsichtig, gebe sie anfangs gleichsam nur Versuchsweise, und beobachte vorerst und genau, ob der Kranke dieselbe vertragen kann, oder nicht. Letzteres erkennt man daran, wenn der Kranke auf dem Gebrauch der *China* Drücken in den Präcordien, Beängstigung, schwe-

schweren Athem, Kongestionen nach den Kopf, Sopor, Deliria mit erhitztem Gesicht bemerkt.

c) Anfänglich verordne man die *China* immer nur als ein *Infusum aquosum*, noch besser als *vinosum*, abwechselnd mit *Balsamus vitae Hofmanni*.

d) Sollte der Kranke etwa zu Schweisen geneigt seyn, und die *China* ihn vielleicht noch vermehren, dann verbinde sie entweder mit *Elixir Acidum Halleri*, oder man nehme die *Tinctur cort. peruv. Whyth* mit *Elix. Acid. Halleri*.

9) Zum Schluss der Behandlung eines Nervenfiebers Kranken dienet aufer der *China*, oft noch besser als diese, das Eisen, und unter den Formen desselben am besten die *Tinctura nervina Bestuchetii*, einige Zeit fortzusetzen.

10) Aufer den bisher genannten Mitteln sind während des Verlaufes des Nervenfiebers nicht selten ganz unentbehrlich die *Vesicatoria* und *Rubefacientia*, besonders aber sind sie indiziert;

a) Wenn Delirien, oder sonstige krampfartige Zufälle da sind, verbunden mit einem kleinen, weichen, langsamen, aussetzenden oder schnellen Puls, besonders wenn *Stupor* noch dabey zugegen ist.

b) wo

b) Wo gänzliche Betaübung, außerordentliche Stumpfheit der Sinne, Gefühllosigkeit vorhanden ist.

c) Bey der *inflammatoria nervosa*, besonders wenn heftige Kopfschmerzen damit verbunden sind.

Uebrigens verfährt man im Betreff der Anwendung derselben, wie beym Faulfieber.

11) Auch der Klystire bedarf man zuweilen beym Nervenfieber, und sind dieselben bey manchen Arten des Nervenfiebers die *Conditio sine qua non*, besonders

a) in der Absicht, um die Wirksamkeit der innerlichen Arzneimitteln zu unterstützen.

b) Wenn der Kranke so sehr geschwächt ist, daß er die Arzneyen entweder wieder wegbirgt, oder auch in den nöthigen starken Dosen nicht wohl verträgt.

c) Wenn der Kranke vielleicht gegen das indizirte Mittel eine Idiosyncrasie hat.

d) Bey der *inflammatoria nervosa*, wo man ja suchen muß, durch Klystire den Leib stets offen zu erhalten.

e) Bey der *Gastrica nervosa*, wenn Durchfälle vorhanden sind, und diese den Patienten sehr schwächen, und das Fieber ver-

vermehrten. Hier sind Klystire aus einem *Infusum Valerianae* mit *Tinctur Opii* das zweckmässigste.

Außer den beyden letzt genannten Fällen sind Klystire von den oben *sub 4. b)* genannten Mitteln von ungemeinem Nutzen.

12) Ferner sind die Frictionen des Körpers mit excitirenden und flüchtig reizenden Mitteln z. B. mit aromatischem Wein, *Campher-Spiritus*, *Chantariden Tinctur*, *Decoctum* von Senfsaamen, *Spirit. nervin. extern.*, um damit die Hände, Füße und das Rückgrath öfters zu waschen, von vortrefflicher Hülfswirkung.

13) Endlich benutze man ja sobald wie möglich die aromatischen und excitirenden Bäder. Sie sind in allen Nervenfiebern, mit Auschluss der *inflammatoria nervosa*, besonders je mehr das Nervenfieber dem Brande sich nähert, anwendbar, und bedient man sich hiezu am besten der *Hb. Menth. peperit*, *Hb. Melissae*, *Flor. Chamomill.* *Flor. Lavendulae*, *Hb. Rorismarini*, *Majorani*, *Semen sinapis* am zweckdienlichsten, mit Wein oder *Spirit. vin. Camphorat.* vermischt.

Solche Bäder lasse man übrigens lau warm nehmen, den Kranken höchstens eine halbe Stunde darin verweilen, nach demselben den Kranken mit obigen Mitteln *sub 12.* stark waschen und frottiren u. s. f.

Einige Bemerkungen.

A. Nicht selten vergesellschaftet sich mit dem Nervenfieber ein Friesel. Zuweilen ist dasselbe symptomatisch, zuweilen kritisch (S. oben p. 400.) Im ersten Falle lasse man sich dadurch gar nicht in seiner Behandlung stören, sondern setze dieselbe unabgeändert fort. Im zweyten Falle Sorge man für ein etwas wärmeres Regimen, lasse den Patienten fleissig Chamillenthee, Wein mit Wasser, oder grünen Thee mit Wein trinken, und vor jede Erkältung sich hüten.

B. Wenn *Salivation* erscheint, so muß man diese abwarten, indem sie zuweilen die beste *Crisis* ist. Zu dem Ende verordne man die s. g. *gargarismata emollientia*, lasse den Hals des Patienten warm halten, und ja nichts kaltes, aber sonst recht viel trinken.

Wird aber der Speichelfluss zu stark, dann verordne man ein *Gargarisma* von Salbey, lege ein *Vesicatorium* im Nacken, und lasse Fußbäder von Senfdecokt gebrauchen u. s. w.

C. Stellt sich ein *Diabetes criticus* ein, so unterstütze man denselben durch vieles Trinken.

D. Mehrere Malen habe ich bey Nervenfieber häufige und ausnehmend schwächende *Pollutionen* wahrgenommen; so zwar, daß, wenn diese nicht gehoben worden, wo nicht schnell der Tod daraus erfolgt, wenigstens doch die Krankheit in
die

die *Tabes dorsalis* übergegangen. In diesen Fällen leistet der innerliche Gebrauch des *Camphers* in grossen Dosen, und äusserlich *Fomentationes* aus *Campher - Essig* auf das Mittelfleisch gelegt, und öfters erneuert, die schnellsten Diensten; so wie bey der

Gleichfalls hier mitunter vorkommenden *Haemorrhagia uteri* $\frac{1}{4}$ Gran *Iperacuanha* mit $\frac{1}{4}$ Gran *Opium* mich selten verlassen haben.

E. Häufiger als die *Haemorrhagia uteri* ist bey dem Nervenfieber der Fall, dass Frauenzimmer ihre monatliche Periode ganz verlieren. Hier glauben viele Aerzte, s. g. *pellentia* anwenden zu müssen. Allein ausserdem, dass sie dadurch selbst beweisen, wie wenig sie mit der Natur des Nervenfiebers und deren nothwendigen unmittelbaren Wirkungen bekannt sind, haben sie immer zu erwarten, dass sie durch die Anwendung ihrer Mittel Mutterblutflüsse erzeugen; und auf diese Weise sind Nervenfieber schnell tödlich zu machen.

Wo daher dieser Fall vorkommt, lasse ihn der Arzt unberührt liegen, und freue sich desselben vielmehr, indem seine Kranken eben deswegen eher Hoffnung zur Wiedergenesung haben, als im entgegengesetzten Falle.

F. Mehrmals werden Nervenfieber Kranke von topischen Schmerzen befallen, die so stark sind, wie bey den heftigsten Entzündungen z. B. auf der Brust, in der Magengegend, Seitenstechen u. s. w.

Hier


Hier muß man diese scheinbar entzündlichen Zufälle genau kennen lernen, indem dieselben meistens bloß krampfartiger Natur sind. Letztern Fall erkennt man daran:

1) Der Urin ist wässerig und hell; der Puls klein und konstringirt, nicht hart und voll; der Athem ist kalt, statt daß er bey einer wirklichen Entzündung heiß ist; der Durst ist nicht so brennend, oft gar keiner zugegen. Hier reichen *Tinctur Opii*, *Essent. castorei*, nebst einen *Vesicatorium* oft allein schon aus.

2) Dauern aber diese Krämpfe lange an, so kann daraus sich eine wirkliche Entzündung bilden. Dieß erkennt man, wenn der Urin dunkler, der Athem heißer, der Puls hart und voll wird.

Hier Ader zu lassen, kann man nur der Dummheit und der neologen Verwirrung verzeihen.

Außer der oben S. 409. Nro. 5) angegebenen Behandlung darf man höchstens im dringendsten Falle an die leidende Stelle einige Blutigel oder Schröpf-Köpfe applizieren lassen.



R e g i s t e r.

	Seite.		Seite.
Alpdrücken	243.	Erhängen	266.
Blasensteine	318.	Ertrinken	265.
Bleykolik	353.	Erwürgen	266.
Blutbrechen	249.	Fallsucht	281.
—— harnen	251.	Faulfieber	365.
—— husten	246.	Fingerwurm	334.
Brand, heißer und		Flusskrankheit, hitzige	194.
kalter	328.	Gallenkrankheit,	
Bräune	197.	schwere,	302.
—— brandige	228.	Gebärmutterentzündung	311.
Brustentzündung	162.	Geblüt, unterlaufenes	337.
Darmentzündung	308.	Geburt, schwere	315.
Durchfall	297.	Gicht, sthenische	194.
Eckel	295.	Gliederreißen	251.
Engbrüstigkeit	242.	Halsentzündung	197.
Entzündungsfieber,		Harnblasenentzündung	311.
einfaches	153.	Hirnwuth	170.
Erbrechen	293.	Husten, hitziger	209.
Erfrieren	264.	—— asthenischer	235.

R e g i s t e r.


	Seite.		Seite.
Katarrh, hitziger	209.	Scharlach	190.
—— kalter	235.	Scheintod	261.
Keichhusten	238.	Schlafsucht	274.
Kolik	295.	Schlagfluß	267.
Krampf	276.	Schnupfen	209.
Lähmung	272.	Schrunden	336.
Leberentzündung	309.	Schwämmchen	324.
Luftröhrenentzündung	199.	Sodbrennen	291.
Magenentzündung	304.	Speiseröhreentzündung	199.
—— Krampf.	294.	Starrkrampf	280.
Mandelentzündung	199.	—— sucht	272.
Masern	186.	Steinschmerzen	318.
Mastdarmvorfall	316.	Steckkatarrh	242.
Milzentzündung	308.	Trunkenheit	213.
Mißgebären	313.	Verbrennung	332.
Mundsperr	279.	Verblutung	340.
Mutterblutfluß	254.	Vergiftung 345 durch	
Nasenbluten	257.	Arsenik	349.
Nervenfieber	393.	Bleygifte	353.
Nierenentzündung	310.	Grünspan	354.
—— steine	318.	Gyps	355.
Ohnmacht	259.	Kalk	355.
Ohrenweh	320.	Kupfer	354.
Pflanzengifte	356.	Laugensalz	355.
Pocken	175.	Mineralische Säuren	355.
—— böartige	220.	Pflanzengifte	356.
Quetschung	338.	Rothen Präzipitat	352.
Rothlauf	203.	Spiesglas	352.
Ruhr	299.		

R e g i s t e r.

	Seite.		Seite.
Stiche und Bisse		Unverdaulichkeit	286.
von Schlangen,		Wasserscheue	284.
Insekten und		Würmer	326.
Würmern	359.	Zahnschmerzen	321.
Sublimat	352.	Zahnen, schweres	322.
Verwundung	359.	Zäpfchen, entzündetes	199.
Verstopfung	297.	—— niedergefallenes	325.
Umlauf am Finger	354.	Zungenentzündung	199.

Druckverbesserungen.

- S. 54. Z. 7. statt indirekte Asthenie l. Hyperasthenie.
— 117. — 14. — Entstehung — Entziehung.
— 129. — 28. — wegen — wenigstens.
— 139. — 8. — gröfser — kleiner.
— 139. — 18. — zweiten — dritten.
— 140. — 29. — Thätigkeit — Thätigkeiten.
— 143. — 26. — Asthenie — Sthenie.
— 144. — 12. — asthenisch — hyperasthenisch.
— 395. — 2. — Febr. putrida nervosa — Febris nervosa
primaria.
-





Killan, Conrad Joseph

Klinisches Handbuch zum Gebrauch bey den wichtigsten, gefährvollsten und
schnell tödtlichen Krankheiten für angehende Ärzte

Bamberg ; Würzburg 1809

Bamberg, Staatsbibliothek -- M.o.342
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11738343-4